






Early European Books. Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by permission of The Wellcome Trust, London.
1782/D









Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1762/D



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Image reproduced by courtesy of the Wellcome Trust, London.
1782/0






liber primus folio 713 m⁶

CVM PRIVILEGIO AD
QVADRIENNIVM

VENTER PLVMA VENVS LAVDEM FVGIENDA SEQVENTI

EXPVLSA VT AIVNT CORNICE. ADHV C.



Habetur venale in officina Henrici Stephani
E regione Scholæ Decretorum.

IOANNES RVELLIVS SVESSIONENSIS
ANTONIO DISOMO REGIO CONSILI
ARIO VTRIVSQUE LINGVAE PERITIS
SIMO .S.P.D.

Cum saepe mecum reputarem humanissime si-
mul ac eruditissime Antoni Disome omniū
ferme disciplinarum conditionem, illud impri-
mis cum admiratione michi, tum miseratione
dignū occurrebat, q̄ saluberrimæ humano ge-
neri artes vel diuinitus nobis datæ, vel mortu-
lium studio adinuentæ, ita affectæ iaceant, vt ad
interitum spectare videantur. Quibus olim excolendis veteres vsq̄
eo diligentiam omnem, & operam impenderunt, vt intentatum
nihil indiscussumq̄ reliquerint. Etenim per aliquot iam sæcula, &
qui discunt & qui docent, neglecta vera liberalium scientiarum ma-
iestate, ad echinatas captionum cauillationumq̄ argutias diuer-
tes, dici docti haberiq̄, q̄ esse malunt. Quod vt in cæteris ferri dissi-
mulariq̄ fas sit, in ea tamē arte nefarium est, quæ ad tuendam salutem
hominum nata, incorrupta semper augustaq̄ esse debet. Quæ tamen
fere iam inde ab auorum nostrorū memoria, tam turpi ac desidio-
so consensu deserta exoleuit, vt verear ne flagitiosa fortasse suis profes-
soribus aut inhonesta videatur, qui principem eius partem quæ co-
gnitione delectuq̄ medicamentorum constat, vel rei difficultate de-
territi, vel ingenio diffisi, vel iudicio lapsi, a se abdicarūt, rudiq̄ me-
dicamentariorū ministerio delegarunt, existimantes fortasse dignita-
ti amplitudiniq̄ suæ non parum detractum iri, suamq̄ auctoritatem
eleuari, si ea ipsi tractent, quorum officinæ sibi iam cognitionem ven-
dicarunt. Cum cæteri artifices igitur miniosum sibi esse putent, si im-
prudentes sui negocij conspiciantur, aut vniuersam instrumento-
rum supellestem non plane ac memoriter teneant. Proinde ars illa
præstantissima, sine qua natura manca merito ac mutila esse cense-
tur, priscis temporibus clara & percelebris, literarumq̄ monumen-
tis diligentissime tradita, posterioribus sæculis adeo a se ipsa dege-
nerauit, vt simulacrum eius tantum, vel potius vmbra nomenq̄ re-
manferit. Quippe cum olim herbarij iidem atq̄ medici essent, sci-
dit inde se studium, hominumq̄ inertia simul & incuria factum est,
vt ab ijs destituta quorum erat propria, circulatorum ne dicā im-
postorum præda facta fuerit. Cum igitur pluribus scriptorum mo-
numentis admonerer, apud antiquos gloriæ fuisse simplicium cu-
ram, ac memorabiles illos Græcorū duces hoc illustri studio sema-

A .ij.

per floruisse, huic parti ruinosæ, nutanti, breuiq; casuræ adhibendam
esse manum duxi. Nec aliud occurrebat præsentius auxilium, vt a
medijs ignorantiæ tenebris assereretur, ac errores expiari innumeraq;
mōstra domari possent, q̄ vt ea quæ græcis literis hac de re tradita
erāt, latinis illustrarētur, ac quæ sine graui perniciē diffociari nō po-
terāt, a cæteris medicinæ partibus auulsa, suo corpori restituerētur.
Pedacium igitur Dioscoridem præstātissimū huiusce partis aucto-
rem, tot sæculorum suffragijs comprobatum, pro mediocritate no-
stra latinitate donauimus, tuoq; nomini dicamus. Q̄ re acerrimi iu-
dici virum, omnium bonarum literarum ac vtriusq; linguæ studio-
sissimum cognouimus, nec parum laudis tibi ex ea re peperisti. Si-
mul vt extaret pignus mutuæ inter nos beniuolentiæ, simul vt morta-
les officio cumulatione demereremur. Quod quidem opus non para-
uo sane negotio a nobis elucubratum, veluti primitias industriæ no-
stræ & maioris laboris præludiū læta frōre suscipias. De quo id cō-
stantissime ausim polliceri, esse quasi quoddam naturæ promptuariū
ex quo res omnes, hærbae, fruges, frutices, arbores, fructus quibus
arua, campi, pascua, montes, conualles, plana confragosaq; vestian-
tur, & visceribus terræ abdita, in humani generis præsidium depro-
mi facile possunt, ac deniq; veluti a quodam rei medicamentariæ
seminario, in humanum vsum transferri, e quo vita omnis ea hauria-
requeat, quibus humanæ salutis prospiciatur, & morbis omnibus cō-
sulatur. Quæ vero meæ partes fuerunt, quoniam in propria harena,
vt dicitur, versari videbar, cum sim professione medicus, dedi operā
vtinam & præstiterim, vti omnia ex fide respōderent, & vt latina ora-
tio græci auctoris sensum fideliter redderet, ne absurda peregrinitas
medicinā quoquomodo pollueret, etiam si res ipsa elegantiam ac ni-
torem non facile admittat. Curati præterea vt idem vtrobiq; sensus
seruaretur, nulla vocum nouitas, nec triuialia verba aut exposita,
quibus quærendis Latinos fere omnes euoluimus. Cum vero latina
me defecerunt, græcis quidem & fere iam receptis vti malui, q̄ noua
aut barbara licenter admittere. Sed nihil æque me torfit q̄ veterum
manuq; exaratorum exemplarium inopia (illud enim tantū nactus
sum quod bibliopolæ typis excusum circumferunt) in quo permul-
ta manifestissime deprauata ex varia auctoriū lectione, & præsertim
in libris venenorum ex vetustissimo Pauli Aeginetæ codice, ad pri-
stinam syncæritatem restituiimus. In quibus studiosos omnes roga-
tos velim vt boni consulant. Vale Parisijs. Calendis Maij. Anno
Domini. M.D.XVI.

TABVLA

Index omnium quæ in hoc Dioscoridis volumi-
ne continentur literarum ordine digestus.

	Fol.	Cap.		Fol.	Cap.
Abrotonum	64	xxvii	agrostis	91	xxxiii
absinthium	64	xxv	aiuga	86	clxxvii
absinthiū santonicū	64	xxvi	aizoon maius	100	xc
absinthiū marinum	64	xxvi	aizoon minus	101	xcii
Acacalis	20	cxx	alabastrites lapis	138	cxliiii
acacia	22	cxxxv	albucum	55	clxxxvii
acacia altera	23	cxxxvi	alcea	85	clxv
achantha	63	xviii	alcyonium	136	cxxvii
acanthium	63	xvii	alisma	85	clxx
acetum	120	xiii	allium	51	clxix
acetum mulsum	120	xv	allium sylvestre	51	clxix
acetum scylinum	120	xviii	allium anguinum	51	clxix
acetum e stichade	123	xl	aloe	63	xxiii
achillea	91	xxxix	alsine	100	lxxxix
achras	27	clxx	althæa	85	clxiii
acida muria	120	xvi	alumen	134	cxiii
acinos	68	xlvi	alumen scissile	134	cxiii
acorum	2	ii	alus	88	xi
aconitum	99	lxxx	alysson	77	ciii
aconitum alterum	99	lxxxi	alypon	114	cxc
aconitū venenū	144	vii	amaracum	67	xl
acuta spina	21	cxxiii	ambrosia	80	cxxvii
Adarche	136	cxxviii	amiantus lapis	138	cxlvii
adianton	105	cxxxvii	ammiū alexandrinū	71	lxviii
adeps	37	lxxxvi	ammoniacon	76	xcvii
Aegilops	106	cxl	amomum	5	xvi
æris squamma	128	lxxx	amomis	5	xvi
æris flos	127	lxxix	ampelitis terra	140	clxxii
ærugo rasa	128	lxxxii	ampeloprasson	51	clxvi
ærugo scolecia	128	lxxxiii	amphisbæna	152	vii
æs vstum	127	lxxviii	amurca	23	cxxxvii
æthiopsis	102	cvi	amygdalæ amarae	27	clxxviii
ætites lapis	139	clii	amylum	43	cx
Agalochon	7	xxv	anagallis	57	cxcviii
agaricum	59	i	anagyris	85	clxviii
ageraton	94	lxii	anchusa	90	xxvi
agnus	23	cxxxviii	anchusa altera	90	xxvii

A.iii.

	Fol.	Cap.		FOL.	CAP.
anchusa alia	90	xxviii	argenti scoria	130	xcii
androsaces	83	cli	argenti spuma	147	xxvii
androsæmon	86	clxxiiii	argenti spuma	130	xciii
anemone	56	cxcv	arilaria	94	lix
anethum	70	lxv	arifarum	54	clxxxvi
anguium senectus	31	xix	aristolochia rotunda	60	iiii
anifum	70	lxiii	aristolochia longa	60	v
anonis	63	xx	armeniaca mala	26	clxvii
anthemis	83	clv	armenius lapis	131	xcvi
anthericum	55	clxxxvii	armoracia	45	cxxiii
anthyllis	83	cliiii	arnoglosson	48	cxl
antipathes	137	cxxxi	aron	54	clxxxv
antirrhinon	105	cxxxiiii	arthenogonon	82	cxli
antisfoda	127	lxxvii	arthemisia	80	cxxvi
Aparine	77	ciii	arthemisia tenuior	80	xxvii
aphaca. i. lenticula	51	clxv	Asarum	4	ix
apiastron	78	cxvii	asclepiades	77	cv
apios	114	clxxxvii	ascyros	86	clxxiii
apium satiuū	71	lxxii	asininum iecur	33	xlii
apium rusticū	71	lxxiii	asini vngula	33	xliiii
apium sylvestre	56	cxciii	asius lapis	137	cxxxiii
apocynon	99	lxxxiiii	aspalathus	6	xxiii
apollinaris	96	lxxii	asparagus	47	cxxxix
apri iecur	33	xlvi	asphodelus	55	clxxxvii
Aqua mulsa	119	x	asplenion	83	cli
aqua	119	xi	aspis	152	xliii
aqua mariua	120	xii	aspis	156	xliii
aqua frigida	148	xxxiiii	aster	104	cxxi
Arabis	52	clxxiiii	astragalus	95	lxv
arabus lapis	138	cxl	Athamanticū	3	iii
araneus	35	lxviii	athera	42	cii
arbutus	27	clxxvii	atractylis	77	cvi
arcion	103	cviii	atramentū sutoriū	132	cv
ardion	103	cvii	atramentū librariū	141	clxxiiii
arduron	103	cvii	atraxaxis	46	cxxxii
argemone	57	cxcvi	atriplex	46	cxxxii
argemone altera	57	cxcvii	Auellana nux	28	clxxxi
argenti recrementū	130	xcii	auena	106	cxl
argentum viuum	132	ci	auricula muris	58	cciii
argentum viuum	147	xxviii	auripigmentum	133	cxii

	Fol.	Cap.		Fol.	Cap.
auripigmentum	147	xxix	calamus odoratus	6	xix
axos	148	xxxiii	calamintha	66	xli
Bacchar	4	ix	calcifraga	114	cxc
baccharis	68	xlix	calx	136	cxxiii
balauſtium	25	clvi	calx	147	xxix
ballote	78	cxvi	cancamum	7	xxvii
balsamura	6	xx	cancer fluuiatiles	31	xii
baſiliſcus	156	xv	canchrys	73	lxxxv
batos	92	xl	canchrys	73	lxxxvi
bdelium	14	lxxx	canis rubus	21	cxxv
bechion	80	cxxv	canis iecur	33	xlix
beta	47	cxxxvi	canis rabioſi ſigna	151	i
betonica	87	i	canis lingua	105	cxxx
bitumen	18	xcvii	cannabis ſylueſtris	85	clxvi
blatta piſtrina	33	xxxviii	cannabis ſatiua	85	clxvii
bliton	46	cxxx	cantharis	34	lxv
botrys	80	cxxviii	cantharidū venena	143	i
braſſica	46	cxxxiii	capitulum martis	63	xxiii
braſſica ſylueſtris	47	cxxxiiii	capnos	103	cx
braſſica marina	47	cxxxv	capparis	56	cxcii
brathy	18	ciii	capræ vngula	33	xlvi
bretanica	87	ii	caprinum iecur	33	xlvii
bromus	42	ciii	cardamomum	3	v
bromus	106	cxli	cardamon	52	clxxii
bryon	7	xxiii	cardamina	48	cxliii
bryon marinū	102	c	carduus	62	xv
bryonia	114	cxliii	carpaſi ſuccus	145	xiii
buccina	30	v	carum	70	lxiii
bugloſſum	105	cxxix	caryotæ	25	cl
bulbus vomitorius	55	clxxxviii	caſeus	36	lxxix
bulbus cibarius	55	clxxxix	caſia	4	xii
bulbus vomitorius	110	clxii	caſtanea	24	cxlvii
bunias	45	xxii	caſtorium	32	xxvi
bunion	46	cxxix	catanance	105	cxxxv
bunion	104	cxxv	caucalia	104	cxxiiii
bupreſtis	35	lxvi	caucalis	50	clvi
bupreſtis	144	iii	cedria	18	cv
buphthalmos	83	clvii	cedrides	19	cvi
butyrum	36	lxxxi	cedromela	26	clxviii
Cadmia	126	lxxv	cedrus	18	ciii

	Fol	Cap		Fol	Cap
celticum nardum	5	vii	chrysogonon	94	lix
cenchrīdij venena	155	xii	cicadae	34	lvi
centaurium magnū	61	vii	cicer satium	43	cxiii
centaurium minus	61	viii	cicer arietinum	44	cxiii
centum capita	63	xxiii	cicer sylvestre	44	cxiii
centumculus	80	cxxxi	cicerbita	48	cxlvi
capa	51	clxviii	cici	110	clxvii
capea	85	clxix	cicuta venenum	145	xi
cara cādida seu puni	41	xciii	cicuta	99	lxxxii
cerasia (ca	26	clix	cimices	33	xxxvi
cerus piscis	31	xxx	cimolia	140	clxvii
cerui genitale	33	xlili	cinnabaris	131	c
ceruinum cornu	34	lxiii	cinnamomum	5	xliii
caruleum	131	xcvii	circaea	81	cxixiii
cerusa	131	xciiii	cistus	21	cxviii
cerusa	146	xxii	citrango	78	cxvii
cestron	87	i	citria mala	26	clxviii
chalcitis	132	cvi	clematitis	114	cxci
chameacte	113	clxxxv	clematis	88	viii
chamae	30	ix	clematis altera	88	ix
chamaecyffos	105	cxxvii	clinopodium	77	cviii
came daphne	107	cl	clymenos	89	xv
chamaedrys	78	cxii	Cnicus	115	cc
chamaelaea	113	clxxxii	Coagulum	37	lxxxv
chamaelao albus	61	ix	coccum	93	li
chamaelao niger	62	x	coccum gnidion	113	clxxxiii
chamaeleuce	105	cxxviii	cochleae terrestres	30	xi
chamaelon	83	clv	colchicon	100	lxxxvii
chamaepytis	86	clxxvi	colligendorum ratio	1	
chamaelyce	112	clxxxi	collocasia	44	cxvi
characias tithymalus	111	clxix	colocynthis	114	clxxxviii
charta	20	cxvii	colus rustica	77	cvi
chelidonia	57	cc	colymbades	24	cxli
chelidonia minor	58	cci	condrila	49	cxlviii
chia terra	140	clxv	comunis curatio in omnes istus		
chiliophyllos stratus	1102	ciiii	virulentos	152	xxi
chrysanthemon (otes	83	clv	conyza	81	cxixv
chrysanthemon	94	lxi	conyza parua	81	cxixvi
chryfocolla	131	xcv	conyza altera	81	cxixvii
chryfocome	94	lviii	Corallium	137	cxix

	Fol.	Cap.		Fol.	Cap.
coriandrum	145	ix	daphnoides	107	cxlix
coriarius frutex	24	cxlix	daucus	73	lxxxii
coris	86	clxxv	delphinium	73	lxxxii
corona veneris	48	cxlii	delphinium alterum	73	lxxxiii
coronopus	48	cxlv	dictamum	66	xxxv
cornus	27	clxxiii	dictamum cretense	66	xxxvii
cos	139	clix	diphryges	133	cx
costus	5	xvii	dipsacus	62	xii
cotyledon	101	xciii	dipsas	152	x
courmi	42	xcviii	dorychnion	98	lxxviii
crambe	46	cxxxiii	dorychniō venenū	144	vi
crataegonum	81	cxl	draco marinus	31	xv
crimnon	42	c	draco marinus	155	v
crission	104	cxx	dracunculus	54	clxxxiii
crithmum seu potius			dracūculus parvus	54	clxxxiii
crithmon	48	cxliii	draguntion	54	clxxxiii
crocodillion	62	xi	druinus	156	ix
crocomagma	7	xxx	dryopteris	115	cxcix
crocum	7	xxix	dulcis radix	61	vi
crommyon	51	clxviii	ebulū	113	clxxxv
croton	110	clxvii	ebur	34	lxi
cucurbita	49	cxlix	echinus aquatilis	30	i
cucumis sativus	109	clvii	echion	91	xxx
cucumis sylvestris	108	clv	elaphoboscon	72	lxxviii
cuminum	71	lxvi	elaterion	108	clv
cuminum sylvestre	71	lxvii	elaterion	108	clvi
cupressus	18	c	elatine	92	xliii
cupressus	18	cii	electrum	20	cxv
cyclaminus	53	clxxxi	eleliphacos	66	xxxviii
cyclaminus altera	54	clxxxii	elæomeli	8	xxxvii
cynocrambe	116	ccii	eleoselinum	71	lxxiii
cynoglosson	105	cxxx	elichryfos	94	lx
cynomorion	50	clix	empetron	114	cxc
cynosorchis	82	cxlii	ephemeron	100	lxxxvii
cyparissias thymal ⁹	111	clxxxiii	ephemeron	144	v
cyphi thymiana	7	xxviii	epimedion	90	xxii
cypirus	5	iiii	epimelis	27	clxxii
cytinus	25	cliii	epirotica mala	26	clxiii
cytissus	103	cxiiii	epiactis	103	cx

B. j.

	Fol.	Cap.		Fol.	Cap.
epithymum	114	clxxxix	flos sylvestris punici	25	clvi
equisetum	93	xlix	fœmina	111	clxx
equisetum alterum	93	l	fœniculum	72	lxxix
equorum lichenes	33	xlvi	fœniculum erraticū	72	lxxx
erethria terra	140	clxii	fœnigræci farina	43	clxi
erica	20	cxix	fœnigræcū	43	clxii
erigeron	101	xcviii	fraxinus	19	cx
erinon	91	xxxii	fremium	56	cxcv
eruca	34	lxiii	fucus marinus	102	ci
eruca olerum	50	clvii	fuligo liquidæ picis	17	xciii
ærugo	128	lxxxii	fuligo pictoria	141	clxxxiii
ærugo scolecia	128	lxxxiii	fuliginis cōpositio	15	lxxxv
eruina farina	44	cxix	fumaria	103	clxi
eruum	44	cxix	fungi	100	lxxxvi
erysimon	52	clxxv	fungi	146	xxiii
eryngium	63	xxiii	Gagates lapis	138	clxi
erythrodanon	84	clxi	galadites lapis	138	clxi
eupatorium	92	xliv	galaxias	138	clxii
euphorbium	75	xcv	galbanum	76	xcvi
euzomon	50	clvii	galerita	34	lix
Faba	44	cxv	galiopsis	101	xcvi
fabæ ægyptia	44	cxvi	galla	24	clxviii
fagus	24	clxvi	gallina	33	lii
farina crassior	42	c	gallinæ cerebellum	33	lii
fæx	135	cxiii	gallion	101	xcvii
febrifuga	61	viii	garum	32	xxxiii
ferri rubigo	129	lxxxiii	genitale cerui maris	33	xlvi
felis	32	xxix	gentiana	60	iii
fel	39	lxxxviii	geranion	80	cxix
fel terræ	61	vii	geranion alterum	80	cxix
ferula	74	lxxxix	geodes lapis	139	clx
ferulago	109	clix	gingiberis	53	clxxvii
Fibrini testes	32	xxvi	gingidion	50	clxiii
ficus	28	clxxxiii	gith	74	xcii
fidicula	106	cxviii	Gladiola	90	xxiii
filicula	45	cxviii	glans	24	clxv
filix fœmina	115	cxvii	glans fardiana	24	clxv
filix	115	cxvi	glans iouis	24	clxvii
fimum	40	xc	glans vnguentaria	110	clxiii
flos punicæ	35	cliii	glastum satium	58	ccv

	Fol.	Cap.		Fol.	Cap.
glastum fatium	58	xxv	helxine	92	xlvi
glastum sylvestre	58	xxvi	hematites lapis	137	cxxxv
glaucium	76	xcix	hemerocalle	81	cxxxviii
glaux	106	cxlii	hemionitis	83	cliii
glicon	66	xxxiii	herinaceus terrestris	30	ii
gluten piscium	76	ci	hieracia	71	lxx
glutinium	76	ci	hieracia parua	71	lxxi
Glycyrrhiza	61	vi	Hippace	36	lxxx
gnaphalion	80	cxxx	hippocampus	30	iii
gnidiū grauum	113	clxxxiii	hippoglosson	105	cxxxiii
gobius	32	xxxii	hippophaes	120	clxv
gramen	91	xxxiii	hippophæston	110	clxvi
gramen pernaſi	91	xxxv	hippopotami testes	32	xxv
gramē harundinaceū	91	xxxiii	hippofelinon	72	lxxvi
grosſi	29	clxxxv	hippuris	93	xlx
gruina	80	cxxx	hirci barbula	50	clx
gutta	76	xcvii	hirculus	3	vii
gummi ceraſi	26	clix	hirundinum pulli	34	lx
gummi amygdalæ	27	clxxxviii	hirudo	147	xxxii
gypsum	65	xxx	hordeum	42	xcvi
gypsum	146	xxiii	holosteum	88	xiii
Hæmorrhous	152	x	horminum	82	cxlvi
halica	42	cvi	hyacinthus	95	lxvi
halicacabon	29	clxxxviii	hydromeli	119	x
halicacabon	97	lxxv	hydromelon	121	xxiii
halimus	20	cxxii	hydropiper	53	clxxviii
harena	139	clviii	hydrus	152	xi
harundo	20	cxvi	hyofciamus	96	lxxii
harundo cypria	20	cxvi	hyofciamus	145	xv
harundo vallatoria	20	cxvi	hypocoon	96	lxxi
haſtula regia	55	clxxxvii	hypericon	85	clxxii
hebenus	21	cxxx	hypocistis	21	cxxix
hedera	57	cxcix	hyſſopum	65	xxviii
hedyſaron	82	cxlvii	Iaſpis	139	clv
helenium	8	xxxi	iberis	29	clxxxvii
helenium alterum	8	xxxiii	ibiscum	85	clxiii
helioſcopus	111	clxxii	idea radix	93	xlvi
heliotropiū magnū	116	ccii	iecur aſininum	33	xlvi
heliotropiū paruum	116	cciii	iecur caprinum	33	xlvi
helleborum album	107	cli	illecebra	47	cxxxvii
helleborum nigrum	107	clii	ilex	24	clvii

B. ij.

	Fol.	Cap.		Fol.	Cap.
ilex	24	cxlvi	lauacrum veneris	62	xii
Indicus lapis	131	xcviii	lauer	84	cxli
inguinalis	104	cxxi	laureola	107	cl
intubus	49	cxlvii	laurus	19	cvii
inturis	56	cxcii	laurus alexandrina	107	cxlviii
ionia	30	vi	lauri baccæ	19	cviii
iouis glans	24	cxlvii	Lemnia terra	132	ciii
irion	52	clxxv	lens	44	cxvii
iris	2	i	leus palustris	100	xc
iris sylvestris	90	xxv	lentiscus	16	lxxxviii
isatis	53	ccv	lentiscina refina	16	lxxxix
isopyron	104	cxxii	lenticula	51	clxv
iudaicus lapis	138	cxlvi	leontopedalon	77	cix
iuncus odoratus	6	xviii	leontopodion	105	cxxxii
iuncus marinus	94	lv	lepidium	56	cxcii
iuniperus parua	18	ci	lepus terrestris	31	xxi
iuniperus magna	18	cii	lepus marinus	147	xxx
ixia	61	ix	leucacantha	63	xxi
ixia	146	xxi	leucanthemon	83	clv
Labrum veneris	62	xii	leucas	78	cxii
labrusca	104	cxcii	leucoion	81	cxxxix
lac	35	lxxv	lichenes equorum	33	xlv
laccoagulatum	147	xxvi	lichen	94	lvi
lac humanum	36	lxxviii	ligusticon	69	lvi
lactis vsus	35	lxxv	ligustrum	21	cxxvi
lacerta	35	lxix	lilium	78	cxv
lactuca sativa	49	clii	lilium sylvestre	81	cxxxviii
lactuca sylvestris	49	cliii	limonion	89	xix
ladanum	21	cxxx	lingua canis	105	cxxx
lagopus	89	xx	lingua bubula	105	cxxxix
lampfana	46	cxxvii	linozostis	116	cc
lana	36	lxxxii	linum	43	cxiii
lana vsta	36	lxxxiii	lithocolla	139	clv
lanaria hærbæ	53	clxxx	lithospermon	84	clix
lanceola	84	clxii	locustæ	34	lvii
lappa	106	cxxxix	lolium	43	cx
lappago	110	clxv	lonchitis	84	clxii
lapathum	46	cxxvi	lonchitis altera	84	clxiii
laser	75	xciii	lora	119	vii
laserpitium	75	xciii	lotus	27	clxxiii
lathyrus	112	clxxvii	lotus urbana	103	cxii

	Fol.	Cap.		Fol.	Cap.
lotus syluestris	103	cxiii	menta	66	xxxix
lotus ægyptia	103	cxv	mentastrum	66	xl
lupinus	45	cxx	meon	3	iii
lychnis coronaria	78	cxiii	mercurialis	116	cci
lychnis syluestris	78	cxiii	mergi iecur	33	li
licium	22	cxix	mespilus	27	clxxi
lycopsis	90	xxix	metopion vnguentū	13	lxx
lysimachia	87	iiii	miliū	43	cvii
Macer	19	cxii	millefolium	103	cxvi
magnes lapis	138	cxix	millepedæ	35	xxxvii
magudaris	75	xciii	minium sinopicum	132	cii
maiorana	67	xl	misy	133	cviii
mala dulcia	26	clxiii	molibdana	130	xc
mala medica	26	clxviii	molibdoides lapis	129	lxxxix
malabathrum	4	xi	moly	69	lii
mali corium	25	clv	montanum nardū	4	viii
malua	46	cxix	morochthus	138	cxlii
malum punicum	25	cliii	morus	28	clxxxii
malum cotoneum	26	clxii	mulsum	119	ix
malum syluestre	26	clxv	mulus	32	xxiii
malum	26	clxi	muralis hæba	92	xlii
mandragoras	98	lxxix	muria	135	cxix
mandragoras	145	xvi	mures	35	lxxiii
marcor lignorum	19	cxiii	muris auricula	58	ccii
maron	68	xlvi	muris auricula	58	cciii
marrubium nigrum	78	cxvi	mus araneus	35	lxxii
marrubium	79	cxviii	mus araneus	155	vi
meconium	145	xvii	mus araneus	152	v
medica	50	clxiii	muscus	7	xxiii
medion	89	xxi	mustella	32	xxvii
medularum ratio	39	lxxviii	Myaces	30	vii
mel	41	xcii	myagron	104	cxviii
mel heraclion	145	viii	myosota	58	ccii
melantheria	133	cix	myrica	20	cxviii
melanthium	74	xcii	myrrha	14	lxxvii
melia terra	140	clxxi	myrrha	14	lxxviii
melimela	26	clxiii	myrrhis	104	cxvii
melitites lapis	138	cxlii	myrtidanum	26	clviii
memphites	139	cxlix	myrtus sativa	25	clvii
menæ	32	xxxi	myrtus syluestris	106	cxlvii
			myrobalani	25	B.üj. 18-136

	Fol.	Cap.		Fol.	Cap.
Naphtha	18	xcix	oleum gleucinum	12	lxvi
narcaphthon	7	xxvi	oleum Hedycroon	13	lxix
narcissus	110	clxiii	oleum Hyosciaminū	9	xli
nardi genera	3	vi	oleum iasminum	13	lxxvi
nardū celticum	3	vii	oleum irinum	12	lxv
nardinum vnguentū	13	lxxiii	oleum laurinum	9	xlvi
nasturtium	52	clxxii	oleum lentiscinū	10	xl9
Nepeta	66	xli	oleum mastichinum	10	l
nerion	102	lxxxv	oleum Megalinum	13	lxviii
nitrum	135	cxxi	oleum Melāthinū	9	xl5
nitri spuma	135	cxxii	oleum melinnū	10	liii
nux iuglans	27	clxxx	oleum melinum	26	clxi
nux auellana	28	clxxxi	oleum mendesium	13	lxxi
nymphæa	82	cxlix	oleum myrteum	9	xlvi
nymphæa altera	83	cl	oleum narcissinum	11	lxii
Ochra	131	xcix	oleum ociminum	11	lviii
ocimastrum	68	xlvi	oleum oenanthinū	10	lv
ocimastrum	91	xxxi	oleū oliuæ sylvestris	8	xxxiii
ocimum	50	clviii	oleū oliuæ sylvestris	24	cxli
oenanthe	81	cxxxiii	oleū omphacinū	8	xxxii
oenanthe	117	v	oleum picinū	17	xcii
oesypum	37	lxxxiii	oleum raphaninū	9	xlvi
olea sylvestris	23	clx	oleum rosaceum	10	lii
oleaster	23	clx	oleū sampsuchinū	11	lvii
olea a thiopica lachrya			oleū sicyoniū	8	xxxv
(ma	24	cxliii	oleū sinapinum	9	xlvi
oleum abrotoninū	12	lxvii	oleū styracinum	12	lxiii
oleum abrotoniū	11	lix	oleum styracinum	14	lxxix
oleum amaracinum	12	lxvii	oleum susinum	11	lxi
oleum amygdalinū	9	xxxix	oleū sylvestris oliuæ	8	xxxiii
oleum anethinum	11	lx	oleū sylvestris oliuæ	24	cxli
oleum Balaninū	9	xl	oleum telinum	10	lvi
oleum Butyrinum	12	lxiii	oleum terebenthinū	10	xlxi
oleum Cicinum	9	xxxviii	oliuæ colymbades	24	cxli
oleū cinamonimū	13	lxxiii	oliuæ sylvestris oleū	8	xxxiii
oleū e grano gnidio	9	xl	oloschinos	94	lv
oleum crocinum	12	lxiii	olusatrum	72	lxxvi
oleum cyprinum	12	lxiii	omphacium	117	vi
oleum cyprinum	21	cxxvi	omphacomelites	121	xxiii
oleum Elatinum	10	liii	onagra	104	cxix

	Fol.	Cap.		Fol.	Cap.
onitis	65	xxxi	parthenium	83	clvi
onobrychis	85	clxxi	passum	112	vii
onosma	82	cxlviii	pastinaca marina	155	v
onyx	30	x	pastinaca	31	xxii
ophites lapis	139	cliii	pastinaca	70	lvii
opobalsamum	6	xxi	pastinacæ venentū	152	iiii
oreoselinon	72	lxxiiii	pederota	63	xviii
origanum	65	xxx	pedicularia hærba	109	clviii
origanum sylvestre	65	xxxii	peleciton	82	cxlvii
ornithogalum	50	clxi	penthaphyllon	92	xlvi
orobanche	50	clix	peplion	112	clxxx
oryza	42	cv	peplos	112	clxxxix
ossifragus	34	lviii	peplis	117	clxxx
ostracites	139	clvi	pepo	49	cli
Osyris	106	cxliiii	peristereon	94	lxiii
othonna	58	ccii	persea	29	clxxxvi
oui candidum	34	liiii	persica mala	26	clxvi
ouorum natura	34	lv	personata	103	cviii
oxalme	120	xvi	periclymenon	89	xvi
oxylapathum	46	cxxvi	Pes gallinaceus	50	clvi
oxyschinos	94	lv	petasites	103	cix
oxymyrsine	106	cxlvii	petroselinum	72	lxxv
Pæonia	84	clviii	peucedanon	74	xc
paliurus	20	cxiii	phalangium	79	cxxi
palma	25	cl	phalangium	152	i
palma elate	25	clii	phalaris	84	clx
palma thebaicæ	25	cli	pharicon	146	xix
panax	69	liii	phasolus	44	cxviii
panax	69	liiii	phlomis	102	cl
panax chironion	69	lv	phœnix	93	xlvi
pancratium	55	cxci	phrygius lapis	137	cxviii
panicum	43	cviii	Phu	4	x
papauer erraticum	95	lxvii	phyllitis	79	cxv
papauer satium	95	lxvii	phyllon	81	cxli
papauer corniculatū	96	lxix	phyteuma	105	cxviii
papauer corniculatū	46	xviii	picea	15	lxxxvi
papauer spumeū	96	lxx	picis liquide fuligo	17	xciii
papyrus	20	cxvii	pinæ nuces	16	lxxxvii
paralion	111	clxxi	pinorum eruca	144	ii
paronychia	94	lvii	pinus	15	lxxxvi

B. iiii.

	Eol.	Cap.		Fol.	Cap.
piper	52	clxxvi	psyllion	145	x
piscium ius	33	xxxv	ptarmica	53	clxxix
pissasphaltos	18	xcviii	pterix	115	cxcvi
pisselaon	17	xciii	pulegium	66	xxxiii
pistacia	27	clxxix	pulicaria	97	lxxiii
pityusa	112	clxxvi	pulticula	42	cii
pix liquida	17	xcii	pulmo marinus	33	xxxix
pix sicca	17	xc	pumex	134	cxvi
pnigitis terra	140	clxviii	purpura	30	iiii
plantago	48	cxl	pygnoconon	113	clxxxvi
platanus	19	cix	pyralter	27	clxx
plumbago	130	xcxi	pyrethrum	73	lxxxiii
plumbum elotum	129	lxxxvi	pyrites lapis	137	cxxxiii
plumbum vstum	129	lxxxvii	pyrorum genera	26	clxix
plumbi recrementū	129	lxxxviii	Quercus	24	cxliiii
polemonia	88	x	quinquefolium	92	xlvi
polion montanū	79	cxxii	Radicula	53	clxxx
polycnemon	77	cvii	radix	45	cxxiii
polygala	106	cxliii	radix dulcis	61	vi
polygonaton	88	vii	radix sylvestris	45	cxxiii
polygonon	87	v	radix sylvestris	114	clxxxvii
polypodion	115	cxcviii	ramnus	20	cxxi
pompholix	126	lxxvi	rana	32	xxviii
populus alba	19	cxii	ranunculum	56	cxciii
populus nigra	20	cxv	rhapbanus	45	cxxiii
porrum capitatum	51	clxvi	rhapban ^o sylvestris	46	cxxiii
portulaca	47	cxxxvii	rhaponticum	60	ii
portulaca	47	cxxxv	rapum sylvestre	45	cxxi
potamogeton	102	cii	rapum terræ	53	clxxxii
poterion	62	xvi	ratio vidus in morfu rabiosi		
præcocia mala	26	clxvii	canis	152	iiii
prassion	79	cxviii	ratio recondendorū	2	
propolis	41	xciii	recrementū argēti	103	xcii
prunus	27	clxxvi	remedia demorsorum a cane ra-		
pseudobunion	104	cxxvi	bioso	151	ii
pseudocasia	4	xiii	refina lentiscina	16	lxxxix
pseudocinnamomū	5	xv	refina liquida e pimu	116	xcii
pseudodiagamum	66	xxxvi	rheon (et picca	60	ii
psoricon	133	cvii	rhodia radix	93	xlvi
psyllion	97	lxxiii	rhododendron	109	lxxxv

	Eol.	Cap.		Fol.	Cap.
rhys	24	cxlix	sapa	118	vii
ricinus	110	clxvii	saphyrus	139	cxlviii
rosa	22	cxxxii	sarcocolla	76	xcviii
rosei pastilli	22	cxxxiii	sardianæ glandes	24	cxlvii
rosmarini genera	73	lxxxv	sardonias	145	xiiii
rosmarinū coronariū	74	lxxxvii	sarmenticius cinis	136	cxxvi
rubeta	147	xxxi	sarxiphagon	89	xviii
rubia	84	clxi	satureia	67	xlvi
rubigo ferri	129	lxxxiii	satyrion	82	cxliiii
rubrica	132	cii	satyrion erythroniō	82	cxlv
rubrica fabrilis	132	ciii	saxifragia	89	xviii
rubus canis	21	cxxv	scammonia	112	clxxxii
rubus	92	xl	scammonium	112	clxxxii
rubus idæus	92	xli	scandix	50	clv
rumex	46	cxxvi	schistum lac	36	lxxvii
ruscum	106	cxlvii	schistos lapis	138	cxxxvi
ruta	68	i	scilla	55	cxc
ruta sylvestris	68	li	scincus	35	lxxi
Sabina	18	ciii	scolopendra	31	xvi
fabucus	113	clxxxiiii	scolopendra	155	iii
saccharum	41	xcii	scolopendra	152	ii
sagapemon	75	xciii	scolymos	62	xv
sal	134	cxvii	scopa regia	104	cxxv
salis flos	135	cxx	scordion	79	cxxiii
salamandra	35	lxvii	scordoprasson	51	clxx
salamandra	144	iiii	scoria plumbi	129	lxxxviii
saluaris	37	xlvi	scorodon	51	clxix
salunca	3	vii	scorpioides	116	ccv
salix	23	cxxxix	scorpionis morsus	152	iii
salvia	66	xxxviii	scorpius terrestris	31	xiii
samia terra	140	clxiii	scorpius marinus	31	xliii
samius lapis	140	clxiii	scorpij venena	155	iiii
sampsucum	67	xlvi	securidaca	82	cxlvii
sandaraca	134	cxiii	sedum magnum	100	xc
sandaraca	147	xxix	selenites lapis	139	cl
sandyx	131	xciii	selinusia terra	140	clxvi
sanguinaria	87	v	semperuium	100	xc
sanguinaria foemina	88	vi	semperuium minus	101	cxii
sanguis	40	lxxxix	senecio	101	xcviii
sanguis tauri	147	xxv	sepiā	31	xxiii

	Fol.	Cap.		Fol.	Cap.
seps	35	lxx	sory	133	cx
seris	49	cxlvii	sparganion	90	xxiii
serpyllum	67	xliiii	spartion	109	clx
serum lactis	35	lxxvi	spatha	25	clii
sertula campana	67	xlvi	spondylion	74	lxxxviii
sesama	43	cix	sphragis	132	ciii
sesamoides	108	cliii	spina alba	62	xiii
sesamoides paruum	108	cliiii	spina acuta	21	cxxiii
seseli	70	lviii	spina arabica	62	xiiii
seseli ethiopicum	70	lix	spina sylvestris	63	xix
seseli peloponense	70	lx	spongiarum lapides	139	cliii
seseli creticum	70	lxi	spongiæ	136	cxxix
setanium	27	clxxii	spuma nitri	135	cxxii
sicyonium	8	xxxv	spuma salis	135	cxviii
sideritis	91	xxxvi	spuma argenti	130	93
sideritis alia	91	xxxvii	Squamma æris	128	lxxx
sideritis alia	91	xxxviii	squamma ex acie de		
sidion	25	clv	(cussa	128	lxxxii
filigo	42	ci	stachys	79	cxix
filiquæ	26	clx	stacte	13	lxxii
filibum	110	clxi	staphis agria	109	clviii
finapis	51	clxxi	stercus ferri	129	lxxxv
fion	48	cxli	stibium	129	xc
fisarum	46	cxxv	sticas	65	xxix
fison	70	lxii	stæbe	89	xiii
fisymbriion	48	cxlii	stratiotes chyliophyl		
fisymbriion alterū	48	cxliii	los	102	ciii
fitania	41	xcv	stratiotes	102	cii
fmilax	50	clxiii	strichnon	97	lxxvii
fmilax	145	xii	strigmenta balnearū	8	xxxvi
fmilax aspera	106	cxlv	struthia cotonea	26	clxii
fmilax lævis	100	cxlvi	struthion	53	clxxx
fmyris	139	clvii	Styrax	14	lxxix
fmyrnion	72	lxxvii	succinum	20	cxv
folanum somniferū	97	lxxvi	suillus pulmo	33	xi
folanum hortense	97	lxxvii	suillus talus	34	lxii
folanum manicū	98	lxxvii	sulphur	134	cxv
soleæ veteramētariæ	33	l	superciliū veneris	91	xxxix
fonchus	48	cxlvi	sycomorus	28	lxxxiii
forba	27	clxxv	sylvestria mala	26	clxv

*fmilax, ut nunc vocat,
stibium*


	Fol.	Cap.		Fol.	Cap.
symphyton alterū	88	xii	toxicon	146	xx
Tamarix	20	cxviii	Tragacantha	63	xxii
taxus	99	lxxxiii	tragium	93	lii
taxus	145	xii	tragiū alterū	93	liii
tauri sanguis	147	xxv	tragoriganum	65	xxxiii
telephon	59	ccvii	tragos	42	ciii
telis	43	cxii	tragos	93	liiii
tellinæ	30	viii	tribulus	89	xvii
terebinthus	16	xc	trichomanes	106	cxxxviii
terebinthina	16	xc	trifolium	79	cxxi
terra	140	clxi	trifolium odoratū	89	xxi
terra fornacum	140	clxx	trimestria	41	xcv
testæ	140	clxix	triphyllon	79	cxxi
testiculus canis	82	cxlii	tripolion	105	cxxxvi
testiculus alter	82	cxliii	trifago	78	cxii
teucrion	77	cx	triticum	41	xcv
thalassomelites	120	xiii	Tuber	50	clxii
thaliætron	102	xcix	tussilago	80	cxxv
thapsia	109	clix	typha	81	cxxxii
thelypteris	115	cxcvii	Vaccinium	95	lxvi
thelygonon	81	cxli	venerea	48	cxlii
thlaspi	52	clxxiii	veneris corona	48	cxlii
thræcius lapis	138	cxxxviii	veneris vmbilicus	101	xciii
thumnus	52	xxxiii	veneris vmbilicus al		
thus	15	lxxxi	(ter	101	xciii
thuris fuligo	15	lxxxiii	veratrum album	107	cli
thuris manna	15	lxxxiii	veratrum nigrum	107	clii
thuris cortex	15	lxxxii	verbascum	102	cv
thyites lapis	138	cxlv	verbenaca	94	lxiii
thymelæa	113	clxxxxiii	verbenaca supina	95	lxiii
thymoxalme	120	xvii	vermes terreni	35	lxxii
thymus	67	xlii	vernilago	62	x
Tilia	21	cxxvii	vesparū apumq̃ ictus		
tithymali genera	iii	clxviii		155	i
tithymalus platy			vesicaria	97	lxxv
(phyllos	iii	clxxv	vettonica	87	ii
tithymalus petræus	iii	clxxiii	vettonica	87	iii
Tordilion	70	lxi	Victus ratio in mor		
torpedo piscis	31	xvii	su rabioficantis	153	iiii
topiaria	63	xviii	vimen	33	cxxxviii

	Cap.	Fol.		Fol.	Cap.
vina marina	121	xx	vinum e Nardo sylue	124	lxi
vina picata	118	vii	(stri	124	lviii
vina refinata	118	vii	vinum nectarites	124	xxvi
vinu natura	118	vii	vinu Oenanthinu	121	liii
vinum abrotonites	124	liiii	vinum organites	124	vii
vinum absinthites	123	xli	vinum omphacites	119	xxxii
vinum acorites	125	lxv	vinum Palmeum	122	lxiii
vinum adynamon	119	vii	vinum panacites	125	xl
vinum apijtes	121	xxv	vinum picatum	123	
vinum aromatites	124	lvi	vinum e pipere myrrha		
vinum asarites	124	lx	(et iride	124	lvii
vinum Bunites	123	xlvi	vinum prasijtes	124	
vinu calaminthites	124	liiii	vinum Resinatū	122	xxxv
vinum catorchites	122	xxxiii	vinum rhodites	122	xxxviii
vinum cedrinum	122	xxxvii	vinum rhoites	121	xxii
vinum cedrites	123	xxxix	vinum saluiatum	124	lxiii
vinum celstrites	123	xlvi	vinum scammonites	125	lxxiii
vinu chamædryites	123	xlvi	vinum scyllinum	121	xix
vinum e chamaelea	125	lxx	vinum selenites	125	lxvi
vinu chamæpithyinu	(125	lxxi	vinum stichadites	123	xlvi
		lv	vinum strobilites	122	xxxvi
vinum e coniza	124	xxxvii	vinum e sycomoris	122	xxxviii
vinum cupressinum	122	xxi	vinum e syriaca nardo		
vinum cydonites	121	lxii	(celtica malabathro	124	lix
vinum Daucites	124	xlvi	vinu therebinthinu	122	xxxii
vinum dictamnites	124	xlvi	vinum thymbrites	124	lii
vinum e flore salis	125	lxviii	vinum thymites	124	li
vinum Heleborites	125	lxxiii	vinum e thymelea	125	lxix
vinum hyssopites	123	xlvi	vinu tragoriganites	123	xlvi
vinum iuniperinum	122	xxxvii	viola alba	81	xxxix
vinum iuniperinum	123	xxxviii	viola purpurea	104	cxviii
vinum Laurinum	122	xxxvii	vipera	152	vi
vinum lentiscinum	122	xxxii	vipera	155	vii
vinu Mādragorites	125	lxxii	viperinæ carnes	31	xviii
vinum marathrites	125	lxvii	viscus	76	cii
vinum melites	121	xxi	vitis alba	104	cxviii
vinum melitites	119	viii	vitis nigra	115	cxv
vinum melomeli	121	xxii	vitis vinifera	117	i
vinum myrsinites	122	xxx	vitis sylvestris	117	ii
vinum myrtites	122	xxix	vite	23	cxviii

	Fol.	Cap.		Fol.	Cap.
vlmus	19	cxiii	ictus	151	iii
vnedo	27	clxvii	vua	117	iii
vnguentorum ratio	10	li	vua passa	117	iii
vnguentum nardinū	13	lxxiiii	vulpinus plumo	33	xl
vngula asini	33	xlvi	Xanthion	106	cxxxix
vngula capræ	33	xv	xylobalsamon	6	xxii
Volucrum	89	xvi	xylocinnamomum	5	xv
volucrum maius	89	xc	xyphion	90	xxiii
vrina	40	xcv	xyris	90	xxv
vrtica	101	xcvi	Zea	42	xcix
vrtica labeo	101		zithon	42	xcvii
vstio contra venenatos			zopissa	17	xcvi

F I N I S

Handwritten text in two columns, likely a list or index, with some numbers and names visible. The text is written in a cursive script and is somewhat faded.



Io. Oliuerius Abbas. S. Medardi sueffionensis Dio
scoridem a Io. Ruellio Latinū factum Alloquitur.
Carmen phaleucium Endecasyllabum

I secure liber, nec extimescas
Vulgi vaniloqui licentio rem
Nasum, Rhinocerote longiorem
Qui tātū soleat queatq; Rōchos
Spurcis ædere naribus tumentis,
Nec quicq; olfaciat bonū, vel altū,
Cum vires habeat nequaquā odoras
Ad florentia prata literarum,
Et gratas superis rosas olenteis,
Atq; ad pegasidōn amæna tempe,
Linguas nauciputa procaciorum,
Queis sublime nihil sapit, quibusq;
Infirmitas solidis cibis palatum,
Cœlestē Ambrosiā, deūq; Nectar
Ne gustare quidem parūper ausint.

I secure liber domos per omnes
Quæ musas redolent politiores,
Totus te chorus obuius sophorū
Plaudens excipiet, leget, fouebit,
Ornabit, venerabitur, coletq;
Ad cœlum efferet, et fauore multo
Consensuq; pari omniū probabit
Quin tu (crede mihi) licet pelasgōn
Pridem palliolo decorus esses
Vestitu latio magis placebis
Tectus Romulea toga quiritum,
Quam contexit inclytus Ruellus
Artis præoniæ decus Ruellus
Aequè rhetoricans vtrāq; lingua,
O Dioscorida, parens medelæ
Tu quantum vide debeas Ruello,
Qui te ex Helladico facit Latinū,
Quod debere sibi fatetur orbis
Totus, Nos quoq; gratulamur oēs
Testis Endecasyllabis ouantes.

F I N I S .

LIBER PRIMVS
PEDACII DIOSCORIDIS ANAZARBEI
DE MEDICINALI MATERIA LI-
BER PRIMVS, IOANNE
RVELLIO SVESSI-
ONENSI IN-
TERPRE-
TE.

Q Vamquam amicissime Ari, cōplures non veterum
modo, sed recentiorum quoq̃, de medicamentorum
compositione, viribus atq̃ probatione cōmmētati
sunt, nobis tamen nec vanum, nec a ratione abhor-
rentem impetum animi ad hoc opus incessisse, tibi
ostēdere tentabimus. Cum eorum nonnulli abso-
lutum nihil ædiderant, alij q̃ plurima quæ auditu
percunctando didicere, scriptis tradiderant. Siquidem Bithynus Io-
las & Heraclides Tarētinus omissa prorsus hærbarum tractatione,
rem sane q̃ paucis perstrinxerunt. Neq̃ vero oēs illi de metallicis quic-
q̃ rebus aut odoramētis memoriæ prodiderunt. Crateuas autem hær-
barius & Andreas medicus, qui cæteris diligentius hac in parte ver-
sati videntur, radices multas apprime vtileis, hærbasq̃, haudquaq̃ ad-
notatas reliquerūt. Nec sic quoq̃ prisci laude sua fraudādi sunt, quos
& si pauca ipsi referantur accepta, magnam tamen impendisse diligē-
tiam constat. Iuniorib⁹ minus assentiendum, e quibus Iulius Bassus,
& Niceratus, & Petronius niger, & Diodotus, Asclepiadæ omnes,
medicinalem materiā vernaculam cognitamq̃ vulgo dignam cēsue-
runt, quæ ab eis litteris exacte mandaretur, vt medicamentorum vires
probationesq̃ cursim complexi, sic nullo experimento eorum esse-
tus colligentes, inani vero reddendarum causarum studio verba fun-
dentes, alia pro alijs scriptitando, rē in aceruū congeriemq̃ extulerūt.
Siquidem qui inter eos egregius habetur Niger, Ephorbium nascē-
tis in Italia Chamelææ succum esse contendit. Androsæmonq̃ eam-
dem hærbam cū Hyperico esse. Quinetiam Aloen in Iudæa fossilem
nasci, et pleraq̃ his similia citra effectū explicationem exponit, quæ
prorsus veritati refragantur. Quibus cōiectura colligi potest, ea nō oc-
culata fide, sed narratione potius ab alijs accepisse. In ordine ijsdem
ipsi aberrarunt, partim eorum discrepāteis nullaq̃ cognatione cōiun-
ctas vireis collidentes, alij per elementa litterarum scripta in ordinem
digerētes, quo facilius memoriæ mandarētur, genera & eorū effectus a
sua cognatiōe disiūgētes. Nos vero ab icūte, vt ita dicā, iuuētute, iugi
a. j.

DE MEDICINALI MATERIA

desiderio cognoscendæ materiæ allekti, permultos mundi tractus peragravimus, nec enim nescis nos militarem vitam exegisse, tuoq; hortatu commentationē in sex libros contulimus. quod opus tibi dicam? Ari, grato nostro animo obsequētes, ob eum quo nos prosequeris affectum. Etenim natura cū in omnis eruditione excultos, tum vero in eos quis cum tibi eiusdem artis necessitudo intercedit, pronus ad amicitiam esse soles. in nos etiam aliquanto peculiaris. Enimvero non paruum præbet tuæ probitatis argumentum, optimi viri Licinij Bassi singularis erga te charitas, quam vna degentes nouimus, cum mutuam inter vos beneuolentiam æmulatione dignam intueremur. Admonitum autem te velim, eosq; qui in commentarios nostros incident, vt ne in verbis facultatem nostram æstimetis, sed potius adhibitam rebus cum peritia curam. Etenim partim res oculis subiectas exactissime cognouimus, partim narratione omnibus consona, indagationeq; rerū apud singulos vernacularum diligenter accepimus. Dabimus igitur operā vt differenti ab alijs ordine vtentes, genera medicinarum viresq; describamus. Quod autē necessaria sit medicamentorum ratio, nemo est ferme qui ignoret. q̃ ea & toti arti coniuncta sit, et ab ea expugnandis membratim vitijs remedia petantur. Quare per medicamentorum compositiones atq; misturas & facta in morbis pericula extendi, & incrementum capessere potest, q̃ plurimum opitulante singulorum medicaminū cognitione. Quinetiam vernaculam familiaremq; materiam complectemur, vt perfecta sint quæ scriptis relinquemus. Verum imprimis curam impendere oportet, vt suis temporibus singula & demetatur et recondantur. Intempestiue enim decerpta conditave, aut nullo aut euano muniere funguntur. Serena etenim cœli constitutione demetenda sunt. Magni siquidem refert inter colligendum, si vel squallores vel imbres infesti sint. quemadmodum si loca in quibus prodeunt cliuosa, & ventis exposita sint & perflata, frigidaq; & aquis carentia. in his enim locis vires eorum longe validiores intelliguntur. Cōtra, quæ i campis, sribus, riguis & opacis, cæterisq; locis a vëto silentibus enascuntur, plerumq; degenerant, & minus viribus valent. multoq; magis si non suis horis peropportune colligantur, aut si per imbecillitatem intabuerint. Neq; ignorandum q̃ sepe præcoci aut serotina loci natura, aut anni clementia, maturius aut celerius adolefcunt. Nōnulla propria vi hyeme florent & folia pariunt. quædam bis anno florifera. Quare cui in animo est horum peritiam assequi, necesse est ijs prima germinatione solo emergentibus, adultis, et senescentibus adesse. Nam qui pullulāti hæbæ dūtaxat asiterit, adultā cognoscere nō potest. neq; q̃ adultā tātū inspexerit, nup̃ erūpētē noscet. Quo fit vt ppter mutatā foliorū faciē, cauli

LIBER PRIMVS

2

um proceritates, florum seminisq; magnitudinem, nonnulli qui olim has ætatum varietates non perspexerunt, magno in errore versentur. Quæ causa etiam nonnullis scriptoribus imposuit, qui hærbas quasdam, verbi gratia gramen, quinquefolium, & tussilaginem, emittere florem, fructum et caulem, negant. Ergo qui sæpius ad visendas hærbas & earum loca se contulerit, earum cognitionem maxime consequetur. Scire etiamnum conuenit, sola ex hærbaceis medicaminibus veratri genera, nigrum inquam & candidum, multis edurare annis. reliqua a trimatu inutilia. Quæ vero ramis scatent sicut stichas, trixago, polium, abrotonum, seriphum, absinthium, hyssopum, & alia id genus semine prægnantia demetantur. Flores quoque antea quam sponte sua decidant. Fructus autem vt maturi excutiantur necesse est. & semina vbi ficcari cœperint, priusquam defluant. Hærbarum succus, & foliorum elici debet, germinantibus adhuc cauliculis. Lac et lachrymæ excipiantur, inciso per adolescentiam caule. Radices, & liquamenta, corticesve vt recondantur eximere conuenit. cum hærbæ suis folijs exuuntur. Siccantur etiam expurgatæ inibi, locis asperginem non redolentibus. sed quæ luto aut puluere sunt oblitæ aqua elui debent. Flores & omnia quæ iucundum odorem efflant, arculis tiliaceis nullo situ obductis reponantur. Nonnunquam charta aut folijs semina vt perennent, apte inuoluuntur. Liquidis medicaminibus densior materia argentea, vitrea, aut cornea, conuenit.

Fistilis etiam si modo rara non sit, accommodatur. & li-

gnea præsertim e buxo. sed ænea vasa liquidis

oculorū medicamentis, quæ aceto, pice

liquida, aut cedria, componuntur.

Adipem autem & medul-

las stagnis vasis

recondi con-

uenit.

a.ij.

DE MEDICINALI MATERIA

De Iri

CAP. I.

i Ris ab aliquibus illyrica, ab alijs thelpide, ab alijs vrania, a nonnullis cathæron aut thaumastos, a romanis marica radix, a quibusdā gladiola, ab alijs cōsecratix, ab ægyptijs nar appellat. A cœlestis arcus similitudine nomē accepit. Folia fert gladiolæ, sed maiora, latiora, et p̄guiora. Flores sūmo caule, alterno situ icurui euariāt. Siq̄dē cādidi, pallētes, lutei, purpurei, aut cerulei cōspiciunt. q̄ diuersi coloris specie, quædā cœlestis arcus imago representari videt. Radices subiacēt geniculatæ, duræ, odoratæ. quæ frustatim dissectæ, in vmbra siccantur, & traiectæ lino recōduntur. Melior est illyrica, & macedonica, et inter has laudatissima, quæ pumili fere & densa cōstat radice, frāgenti cōtumax, subruffa colore, gustu amaro, odore perq̄ suauis, ac syncæro, ita vt nullū pr̄sus sitū redoleat. quæ dū tundit, sternutamenta mouet. Secundū locū habet africana, candida, gustuq̄ amara. Terebines in vetustate sentiūt, tūc tñ odoratiores reddi solent. Vis oībus excafactoria, extenuās, cōtra tussim efficax, humorū qui ægre reijciunt crassitiē digerūt. Bilē, crassamq̄ pituitā ex hydromelite drachmis septē potæ purgāt. Sōnū cōciliāt. Lachrymas ciūt. Torminib⁹ medentur. Eadē potæ ex aceto auxiliant serpentiū idib⁹, lienosis, conuulsis, a vento refrigeratis aut rigentibus, & quib⁹ genitura effluit. Menses, ex vino potæ pellūt. Decoctū earū, fœminarū fotib⁹ vtiliter imponitur, ad emolliēdos locos, laxandaq̄ in eis venarū spiracula. Ischiadicis ifunditur. Fistulas ac sinus carne explet. Radices ex melle glandis modo subditæ partus extrahūt. Quietiā cōctæ & illitæ, strumas, veteresq̄ duricias emolliunt. Siccæ quoq̄ vlcera replent, & cum melle purgant. Nudata ossa corpore operiūt. Doloribus capitis, cum aceto & rosaceo magna vtilitate illinuntur. Admotæ cū albo veratro, & duabus mellis partibus, lentigines & vitia cutis in facie emaculāt. Pessis, malagmatis, & acopis inferuntur. In vniuersum magni ad oīa vsus.

De Acoro

CAP. II.

a galanga. Corū aliqui chorō aphrodisias, romani venereā aut radicem nauticā, galli piper aqueū vocāt. Folia iridis habet, angustiora tamē. Radices nō dissimiles, cōplicas, non in rectū sed obliquū tendentes, & summo cespite sparsas, geniculis iteceptas, albicantes, gustu acres, odore nō ingratas. Optimū est dēsum, candidū, plenū, nō exesum, odoratū, cuiusmodi colchidicū & galaticū quod aspletiō dicūt. Radici vis calfactoria. Decoctū potu vrinā cit. Prodest lateris dolorib⁹, & iocineris, atq̄ pectoris. Item torminibus, vulsis, ruptis. Lienem absumit. Vrinæ stillicidio & serpentum idibus auxiliatur.

LIBER PRIMVS

Ad muliebres infessus iridis modo vtiliter imponitur. Oculorum caligines succo discutit. Antidotis radix magno vsu commiscetur.

De Meo

CAP. III.

m Eon quod athamanticum vocant, in macedonia & hispania plurimū gignit, anetho folijs & caule simile, sed eo crassius. binum ferme cubitorum altitudine attollitur, sparsis in obliquum rectumque radicibus, longis, tenuibus, odoratis, linguam exalfacientibus. Quæ feruefactæ ex aqua, vel tritæ citra coctionem, præclusorū renū vesicæque farctæ vitia potu leniūt. Vrinę difficultati medetur. Stomachi inflationes discutiūt. Torminib⁹, cōmotæ vuluæ, articulorū dolorib⁹, atque fluxiōib⁹ pectoris, tritæ cū melle in eļegmate auxilianf. Sanguinē per mēstrua pellūt, deflectionib⁹ feruefactæ. Infantib⁹ autē illitæ imo vētri, vrinās mouent. q̄ si plus q̄ deceat ex his bibatur, caput dolore afficiunt.

De Cypiro

CAP. IIII.

c ypirus quē aliqui eryfisceptrū, vt aspalathū appellant, romani iunci radicē aut iuncū, folia fert porraceis pxima, sed longiora & exiliora. Caulē odorati iunci, cubitalē aut maiore, angulosum. In cui⁹ cacumine minuta folia cū semine exoriunt. Radices quarū i medicina est vsus, cōtiguis iter se oleis oblōgis rotūdisve similes, nigro colore, suauī odore, amaro gustu. In lacunosis et palustribus nascit. Optima est grauissima, densa, fractu cōtumax, plena & aspera, odoris cū quadā acrimonia iucundi, qualis est cilicia, syriaca, & quæ a cicladib⁹ ifulis petit. Huic calida vis inest. Venarū spiracula laxat. Vrinā ciet. Ad calculos, aquāque subtercutē vtilissime bibif. Aduersus scorpionū ict⁹ remedio est. Perfrictionib⁹ vuluæ, & præclusionibus, fotu pdest. Pellit mēses. Cōtra vlcera oris etiā si depascāt vorētque, farina ei⁹ efficax est. Malagmatis calfacientib⁹, & vnguētorū spissamentis adijci solet. Aliud cypirigen⁹ tradūt in india nasci gingiberis effigie, qd māducatū croci vi reddit. & illitū præsentē philotri vi exhibet.

De Cardamomo

CAP. V.

c Ardamomum optimū est, quod ex comagene, armenia, bosphoroque deuehit. In india quoque et arabia puenit. Eligi debet plenū, frangēti cōtumax, cōtradū. quod enī h̄mōi nō est, intē pestiuū iudicat. et gustu acre, subamarū, & odore caput tentās. Excalfactoriā vi habet. Potūque ex aq̄ facit ad comitiales, ischiadicos, tusses, neruorū resolutionē. Itē ad rupta, vulsa, tormina. Latas vētris tineas excutit. Ex vino aut potū renib⁹, difficultati vrinæ, a scorpione ictis, neque nō oībus venenū vibrantib⁹, auxilio est. Cū cortice radicis lauri epota drachma calculos comminuit. Partus suffitu enecat. Scabiem ex aceto illitum adimit. Et ad vnguētorū spissamenta additur.

a. iij.

DE MEDICINALI MATERIA

De Nardo

CAP. VI.

d Vo nardi genera. vnū indicum, alterum Syriacum appellatur. Nō quod i syria proueniat, sed quod mōtis in quo oriē, pars vna ad syrios, pars altera ad indos flectit. Ex hoc syriaci genere præcipuū est recēs & leue, largā gerens comā, flauū colore, perq̄ odoratū, ac cyperū redolēs, breui spica, amaro sapore linguā ficcāte, quod diu in sua odoris gratia permaneat. Ex indicis autē nardū quoddā Gangitis vocat a fluuio Gange apud quē enascit, montē præterfluēte. quod gen^o ob multā loci in quo prodit vlginē, virib^o infirmius est, atq; pceri^o adolefcit, oppletas ferēs spicas, ab radice comatas, vnaq; cōuolutas, ac grauit̄ olētes. Montanū autē odorati^o, spica breui, odore cypero vicino, ceteras habēs syriaci dotes. Est & gen^o quoddā, cui sampharitico nomen locus indidit, frutice breui, in magnas se spargens spicas, cādidiore caule, hircorū virus supra modū redolēte. quod improbat̄. Madefactū vēdi solet, quod vitiū ex eo deprehendit, q̄ candida sit spica & squalida, nulloq; puluere obfita. Adulteratur stilbio cū aqua aut palmeo vino, inspissationis pōderisq; causa ispirato. Intueri autē oportet si lutū radicibus infideat, et incerniculo puluerem excutere, eluendis manib^o vtilē. Vim habēt excafactoriā & exiccantē. Vrinā mouēt. Aluū potu sistūt. Vulgē profluuiā, saniēq; apposita supprimūt. Nauseę ex aqua frigida auxiliantur. & cardiacis, inflationi, iocineri, regio morbo, renū vitijs. Aquę autē incoctę fotu ad inieffum, vulgē inflammationib^o medēt̄. Ad glabras oculorū genas valēt. siquī dē eas ad denfiore pilū reducūt. Perfusis humore corporib^o insparguntur. Miscenē ātidoris, & i fiftili nō picato ad ocularia medicamēta reconduntur, trita in farinam, & cum vino in pastillos coacta.

De Nardo Celtico

CAP. VII.

c Elticū nardū nascitur in ligurię alpibus, salīūca patrio nomine appellatū. Prouenitq; in istria. Exigue fruticat, & cū radice velliē. Alligat̄ manualibus fasciculis, manipulatimq; cōponitur. Folia habet oblonga, colore in flauum languido. Florē luteū. Foliorū ac cauliculorū dumtaxat vsus est, & odoris suauitas. Vnde pri die fasciculos aqua abluere expedit, & exēpta terra pauito solo atq; hu mēti subiecta charta reponere, postridie repurgare. siquidē vtile ab ace roso, alienoq; ppter humoris vī, nō excutitur. Adulteraē iposita hærba simili, quę hircul^o vocat̄ ab odoris grauitate. sed facilis cognitio. Nāq; herba cādidiore est, sine cauliculo, minoribus folijs. Radice neq; amara neq; odorata, vti verū nardum est. Itaq; radices atq; cauliculi, abiectis folijs triti, vino excipiūt̄, digerunturq; in pastillos, & ita fiftili nouo diligenter operto, asseruari debent. Laudatur maxime recens, iucundi

LIBER PRIMVS

4

odoris, radice numerosa coherens, plenum, nec fragile. Ad eadem quæ syriacū pollet, sed vehemētius vrinam cit, et stomacho vtilius est. In inflammationibus iocineris, & felle suffusus auxiliatur. Cōtra stomachi inflammationes, cum absinthij decocto bibitur. Item aduersus lienem, renum et vesicæ vitia, & venenatos ictus ex vino. Additur in malagmata, potiones, & calfacientia vnguenta.

De montano Nardo

CAP. VIII.

m Ontanum Nardū, quod ab aliquibus Thylachitis & Niris appellatur, in Ciliciā et syria nascitur, caule et folijs Eryngio similibus, minoribus, minime tamē spinosis asperisq̃. Radicibus binis nititur, aut pluribus, nigris, odoratis, ceu hastulæ regiæ, sed longe gracilioribus, & exilioribus. Neq̃ caulē neq̃ fructum neq̃ florem profert, ad eadem quæ celticum efficax.

De Asaro

CAP. IX.

a Sarum, quod & ipsum aliqui sylvestre nardū appellāt, magis sanguinem martis, Latini perpensam, alij bachar, Osthantesam, Aegyptij cerea, alij Nardum rusticū, Galli Bachar, Aethrusci succinū. Odorata herba est, qua i coronamētis vtunt, hederæ folijs, minorib⁹ multo, rotundioribusq̃, floribus cytini hyoscyami, purpureis, inter folia proxime radicē emicantibus, odoratis in quibus semen acinosum. Cauliculos habet angulosos, asperos & molles. Radices numerosas, geniculatas, tenues, obliquas, graminī nō dissimiles, longe tamē graciliores, odoratas, quibus odor inest cinnamomo proximus. Asperū siccumq̃ solum amat. Eius radix, ruptis, conuulsis, i tussi vetere, & spirādi difficultate, & si vrina ægre redditur, opifera est. Menses ciet. Contra serpentū ictus, eam in vino bibere salutare est. Folia, vt quæ astringant, illita, capitis doloribus, oculorū inflammationibus, incipientibus ægilopijs, māmīs tumētibus a partu, ignibus sacris auxiliantur. Odor somnū gignit. Crateuas hærbari⁹ de eo ita scriptū reliquit. Asarum ex calidiorā vim habet. Vrinā cit. Hydropicis, & vetusto coxēdicum dolori prodest. Radices senis drachmis ex aqua mulsa potæ, menses trahunt, & veratri albi modo purgant. In vnguenta additur. Umbrosis montibus prouenit, sed plurimum in ponto, phrygia, illirycō, & italiæ iustiniensi agro.

De Phu

CAP. X.

p Hu, quod & aliqui sylvestre nardū appellant, nascitur in ponto, folio olusatri, aut elaphobosci, caule cubitali, aut altiore, læui, cauo, molli, in purpuram vergente, geniculis intercepto. Floribus narcisso pximis, maioribus, teneris, & in albicāte purpureis. Radice superi⁹ ad adigiti minoris crassitudinē, ex obliquo villosa

a. iij.

DE MEDICINALI MATERIA

in nigri veratri, aut iunci odorati modū, capillamētis inuicē cōtextis, flauescētibus, odoratis, cū quadā odoris grauitate nardū emulantibus. Excalfacit. Vrinam mouet, si sicca potui detur. Decoctum eadem præstare potest, ad lateris etiam dolorē efficax. Menses cit. Antidotis inferitur. Adulteratur radice rusci ammixta, sed maleficium depræhenditur, qm̄ hæc dura est, & frangēti contumax, sine vlla odoris gratia.

De Malabathro

Cap. XI.

Alabathrum arbitratur aliqui esse indici nardi folium, falsi
m quadam odoris cognatione, permulta enim nardū olent, quæ admodum phū, Asarum, Niris, secus autem res se habet. Nāq; malabathrum foliū sui generis est, quod idicā gignunt paludes, lentis palustris modo innatans aquis, sine radice. Id collectū statim li- no transsuietur, & siccatum reconditur. Tradunt siccatis æstiuo feruore aquis, humū aridis fruticibus vri, quod vbi non euenerit, ne amplius quidem renasci. Laudatur recēs, cū nigredine quadā candicās, integrū, nec fragile, odore caput feriens, quod diu insuauī odore permaneat, & nardū sapore imitetur, nullo salis gustu. Infirmū vero & minutim con- tusum, præsertim si cariosum virus olet, viciosum est. Easde nardo for- titur vires, sed efficacius omnia præstat. Vrinam vehementius ciet, ac stomacho magis prodest, malabathri vis. Lippitudinibus, inflāmati- nibusq; tritū et in vino feruescētū cōmode illinitur. Subditum linguæ, oris halitū & suauitatem cōmendat. Vestitū quoq; odorē interpositum seruat, & ab erosione tuetur.

De Casia

CAP. XII.

Casia, cuius complura sunt genera, iuxta odoriferam arabiam
c gignitur, crassi corticis sarmento, folijs piperis. Eligenda est fuluescens, pulchri coloris, coralij æmula, perq̄ angusta, lon- ga, crassa, & fistulosa, gustu mordēs, & cum aliquāto feruore astringens, aromatica, vinoso odore, cuiusmodi est quæ ab incolis achy appellat, ab alexādrīæ negociatoribus, daphnitis. Huic præfertur crassa, purpu- rea, et nigricans, zigir cognomine, quæ rosam odore imitatur, præci- pui in medicina vsus. Secundū locum tenet antedicta. Tertia, cui musca- letico blasto cognomen est. Reliquæ viles, et quæ Aphemum dicitur, nigra, insuauis, cortice tenui, ac rimoso, & quam darcam & citton vo- cant barbaro nomine.

De Pseudocasia

CAP. XIII.

Imilior huic est pseudocasia, q̄ vt explicari possit, quæ gustu
f coarguitur, cum nec acris, nec odorata sit, hærentemq; medul- læ corticē habeat. Inuenitur etiam lata quædam fistula, mol- lis, leuis, plena, ab alia distans. Dānatur candicās, scabra, hircinum vi-

LIBER PRIMVS

rus redolens, & quæ tenui fistula & scabra cute fit. Vim obtinet calfaciendi, vrinam ciendi, siccandi, & leniter alstringendi. Conuenit ad medicamenta oculorum & malagmata, quæ præstandæ claritatis gratia concinnantur. Lentigines tollit, cum melle illita. Menses trahit. Contra viperarum ictus pota auxiliatur. Aduersus intestinas inflammationes omnibus, et renū vicia, pota proficit. Fœminis in solia desidētibus, aut suffragamentis, prodest ad dilationē vuluæ. Ea duplo pondere medicamenti mixta, cinamomi vicem supplet. Nam eisdem effectus præbet, ad plurima perq̃ utilis.

De Cinnamomo

CAP. XIII.

Innamomi genera plura patrium sibi nomē vendicātia. Præfertur tamen mosyllum, quod casia cui mosyliti nomē est, aliam quam referat effigiem. Sed in eo genere, recens, nigrum, ex vino in cinereū vergens, læue, tenuibus ramulis, ac frequentibus nodis cinctum, perq̃ iucunde olens. Optimi fere temperamentum, odoris proprietate cōstat. Inuenitur enim in optimo, quodq̃ seorsum nascit̃, odor cardamomo proximus. Insuper, acre & mordēs et cū calfactione quadā tenuis salsum, quod non cito confricāti hirsutū, aut friāti lanuginosum, læuibus tamē internodijs appareat. Si certior fieri voles, vellito ab radice furculum, facilis est huiusmodi probatio. Nāq̃ fragmenta, adiecticia quædam sunt. Quæ autem potētius spirant, suo halitu cum nares consuluntur olfactū expleant, deterioris dignotionem impediunt. Est etiānum Montanū, crassum, pumile, fuluescēs admodū. Tertium a mosylo, perq̃ suauiter olet, nigrum, fruticosum, paucis intercedentibus geniculis. Quartū, fungosum, candicans, aspectu tuberosum, vile, ac friabile, magnā habens radicem, casiam plane representantē. Quintum genus, gustu amarum, et cortice fuluæ casie simile, tangētī firmum, minus neruosum, densa radice firmatum. Ijs quæ thuris, casia aut amomi odorem spirant, minus suauitatis inest. Deligito scabrum, rugosum, læue, lignosum. Radicem autem vt inutilem reijcito.

De pseudocinnamo

CAP. XV.

Stetiānum gen^o aliud, cui pseudocinnamo cognomē est. Inualidi odoris, solutarumq̃ virium. Vocatur etiam zyngyber, cū tamen fit xylocinnamomū, præbēs quandam cinnamomi faciem. Est autem lignosum cinnamomū, sarmēta longa robustaq̃ ferēs, odore longe cinamomo inferiore. Sūt qui xylocinnamomū, a cinamomo differre dicant, q̃ a natura eius abhorreat. Cinamomum omne ex calfacit, emollit, et cōcoquit. Vrinā ciet. Tam mēses quam partus potū aut ex myrrha impositū pellit. Cōtra bestias quæ virus eiaculātur, venenāq̃ cōuenit. Caliginē pupillis oculorū obuersantē discutit. Crassiti-

DE MEDICINALI MATERIA

em extenuat. Lentigines & vitia cutis in facie ex melle illitum detergit. Contra tusses, defluxiones, aquam subter cutē fusam, renū vitia, et vrinæ difficultatē efficax est. Vnguētis preciosis inseri solet. & in summa, magni ad omnia vsus. Tritum vino excipitur, vmbraque fīccatū, quo diutius eduret, recōditur. Est & quoddam cinamomum, quod aliqui pseudocinamomum appellant, perq̄ denso atq; crasso sarmēto, longe tamen inualidius cinnamomo, & odore & gustu.

De Amomo.

CAP. XVI.

Momum exigue fruticat, ex ligno se conuoluens in vix modum, flore ceu candidæ violæ, paruo, folijs vitis albæ similibus. Laudatur q̄ maxime armeniacū, fuluo auri colore, ligno subruffo, valde odorato. Medicū, quoniā in campestrib⁹ et aquosis nascitur, infirmius esse cōstat. Est autem magnum, subuiride, tactu molli, frutice venoso, odore origani. Pōticum vero subruffum, parū, fragile, racemosum, fructu turgens, & odore nares feriens. Deligito recens, candidū vel subrubrū, quod nec astrictū cohæreat, nec cōuoluatur, sed solutū diffundatur, seminis plenū, vix paruis simile, graue, odoratū, modo cariē non contraxerit, acre, gustu mordens, simplici colore non euariante. Vim habet calfaciendi, astringēdi, exiccādi. Somnum allicit, & illitū frōti, doloris sensum aufert. Inflammationes & meliceridas concoquit, discutitq; Iuuat quos scorpius percussit, ex ocymo illitū. Et podagricis confert. Inflammationes oculorū viscerūq; lenit ex vix passa. Ad vuluarum vitia in pessis, aut in fessionibus vtile est. Decoctum iocineri, renibus, podagræ, potu conuenit. Antidotis immiscetur, & preciosis vnguētis. Adulteratur hærba amomo simili, quæ Amomis vocatur, sed sine odore, sine fructu. Nascitur in armenia, flore origani. Quare i huiusmodi probationibus fragmēta fugiēda sunt. Eligēda autem quæ ab vna radice integros surculos emittunt.

De Costo

CAP. XVII.

Racellit Arabicus candidus, levis, eximia odoris suauitate. Secundū locum sibi vendicat indicus, levis, plenus, vt ferula niger. Tertius est syriacus, grauis, colore buxeus, & odore feriens. Optimus est recens, albus, abūde plenus, densus, a teredinibus non erosus, sine graueolentia, gustu calidus ac mordens. Vis ei ex calfaetoria. Vrinā ciēt. Menses pellit. Vitijs quæ vuluā male habēt, tam imposito q̄ fotu auxiliatur. Contra viperarum morsus sextātem bibere prodest. Item aduersus pectoris dolores, conuulsa, inflationesq; ex vix no & absinthio. Venerē ex mulso stimulat. Laras vētris tineas ex aqua pellit. Rigentibus, ex oleo, ante febrium significationes, & neruorū resolutionibus oblinitur. Vitia cutis in facie, cum aqua vel melle illitus

emēdat. Additur ī ātidota & malagmata. Sunt qui āmistis helenij co-
mageni p̄duris radicibus, adulterent. quod deprehensu facile est. Si
quidem neq; gustu feruet helenium, neq; validum odorem vibrat, vt ca-
put tentare possit.

De odorato Iunco

CAP. XVIII.

Doratus Iuncus, in africa & arabia nascitur. Laudatissimus
o ex nabathea, Proxim^o arabicus, quē aliqui babylonium co-
gnominant. Alij teuchitin. Pessimus ex africa. Eligendus est
ruffus, recens, floribus refertus, tenuis, rubētibus fragmentis, qui ma-
nibus cōfricādo rosę odorem emittit. Igneq; mordacitatis ad linguā.
Floris & arundinū radicisq; est vsus. Vim vrine ciundē habet. Men-
ses pellit. Discutit īflationes. Caput aggrauat. Modice astringit, com-
minuit, excoquit, ac venarum spiracula laxat. Vrinā mouet. Flos eius
in potu utilis sanguinē reiicientibus, doloribus stomachi, pulmonis,
iocineris, & renū. Misceat ātidotis. Radix astrigētior est. Ideo fastidi-
is stomachi, hydropicis, conuulsis, cū pari pōdere piperis, per dies ali-
quot dat. Decoctū vulgū īflāmationib⁹, ad desidentiū for⁹, vtile est.

De Calamo odorato

CAP. XIX.

Alamus odoratus in india nascitur. Nelior est fuluus dense
c geniculat⁹, et qui assulose frangitur, plena araneorū fistula, al-
bicās, lentus in mandendo, & astringens, ac cum aliquantā
acrimonia amarus. Vrinā potu ciet, quare cum graminis aut apii semi-
ne coctus, ī aque subter cutē fuscę morbo, renū vitiis, stillicidio vrine,
ruptisq; cōmode bibitur. Menses et potu & appositu pellit. Tussi sus-
fitu medetur per se, aut ex resina terebithina, hausto per arundinem fu-
mo. Ad muliebres infessus decoquitur. Et clysterib⁹ imponitur. Suffi-
tionibus, malagmatiscq; odoris gratia commiscetur.

De Balsamo

CAP. XX.

Alsamum, arbor albę violę, lycij, aut pyrachāthę magnitu-
b dine conspicitur. Foliū rutę proximū, longe candidius, per
petuo virens, in iudea solum quadā valle & ægypto nascēs.
Iis differens modis, scabricia, proceritate, gracilitate, quod igitur tenui
& capillacea coma est, theristū vocant, quasi demessile. Fortassis quon-
niā ob gracilitatem facile demetatur.

De Opobalsamo.

CAP. XXI.

Estiuus sub ortu canis ardorib⁹, arbor vnguibus ferreis in-
a ciditur, manatq; e plaga succus, quem opobalsamū vocant.
sed tā exiguo stillatu, vt annis singulis, ne plures quidem q̄
feni septenive congiij cogantur. Inibiq; pondus, duplo repēditur argē-
to. Succī probatio est, vt sit recens, validi odoris, syncerus, nō ad aco-

DE MEDICINALI MATERIA

rem vergens, pellucidus, lævis, astringens, ac modice mordens gustu. Sed varie vitiat, misto ab aliquib⁹ terebithi, cypri, lētisci, balani vnguento. Itē fusino, metopio, melle, aut cypria cera, quod maleficiū facile depræhenditur. Namq; merus in laneā vellem fusus, neq; maculā facit, neq; si eluatur notā reliquit. Vitiatus autē inhæret, & lac instillat⁹ coagulat, quod adulterat⁹ non efficit. Quētiā syncærus in aqua aut lacte celerrime liquatur lactescitq;. Vitiat⁹ vero olei modo innatat, se cōuoluens, aut in stellæ modū diffundēs. Syncæ⁹ senescens crassescit, deteriorq; redditur. Allucinant^r qui aqua concretū pessum ire, & ad ima fidere arbitrantur, postea dissipatū supernatare.

De Xylobalsamo

CAP. XXII.

Ligni genere quod xylobalsamū vocant pbatur recens, tenue, fuluū, odoratum, quadā tenus opobalsamū spirans. Necessari⁹ etiā seminis erumpit vsus. Quare eligatur flauū, plenum, grande, ponderosum, mordens gustu, feruens in ore, modice opobalsamū olens. Adulteratur semine hyperico simili, quod a petra oppido defertur. Sed coarguitur magnitudine, inanitate, viriū ignauia, sapore piperis. Efficacissima vis inest succo, & q̄ maxime calcaciēs. Abstergit, quæ tenebras, oculorum pupillis offundūt. Medetur perfrictionibus vuluæ, cum rosaceo cærato appositus. Menses quoq; secundas, & part⁹ extrahit. Rigores illitu discutit. Vlcera sordida expurgat, & cruda cōcoquit. Vrinā potu ciet. Aegre spirātibus prodest. Datur in lacte contra aconitū hauistū, aut serpentii iētus. Miscetur acopis, malagmatibus, & antidotis. In summa, præcipua autoritas succo, secūda semini, minima ligno. Semen cōmode potui datur doloribus lateris, pulmonum vitijs, tussi, ischiadicis, comitialibus, vertiginosis, orthopnoicis, vrinæ difficultati, torminibus, ac serpentum moribus. Ad muliebres suffitus perq̄ vtile est. Vuluā aperit in defensionibus balnearū decoctū, & humorē euocat. Lignū easdem habet vires aliquāto minores. Ex aqua potum cruditatib⁹, torminosis, vulsis, venenatorū iētibus opitulatur. Vrinā cit. Ad capitis vulnera cum ficca iri cōuenit. Squāmas ossium extrahit. Et ad vnguentorū spissamenta additur.

De Aspalatho

CAP. XXIII.

Spalathus quem alij Erysiceptron, alij phasganon, Syrii diaxylon vocant, frutex est furculosus, multis spinis horrens. Nascitur in istro, nisyro, syria, & rhodiorū insula, quo ad vnguentorū spissamēta pigmentarij vtuntur. Optimus est grauis, detractō cortice rubens, aut in purpuram vergēs, odoratus, gustatu amarus. Est & alterum genus candidū, lignosum, sine odore, quod deterius habetur. Vim calcificandi cū asfrictione obtinet. Vnde decoctū cum vino

ad oris vlcera colluenda conuenit. Ad nomas genitaliũ & sordida vl-
cera infunditur. Subiectum in pefso, partum extrahit. Aluum fistit
eius decoctum. Et sanguinis reiectionem potu cohibet. Vrinæ difficul-
tatem inflationeſq; diſcutit.

De Muſco

CAP. XXIIII.

b Ryo id eſt muſc^o, a quibuſdā ſplachnō appellatur. In cedro
arbore, populo alba, & quercu inuenitur. Optimum eſt cedri
nū. Proximum populneū. In quo genere candidum & odo-
ratiuſ præſtat, nigricans improbatur. Aſtringendi vim habet. Decoctū
infidentium vuluiſ vtile. Vnguento balanino, oleiſq; inſpiſſandi gra-
tia inferitur. thymiamatum, acoporūq; cōpoſitionibuſ conueniens.

De Agallocho

CAP. XXV.

a Gallochū, lignum eſt quod ex india atq; arabia deportatur.
thuiæ ligno ſimile, maculatum, odoratum, guſtu aſtringens,
cum quadam amaritudine. cute veſtitur aliqtulum verſico-
lore. Manditur, aut decocto os colluitur, cōmendandi halituſ gratia.
Sudores arcet toto corpori inſparſum. Pro thure ad ſuffimenta ſubſti-
tuitur. Radix epota drachmæ vni^o pōdere, humida ſtomachi vitia, &
imbecillitatē, feruorēq; mulcet. Si lateriſ, iocineriſve dolor excruciat,
ſi dyſenteria, aut tormina infeſtant, ex aqua bibere prodeſt.

De Narcaphtho

CAP. XXVI.

n Arcaphthum ex india deſertur, corticoſum, ſimile ſycomo-
ri libro, quod iucundi odoris gratia ſuffitur. Miſcetur thy-
miamatiſ cōpoſitiſ. Cōſtrictionibuſ vuluæ ſuffitu prodeſt.

De Cancamo.

CAP. XXVII.

c Ancamum arabici ligni lachryma eſt, myrrhæ quodammo-
do ſimiliſ, olidi guſtuſ, quā ad ſuffimenta uſurpant. Veſteſ
eo ex ſtyrace & myrrha ſuffiuntur. Vim proditur obtinere
extenuandi obefoſ, ſi ternum obolorum pōdere ex aqua, aut mulſo ace-
to, aliquot dieſ ebibatur. Lienofiſ datur, comitialibuſ, & ſuſpirioſiſ.
Menſeſ cum aqua mulſa pellit. Oculorū cicatriceſ conſeſtim emēdat.
Vino madefactum medetur eorū dē hebetudinibuſ. Aduerſuſ gin-
giuaſ humore prægnāteſ, doloreſq; dentium, non aliud efficaciuſ.

De Cyphi

CAP. XXVIII.

c yphi thymiamatiſ cōpoſitio eſt, dicata diſ, qua ab ſcēde ægy-
pti ſacerdoſeſ vtūtur. In antidota miſceri ſolet. Suſpirioſiſ
datur i potu. Permultæ cōponēdi rationeſ, quarū vna hæc
eſt. Sumitur cyperi dimidium ſextariū, cum pari iuniperi adultæ mo-
do, vuæ paſſæ pinguiſ, exemptiſ vinaceiſ, minas duodecim, reſinæ re-
purgatæ minas quinq; calami & iunci odoratorum & aſpalathi, ſingu-

DE MEDICINALI MATERIA

lorum minā. myrrhæ duodecim. vini veteris sextarios nouem, cū duabus mellis minis. vuam detractis vinaceis tufam, cū vino & myrrha subigito. cætera tufa & cribrata adijcito. die vno humorē cōbibere finito. dein mel coquito, dum sibi glutinis asciscat crassitudinē. eliquatam refinā accuratæ permisceto cum reliquis diligenter contritis, & in fictiæ le vas recondito.

De Croco CAP. XXIX.

c Rocum ab aliquib⁹ castor, ab alijs cynomorphos, a magis herculis sanguis appellat^r. Optimū in medēdi vsu coryceū, recēs, & boni coloris, paulū cādidi gerēs in capreolo, ob lō gum, oib⁹ suis partibus constās, nō fragile, plenū, a quo detractū est nī chil, quod madefactas manus inficit, nec firū redolet, aut cariem sentit, subacre. Sin hui⁹ generis nō est, aut vetus, aut humore perfusum creditur. Secūdus locus datur coryceo, e tractu lyciæ cōtermino. Terti⁹ lycio e mōte olympo. dein ex ægibus ætolix. Cyrenaicum e centoria, inter sicilica omnia viribus præstat. Omniū ad obsonia vsus. Itali tamē ob succi copiam, & coloris venustatē, ad thuiæ infectus vsurparūt, quibus de causis magno venditur. Vtilissimū in medicina quod ante descripsimus. Adulteratur inmixto crocomagmate tuso, atq; etiā sapæ subtili, contrita, quo pōdus adijciatur, simul argēti spuma, aut plū bagine. Sed maleficiū declarat insidens puluis, præsertim si sapam oleat. Thessalus ipsum tantū odoratum esse voluit. Alij exitiosum, tribus drachmis ex aqua potis. Proculdubio vim coquendi, emolliendi, atq; substringendi habet. Vrinā cit. Elegātem colorē præstat. Qui ex passo biberint, crapulā non sentiēt. Oculorum fluctiones illitum cum humano lacte, cohibet. Additur in potiones, quæ interaneorum causa temperantur. Ad vuluæ etiā, sedisq; cataplasmata, commode permiscetur. Venerem stimulat. Vergentes ad ignem sacrū inflāmationes mulcet. Auricularijs collectionibus vtile. Quo facilius cōteratur, in calido fidiili sole ficcari oportet, celeriterq; versari. Vrinā mouet radix ex passo pota.

De crocomagmate CAP. XXX.

f It etiam expressis vnguenti crocini odoramentis, quod crocomagma vocant. Optimū est odoratum, modice myrrhā olens, graue, nigrū, ligni expers, læue, subamarū. quod madefactum croci colorem reddit, gustatumq; vehementer dentes ac linguā inficit, multis durans annis. Quale est quod a syria defertur. Habet suas vires ad delenda quæ caliginem oculis obuersione. Vrinā cit. Calfacit, concoquit, & emollit. Vires croci proportionē repræsentat, quādoquidē plurimam croci partem sibi crocomagma vendicat.

LIBER PRIMVS

8

De Helenio.

CAP. XXXI.

Elenium quod symphyton aliqui vocant, alij persicam, a
 h liij medicam, alij oreftium, alij nectarion, alij cleoniam, alij
 idæam baton, aut stomū, Latini terminalium, aut enulam cā
 panam, Aegyptij lenen, folia habet verbasci angustioris folij, aspe
 riora, oblonga. Caulem quibusdam in locis non emittit. radicem
 subalbidam, interdum subruffam, odoratam, acrē, vegetam, magnam,
 ex qua agnatæ appendices liliorum aut ari modo seruntur. Montibus
 in vmbrosis, siccoq; solo prouenit. Foditur æstate radix, particulatimq;
 dissecta ficcatur. Potum radice decoctum menses & vrinas ciet. Ipsa
 q; i eclegmate ex melle prodest tussi, orthopnœæ, ruptis, cōuulsis, infla
 tionibus, & serpentū morfibz. In summa exalfaciēs. Folia ex vino
 cocta vtiliter ischiadicis illinūtur. Helenium stomacho vtile, in passo
 conditum. siquidē salgamarij paululum ficcata radicem, mox deco
 ctam, & frigida aqua madefactam, in sapā conijciūt, et ad vsus recon
 dunt. Trita potaq; ad cruentas excreationes efficax est.

De altero Helenio.

CAP. XXXII.

Lterum helenij gen^o in ægypto gigni Crateuastradit. Hær
 a ba est cubitalibus ramulis, serpylli modo per humū repenti
 bus, folijs lenticulæ, sed longioribus crebrisq;, radice palli
 da, digiti minoris crassitudine, p ima tenui, superne crassa, cortice ni
 gro. Nascitur in maritimis collibusq;. Radix vna in vino epota, con
 tra serpentium ictus auxiliatur.

De Omphacino oleo.

CAP. XXXIII.

Leum quod ex immaturis oliuis exprimitur, ad multos vsus
 o recte valentibus accōmodatissimum, Omphacinum id ap
 pellatur. Præstat recens, odoratum, quod non mordeat. Tale
 vnguētorū compositionibus idoneū intelligitur. Stomacho vtile est
 quod astringat. Gingiuas cōtrahit. Dētes firmat, si cōtineatur in ore.
 Sudores cohibet. Et quo vetustius ac pinguius, eo ad medicamēta a
 ptius est. Et vt reliqua in commune dicantur, omne oleum calfacit.
 Emollit ventrem. A perfriktionibus corpus tuetur, ipsumq; prōptius
 ad obeunda munera reddit. Aluū læuigat. Vlceriorum medicamē
 torum vires permistū hebetat. Cōtra venena datur, assidue potū red
 ditumq; vomitionb^o. Solut aluū heminæ mēsurā cum pari ptisanæ
 succo aut aqua potum. Ad tormina calidum simul decocta ruta trib^o
 sextarijs in potu datur. Ventris animalia pellit. Idē maxime ilei in
 testini morbo laborantibus infunditur. Vetus magis calfacit & vehe
 mentius discutit. Oculorū claritati sublitum confert. Si vetusti nō
 fit occasio, in vase decoquitur ad mellis crassitudinem vt vetustatem

DE MEDICINALI MATERIA

repræsentet.

De Oleo sylvestris oliuæ. CAP. XXXIII.

o Leum quod sylvestres oliuæ fundunt, vehementer astringit, & ad sanorū vsus secundum sibi locum vendicat. In doloribus capitis vtiliter pro rosaceo substituitur. Sudores arcet. Desfluētes capillos inhibet. Furfures, vlcera capitis manātia, scabiē, leprasq; abstergit. Tardius caniciē sentiunt, qui eo quotidie perunguntur. Candidum oleum fit hoc modo. Album colore nec anniculo vetustius, in nouū fictile oris patuli funditur, centū heminarū mēsurā, & sub solem media quaq; die concha refunditur. ex altoq; demittitur, vt assidua deuolutiōe, iētūq; agitatū respumet. octauadie fœnū græcū mūdū quinquaginta drachmarū pondere, calida aqua madefactū donec emollescat, in supradictū oleū deijcitur, ita ne extillet aqua. Postea teadæ præpinguis piceæ, assulatim casæ æquale pōdus adijcitur, & trāfactis octo diebus, oleum cōcha mouetur. Si intentum finem assequatur, in vas nouum vetere vino affusum recondi debet, substratis fertu-læ campanæ corollis drachmas vndecim pendētibus, cum pari iridis pondere. Sin minus, rursus soli mandandū, & idem munus obeundū, vsq; dum inalbescat.

De Sicyonio.

CAP. XXXV.

f Icyonij cōponēdi ratio hæc est. In lebetē oris lati stāno idū & tū, funditur olei albi quod crudæ oliuæ reddiderūt, cōgius vnus, aquæ cōgius semis. leui id igne coquitur, leniter mouēdo. At vbi bis efferbuit, & substracto igne refrixit, innatās oleū cōcha tollitur. & adiecta noua aqua conferuescit, & reliquis vt diximus peraētis reponitur. In sicyonia maxime fieri consuevit, Sicyonij inde accepto cognomine. Calfactoriam ad quendā vsq; modum vim habet. Febri ac neruorum vitijs prodest. Fœminæ ad cōmendādū faciei nitorem eo vtuntur.

De strigmentis balnearum.

CAP. XXXVI.

f Trigmenta a balneis calfaciunt, molliūt, discutiunt. Ad sedis rimas & cōdilomata illinūtur. Illa vero quæ ex palæstris puluerē sibi asciuerūt, in sordis speciē redacta, articulorū nodos imposita adiuuāt. Ischiadicis in fots aut malagmatis locū, calida cōmode sufficiūtur. Derasæ gymnasiōrū parietibus simulacrisq; sordes calfaciunt. Tubercula, quæ ægre ad cōtionem perducuntur, dissipant. Desquāmatis & vlceribus senū profunt.

De Elæomelite.

CAP. XXXVII.

i N palmyris syriæ quod Elæomeli vocant, ex quodā caudice manat, crassius melle, sapore dulci. Bilem, cruditatesq; detra-

LIBER PRIMVS

9

hit, sextario cū vna aquæ hemina dato. Sed qui sūpsere, torpescūt & viribus deficiūt. quod minime vereri oportet, verū crebro excitare ne veterno pressi somnos captēt. Fit & oleū e pīguitudine surculorū oleæ. Optimū vetus, crassū, pīgue, nō turbidū. Calfacit. Priuatī caliginib⁹ oculorū illinitur. Lepras, neruorūq; dolores, illitum emendat.

De Cicino oleo.

CAP. XXXVIII.

c Icinū oleū hoc modo tēperat. Maturi ricini quavoles quātitate torrido sole flaccescūt, et instrati tātis per insolantur dū vestiens cortex fractus decitat. Caro colligitur, & cōiecta in pilā diligēter tūdatur. postea in lebetē stanno illitū, qui aquā habeat demittitur, subiectoq; igni feruescunt. & vbi insitū prorsus humorē reddiderunt, sublato ab igni vase, innatans oleū concha tollitur, & recōditur. Sed in ægypto, vbi largior increbuit vsus, lōge secus fieri solet. Nā repurgatos ricinos molæ mandant, & accurate molitos per sportulā organo exprimūt. Tū quidē ematuruerunt ricini, cū cōtinētibus orbiculis exuūt. Ad psoras, & vlcera capitis manātia valet. Prodest inflāmatiōib⁹, vuluis cōuersis atq; prælusis. Itē idecoris cicatricib⁹ & auriū dolorib⁹. Emplastra efficaciora reddit additū. Potu aquā aluo extrahit. Vētris aīalia pellit. De amygdalino oleo. CA. XXXIX.

a Mygdalinū oleū quod aliqui metopiū vocāt, hoc fit mō. Semodius ex amarīs nucib⁹ repurgatis siccatisq; in pila ligneo pistillo leniter tūdatur in offas. aquæ quæ ferbuerit sextarius adijciē. & vbi dimidia hora humorē hauserit, vehemētius q̄ ātea tundiē, mox tabellis premiē. & quod digitis hæsit, cōcha excipiē. Pressis nucibus rursū hemina aquæ ispergiē. & postq̄ ebiberit, idē opus psequēdū. Sigulas heminas reddūt singuli modij. Cōtra vuluarū dolores, strāgulatus, cōuersiōes, & eorū dē locorū inflāmationes efficax est. Vitijs renū, calculosis, difficili vrinæ, suspīriosis, lienosisq; p̄ficat. Dolores capitis, grauitatē auditus, sonos incertos, tinitusq; discutit. Maculas tollit in facie, & cutē erugat cū melle radice lilij & cypria cæra aut rosaceo cærato. Et oculorū hebetudines emēdat. Vlcers capitis manātia & furfures cum vino abstergit. De Balanino oleo. CAP. XL.

f Imili modo fit balaninū oleū, quod repurgat maculas, lētigines, varos, & cicatrices nigras. Aluū soluit. Stomacho aduersatur.

Cōtra auriū dolorē, sonos, et tinit⁹ auxilio est cū āferino adipe instillatū. Si sis sesamini ratio. Fit etiā e nuce iuglāde oleū, qđ caryinū vocāt. Eādē vi habet q̄ balaninū. De Hyosciamnio oleo. C. XLI.

h yosciaminū sic fit. Semē cādidū, recēs ac ficcū tūditiē. & calida aspergiē aqua, vt i amygdalino diximus. dūq; isolat ficcatae partes madidis pmisceāt. hoc autē fieri oportet, dū nigrescat & grauit̄ oleat. Mox pressū atq; excolatū reconditiē. Ad auriū dolores efficax est. Pessis miscetur. ad emolliendū vtile.

b. j.

DE MEDICINALI MATERIA

De Oleo e grano cnidio. CAP. XL.

f It & e grano cnidio purgato & tuso. Vis ei aluū soluere potu.

De Cnicino oleo. CAP. XLIII.

n On secus cnicinum oleum temperatur. Cui facultas eadem est quæ facto e gnidio grano, verum inualidior.

De Rhaphanino. CAP. XLIIII.

r Haphaninum e raphani semine fieri solet cæterorum more. Phthiriasis mala valetudine cōtractas tollit. Scabricias cutis infacie emendat. Ad obsonia vtuntur ægyptij.

De Melano. CAP. XLV.

m Elanthinum idem quod rhaphaninum potest.

De Sinapino. CAP. XLVI.

t Ritū sinapis semen, & calida aqua madefactū, adiecto postea oleo exprimitur. Id ad diuturnos dolores efficax est. Trāssert humores qui in aliqua parte concreuerunt.

De Myrteo oleo. CAP. XLVII.

m yrtei faciundi ratio hæc est. E myrto nigra syluestri, aut satiaua, foliorum mollissima quæq; tusa premuntur. Succo pares omphacini olei portiones adiiciuntur. subiectisq; carbonibus inferuiscunt donec concoquantur. Innatans oleum deraditur. Sed longefacilior hæc compositio. Tenera folia contusa, coquuntur in oleo & aqua, & quod innatat eximitur. Priuatim alij deiecta in oleū folia in sole macerant. Alij prius oleum inspissant malicorio, cupresso, cypiro & iunco odorato. Efficacius est amarum gustu & oleosum, viride, translucens, & olens myrtū. Astringit & indurat. Ideo medicamentis miscetur quæ cicatricem obducunt. Prodest vlceribus in capite manantibus, ambustis igni & papularum eruptionibus. Facit ad attrita et furfures, sedis rimas, condylomata, articulos laxatos, corporis sudores, & ad omnia quæ astrictiōnem inspissationēq; desiderant.

De Laurino. CAP. XLVIII.

l Aurinū fit hoc modo. Maturæ lauri baccae in aqua coquantur. siquidē ex obducto corticæ quandā piguitudine reddunt quæ manibus expressa, cōcha excipitur. Alij omphacinū prius oleū cypiro iūco odorato, & calamo inspissant, deinde mollia lauri folia cōcoquūt. Alij etiā baccas, donec oleū odorē cōtraxerit, Alij styracem & myrtum addunt. Optima laurus ad id latifolia & montana. Oleum laurinum vtilius quo recentius, quoq; viridius colore, amarissimum, & acre. Vis ei excafactoria, emolliēs. Venarū spiracula laxat. Lassitudines discutit. Omnibus neruorū vitijs, horroribus, destillatiōibus, aurium doloribus, malis renū frigore contractis, illitum non aliud iuuantius. Attamen potum nauseam parit.

LIBER PRIMVS

10

De Lentiscino. CAP. XLIX.

Imilis lentiscini ratio. Nā e maturo fructu temperatur, fa-
 fctis prius spissamentis vt in laurino diximus. Hoc scabiem
 iumentorū canūq; sanat. Vtilissimū pessis, ac opis, & leprae
 rū medicamētis. Sudores cohibet. Nec secus terebenthinū fieri solet,
 quod refrigerat & astringit. De Mastichino oleo CAP. L.

Astichinū e trita fit mastiche, quod contra oīa vuluæ mala
 m efficax est. Mediocriter calfacit, astringit, & emollit. Aduer-
 sus prominētes stomachi duricias, cœliacorū, dyfētericorūq;
 cruciat⁹, vtile. Faciē emaculat, & colorē nitidū facit. Optimū in chio
 insula cōponitur. De Vnguentorum ratione. CAP. LI.

E ratione vnguentorū cōsequēter tractandū existimauius,
 d quādoquidē ea in nōnullis corporū vitijs, aut medicamētis
 mi sta, aut corpori perfusa, aut naribus obiecta, plurimū pro-
 sunt. In quorū probationib⁹ cōsulare nares oportet, an ea oleāt ex quī-
 bus tēperatur. Optimū huiuscemodi iudiciū, quod in quibsdā plane
 obseruari nō potest, propter ea quæ admiscētur odore cæteris præua-
 lētia, vt ī amaracino & crocino, telino, & plerisq; alijs, quæ cræbra cir-
 ca hæc meditatione experiri cōueniet. De Rosaceo. CAP. LII.

Osaceū oleū sic fit. Iunci odorati quīq; libras & bessem tū-
 2 dito, & subactas aqua in duabus olei libris & quicunque suba-
 ide mouēdo coquito. Dūq; pcolaueris, ī olei libras viginti &
 quicuncē, adijcto rosas nō madesactas numero mille, & manib⁹ melle
 le perundis identidē moueto, sensim premēs. finito nocte tota macera-
 ri, postea exprimito. & vbi recrementū pessumierit, mutato vase, in
 craterē melle illitū recondito. Cæterū rosas quæ antea pressæ fuerunt,
 in labellū demittito, & affusis octo libris & quadrante spissati olei, ite-
 rum premito. eritq; secūdariū oleū. Quod si tertias vsq; quartasve per-
 fusiones infundens exprimere voles, secūdariū fiet, tertiariū, & quarta-
 rium vnguētum. Sed quoties id feceris, vasa melle oblini debēt. Si ve-
 ro secūdam adiectionē instituere libet, in expressum oleū, numero pari
 recētes rosas nullo humore ibutas inijcito. manibus melle præmadesac-
 tis, agitans premito. & iterū, tertio aut quarto, simili modo exprimēs
 facito. totiesq; recenteis rosas detractis vnguibus immittito. fiet enī ita
 oleū multo validius. Nā septies oleū rosarū infusionē admittit, nec am-
 plius. Prælum melle perungatur. Oleum a succo diligenter secerni
 oportet, nam si minimū quid relinquat, vnguētū corrūpet. Alij autem
 detractis vnguibus, rosas tantum oleo macerant in sole hoc modo.
 Rosæ quæ selibram pondere æquant, in sextario olei diebus octo
 madescunt & vsque tertiam perfusionem quadraginta diebus inso-
 lantur, & sic oleum reconditur. Alij calamo, aut aspalatho prius
 b.ij.

DE MEDICINALI MATERIA

olei spissamēta faciunt. Alij coloris causa anchusam admiscunt, & salē quominus oleat. Vim astringendi & refrigerandi obtinet. Fomentis et cataplasmatibus vtile. Potū soluit aluū. Stomachi ardorē restiguit. Vlcera caua replet, & mulcet quæ cacoethe vocantur. Vlcerebus i capite manantibus, atq; feruidis eruptionib⁹ illinitur. Caput dolēs eo perfundit. Dētes inter initia doloris collui prodest. Ad genarū duricias illitū efficax est. Ad laceffita interanea & cōcitas vulvas vtilissime subijcitur.

De Elatino.

CAP. LIII.

Raeta elate tusa & scarificata in labellū deijcitur. Omphacinū oleū triduo infunditur, mox per sportulā exprimitur. Verū pares esse debēt vtriusq; portiones. deī mūdo vase ad vsum recōditur. Viribus rosaceo proportionē respōdet. Aluū tamen nō mollit.

De Melino.

CAP. LIIII.

Elinū oleū hoc mō tēperatur. Olei cōgius, decē aquæ sextarijs ammiscetur. Adijcitur spathæ fractæ quadrans, & iūci odorati vncia, quæ die vno macerata coquuntur. mox in vas oris patuli oleū excolatur, & indita harundinacea crate, aut vetusta tegete, cotonea mala superponuntur, et vestimentis operta tantisper inibi residēt, dū malorū vires ad se oleū alliciat. Aliqui cotonea, decē die rū spatio operimētis inuoluūt, vt cōtineatur odor nec euanescat. Postea biduo macerata oleo, exprimuntur. oleūq; reconditur. Id vim refrigeratoriā et astringentē habet. Contra scabiosa vlcera et quæ serpūt, ac furfures, perniunculosq; effectū præbet. Exulceratis vuluis infunditur. Citatā vrinā sistit inditū. Sudores cohibet. Contra cantharidas, buprestis, pinorū erucas, bibit. Laudatur maxime quod cotonea mala olet.

De ænanthini compositione

CAP. LV.

Enanthe e labrusca, optime olēs postq; emarcuit, deiecta in omphacinū oleū mouetur, voluiturq; et cū biduo manserit exprimitur. oleū reconditur. Astringit, proximū rosaceo effectum præbens. sed aluum non resoluit, aut mollit. Probatissimum est quod odore ænanthem refert.

De Telini componendi ratione

CAP. LVI.

Oeni græci libræ quinq; calami libra vna, cypiri libræ duæ, olei libris nouem septenis diebus macerantur, quotidie termouētur, postea premūtur. Aliqui pro calamo cardomomū substituūt, & cypiri loco xylobalsamū macerant. Alij oleo antea his odoribus spissato sœnū græcū macerātes exprimūt. Hoc telinū abscessus emollit, et cōcoquit. Oibus vuluarū duricijs magnopere cōuenit. Fœminis difficile parietibus subijcitur, vbi præ excretis humoribus loci siccitatē cōtraxerūt. Sedis inflammationes lenit. Tenesmo subditū prodest. Vlcera capitis manantia furfuresq; expurgat. Ambustis & per-

LIBER PRIMVS

11

nionibus addita cæra proficit. Vitia cutis in facie emendat. Pigmentis ad conciliandum faciei nitorem inferitur. Eligi oportet recēs, quod non vehementer fœni græci odorem præ se ferat, & manus abstergat, sapore ex dulci in amarum inclinato. Tale enim optimum iudicatur.

De Sampsuchino CAP. LVII.

Erpilli, casia, abrotoni, florum sisymbrij, frōdiū myrti, sampsuchi singulæ portiones, quadam pro viribus singulorum cōiectatiōe, vna tunduntur, atq; is ophacini olei modus adijcitur, qui madentium vires non euicat, hæc post quadriduum exprimuntur, denuo alia, simili mēsurā & æquali tempore macerata premuntur, ita enī validius reddi solet. Eligi oportet sampsuchū colore nigrum, plurimū redolēs, mediocriter acre. Vi habet acrē, calfa & toriā, extenuatē. Aduersus vuluæ præclusiones, cōuersionesq; efficax est. Mēses & secūdos partus extrahit. Vuluæ strāgulatus recreat. Lūborū īguinūq; dolores lenit, sed cū melle vti eo præstat, quādoquidē vehemētī astrictione locos indurat. Lassitudines illitū discutit. In opisthonicorum, vulsorumq; cataplasmata vtilissime additur.

De Ocimini compositione. CAP. LVIII.

Ciminū oleū fit vt cyprinū, ocimi folia detrahens librarū vndecim & bessis pondo, die noctuq; viginti olei libris macerato, premito, colato. Cūq; exhauseris quallū, rursus parē olei modū fundito, & exprimito. Vocatur autē id secūdariū. nā tertie perfusionis nō est capax. Deinde recēs ocimū æquali pōdere vt in rosaceo diximus, maceratur. & cū tāto tēporis spatio maduerit, exprimitur, & oleū recōditur. quod si in animo fuerit ter aut quater madefacere, semper ocimū recēs addes. Potest ex omphacino cōfici, sed illo modo melius. Idē quod sampsuchinū potest, sed inefficacius.

De Abrotonini compositione. CAP. LIX.

Lei cyprini odoribus ibuti libris nouē & quicūq; foliorū abrotoni libras octo die noctuq; madefactas, premito, quod si in lōgū tēpus oleū velis asseruari, eiectionis prioribus folijs, noua appones, & macerata exprimes. Calfacit. Ad vuluæ duricias præclusionesq; efficax est. Menstrua & secundas pellit.

De Anethini compositione. CAP. LX.

Lei libris octo & dodrante, florum anethi libras vndecim & bessē maceratas, manibus premito, et recōdito. quod si iterū perfūdere velis, recētes anethi flores cōsimiliter madefacito. Vuluarum duricias emollit. Venarū spiracula laxat. Cōtra rigores febriū circuitu redeuntes auxiliatur. Calfacit enī et lassitudines discutit. Prodest articulorum doloribus.

b. iij.

DE MEDICINALI MATERIA

De Sufini compositione. CAP. LXI.

Vinum, quod alij liliū appellant, sic temperatur. Olei libræ nouē cū quincūce, calami libræ quinq; & quadrans, myrrhæ vnciæ quinq;, permixto odorifero vino decoquūtur. & colato oleo, cardamomi tufi & cœlesti aqua madefacti libræ tres & semis macerātur, p̄mūturq;. Tres libræ cū semisse spissati olei assumūnt. Mille lilia decerpitis folijs in latum labellū demittūtur. Iniectū oleū, manibus melle punctis agitur. die noctuq; conquiescūt, & in pixidē matutinis exprimūtur. Oleum protin⁹ ab aqua, quæ simul expressa fuerat colo incerni oportet. non enī vt rosaceū morā tolerat. Nā concalfactū feruct & cōputrescit. Quare sæpius decapulādū. Vasa melle illinēda. Tenuis sal inspargendus. & si qua sordes vasīs faucibus hæsit, eximenda. Odoramētis iam expressis ex qua fillo in labellū transfusis, rursum olei prius odoribus imbuti quod primū pondus æquet, & cardamomi tufi drachmæ decē cōijciūtur. Hæc manib⁹ scite pressa, iterieda breui mora exprimuntur. quod profluit repurgatur. tertio eadē infundūtur adiecto cardamomo & sale, & manib⁹ melle madefactis. Lōge optimū erit quod prius exprimitur. Proximū quod sequitur. Tertiū locū sibi vēdicat, quod nouissimum prodiit. Denuo ī mille lilia enulsis folijs, expressum primo oleū infunditur. tū porro proseguēdū, eadēq; faciēda vt prius, addito cardamomo, dein expresso, & quo frequentī⁹ recētia lilia maceraueris, eo validius vnguētum efficies. Deniq; cum factū abunde videbit, singulis cōpositionib⁹ miscere cōuenit myrrhæ q̄o optimæ duas & septuaginta drachmas, & croci decē, cardamomi quinq; et septuaginta. Croci vero & cinamomi pares portiones tundūtur, & cribratæ in labellū cū aqua demittunt. expressumq; primo vnguētū infundit. et paulopost excipiunt vasculis siccis myrrha aut gūmi antea perfusis, et croco, melle & aqua, madefactis. Eadē fiunt in altera aut tertia expressione. Aliqui simplex ex balanino, aliove oleo, & lilijs componūt. Optimū esse cōstat in phœnice, mox ægypto factum. Sed cū primis laudat quod lilia redolet. Excalfacit. Emollit. Vuluæ p̄clusiones laxat, & collectiones aperit. Vtilissimum ad muliebria mala. Vlcera ī capite manātia, feruidas eruptiones, varos, surfuresq; emēdat. Vibices cicatricesq; celerrime ad colorē reducit, ita vt sæpe fallāt. In summa extenuat. Potū bilem per aluū extrahit. Vrinā ciet. Sed stomacho alienum est, & nauseam parit.

De Narcissini compositione. CAP. LXII.

n Narcissini olei spissamēta ita fiūt. Sex libræ aspalathi cū sextāte tūduntur. olei eloti libræ septuaginta cum vncijs quinq;

assumuntur. Aspalathus aqua madefactus in tertia olei parte coquitur, quo exempto, calamus quinque libris & besse, cum myrrhæ gleba cōtunditur, cribratusq; ac vino veteri odorato immistus decoquitur. simulac autem cum ijs efferbuerit, eximitur. Refrigeratum oleum excolatur, cuius portio in labellum mittitur. Flores narcissi q̄ plurimi cōijciuntur, qui bidui spatio vt in susino dictū est, p̄moti exprimuntur. Oleū subinde decapulandū, siquidē celerrime putredinē sentit. Valet hoc ad emolliendas vuluæ duricias, præclusionesq; sed capitis dolores facit. De Crocini olei compositione. CAP. LXIII.

Vm crocinū cōponere voles, prius olei vt in susino dixim⁹, c spissamenta facies eisdem ponderib⁹ & mensuris, cui⁹ olei libras treis & semissem, croci vnciā vnam assumes. idētidē in die moueto, & sexta die quam hoc assiduo peregeris, oleū a croco collis incernito. Eidē croco parē olei modū adijcito. Moue triduo. Dein contusæ myrrhæ atq; cribratæ drachmas quadraginta p̄misceto, & in pila agitans recondito. Aliqui parem cyprini portionem oleo aromatibus ad crocinū imbuto adijciunt. Optimū est quod abunde crocum spirat, in medēdi vsu expetitum. Proximū quod myrrhā refert. Calfacit. Somnū allicit. Quare persæpe phreniticis subuenit, aut per fustum, aut naribus admotū, aut illitum. Pus mouet. Vlcera purgat. Cōtra vuluæ duricias atq; præclusiones, & vlcera q̄ cacæthæ vocant̄ p̄dest, cū croco, cæra, medulla, duplicato olei pōdere. Cōcoquit em̄, emollit, humectat, & permulcet. Ad oculorū glaucitates ex aqua illinitur. Huic autem simile est butyrinū, onychinū & styracinū, quæ etiam si nominibus distant, viribus & cōpositione cognata sunt.

De Cyprini spissamēto & olei cōpositione. CAP. LXIIII.

Lei omphacini eloti pars vna, aquæ cœlestis dimidiū, cuius o vna parte oleū diluitur, altera adijciēdis odoramētis amisceat, dein assumptis aspalathi libris quinque & semisse, calami libris sex & semisse, myrrhæ libra vna, cardamomi libris tribus & dodrāte, olei libris nouē & vncijs quinq; Aspalath⁹ tusus & aqua affusus decoquit̄ i oleo, donec efferuescat. Myrrha autē vino vetere odorifero subacta, contususq; calamus digeruntur in offulas, quæ exēpto aspalatho immittuntur, & vbi efferbuerint, sublato ahæno, oleū percolatur. Cardamomum tusum reliqua aqua aspersum infunditur. Spatha agitur, nulla dū refrixerit interpellatione. Post hæc colato oleo, in viginti octo libras olei, floris ligustri quod cyprū vocāt, sex & quadraginta libræ cū besse istillant̄. q̄ sufficiēter madefactæ p̄ sportulā exp̄muntur, quod si copiosi⁹ desideret, idē florū pōd⁹ iniectū fili mō p̄mat, et iterū aut tertio si q̄s velit madefacere, poterit, et ita reddet̄ efficaci⁹. Eligi oportet

b. iiij

DE MEDICINALI MATERIA

bonum, quod cum odoris suauitate nares feriat. Aliqui cinnamomū addūt. Calfacit. Emollit. Venarū spiracula laxat. Vuluæ neruorūq; vitijs conuenit. Pleuriticis, fractisq; per se vel cærato immistum. Malagmatis imponi solet, quæ opisthotonicis, angina laborantib⁹, inflammationiq; inguinū oppitulantur. Item acopis.

De Irini spissamento

CAP. LXV.

f Pathæ q̄minutissime contusæ sex libras cum besse, in tribus & septuaginta libris & quincunce olei, æreo vase, additis decem aquæ heminis incoquito, quoad odorē acceperit. postea in craterem melle oblitum colato. ex eo aromatibus imbuto oleo, irinum primo temperatur, macerata Iride vt scripsimus. Sed alia est cōponendi ratio. In olei septuaginta libris & quincunce, xylobalsami vt dictum est contusi, libras quinque & sextantem excoquito. postea detracto xylobalsamo nouem libras & dextantem adjicito, & myrrhæ glebam vetere vino odorato perfusam, & in olei odoribus imbuti quatuordecim libris tantumdem tusæ iridis, binis diebus ac noctibus madefacito, strenue & vehemēter distriginto. quod si vis validi⁹ fieri, par pondus iterum ac tertio maceratum exprimito. Longe optimum est quod solā irin olet, quale est in perge, in pamphilia, & elide achaïæ natum. Vim habet calfactoriam atq; emollientē. Crustas adimit. Sordida vlcera et putrida purgat. Cōfert fœminis vuluæ affectionib⁹ obnoxijs. Item inflammationibus eiusdem atq; præclusionibus. Partus eiicit. Hæmorrhoidas laxat. Cōtra auriū sonit⁹ ex aceto ruta & amarîs nucibus, prodest. Diuturnis destillationibus naribus illitū, & cōtra graueolentia earū vlcera, quas ozenas vocāt, auxiliatur. Aluū purgat cyathus epotus. Facit ad ilei cruciatus. Vrinam mouet. Difficileis vomitiones adiuuat, perundis eo digitis & immissis, vel ijs quæ ad vomitum ciendum induntur. Anginæ etiā illinitur, aut ex aqua mulsa gargarisatur. Item contra faucium scabriciā. Datur ijs qui cicutā, coriandrum, aut venena fungorum hauserunt.

De Gleucini compositione.

CAP. LXVI.

g Leucinum absolute constat omphacino, iunco, calamo, celtica nardo, spatha, aspalatho, sertula cāpana, costo, et musto, circundatis interim vinaceis vasi, quod aromata vinum & oleū cōceperat. Tricenis diebus, bis in die mouetur. postea expressum oleū reconditur. Calfacit, emollit, cohibet. Rigoribus & neruorū vuluæq; vitijs auxiliatur. omni acopo iuuantius, quippe quod emolliat.

De Amaracino.

CAP. LXVII.

a Maracinū longe optimum in cyfico fieri solet ex omphacino & balanino, spissamentis e xylobalsamo, iunco odorato,

LIBER PRIMVS

13

& calamo factis, ac citatq; suauitate costi, amomi, nardi, casia, carpobalsami & myrrha odoribus. Aliqui, quo preciosius fiat, cinamomū addunt. Mel autem & vinum assumuntur, hoc in vasorū illitionem, illud ad cogēdas tusorum aromatum offas. Amaracinum calfacit. Soporē mouet. Venarū spiracula laxat. Emollit. Feruorem excitat. Vrinā cit. Putridis vlceribus ac fistulis perq; vtile, necnon humentibus hernijs, postq; medica manus operam suam impenderit. Crustas, & tetra vlcera quæ theriomata vocant, rumpit. Difficili vrinæ illita sede, & eius inflammationibus auxiliatur. Hæmorrhoidas illitu soluit. Vuluæ subditū mēstruos cursus euocat. Duricias, ac vuluæ tumores, discutit. Vulneratis neruis lacertisq; confert, leniter astringētibus madefactum & impositum.

De Megalino.

CAP. LXVIII.

Astitabatur olim megalinum, sed nunc compositio exoleuit & prorsus oblitterata est. Cuius ad historiæ complementum meminisse non fuit alienum. Mistura cum amaracino eadē erat, sed resina exuperabat, excellebatq;. Quare leuiter emolliebat. Resina vnguētis, neq; tutelæ neq; voluptatis gratia, adijciebatur, sed coloris crassamētisq; causa. Ea tātisper coquebatur, dum defineret oleore. Cuius coquendæ ratio declarabitur, dum de resina differemus.

De Hedycroo.

CAP. LXIX.

Vod hedycroon vocant, in coo fieri solet, eisdem præditum viribus & misturis, quibus amaracinū, sed suauius spirat.

De Metopio.

CAP. LXX.

It in ægypto vnguētum, quod metopion patrio nomine appellatur propter galbani missionē. Nam lignum in quo galbanum enascitur, metopion vocant. Constat amaris nuciis, omphacino oleo, cardamomo, odorato iunco, calamo, melle, vino, myrrha, balsami semine, galbano & resina. Probatur pingue, graui odore, quod magis cardamomum & myrrham q̄ galbanum resinapiat. Calfacit vehementer, & adurit, atq; extrahit. Ora venarum appetit. Vlcera purgat. Ad præcisos neruos, & lacertos, ad hernias putri humore contractas, efficax est. Cæratibus & malagmatis inseritur. Rigoribus, conuulsisq;, præsertim quibus ceruix in scapulas deiecta, & retrorsum contracta est, vtile habetur. Sudores cit. Vuluæ spiracula laxat, et eiusdem duricias discutit. In summa, molliendi naturā habet.

De Mendefio.

CAP. LXXI.

Endesium constat balanino oleo, myrrha, casia, & resina. Aliqui tamen post singulorū pondera, cinamomi exiguum addunt, nullo compendio. Nam quæ simul contrita non fuere, vim

DE MEDICINALI MATERIA

nullā exhibent. Similē metopio vim obtinet, sed inferiorem multo.

De stacte.

CAP. LXXII.

f Stacte vocatur pinguitudo recentis myrrhæ cum exigua aqua tula, et organo expressa. Ea perq̃ odorata, ac p̃ciosa est, atq; vnguentum per se facit, stacte nominatū. Maxime probat, quæ nullā olei mistionē admittit, cuius minima portio cōpos est viriū plurimarū. Vim myrrhæ calidis vnguētis correspōdētē habet.

De cinnamomino.

CAP. LXXIII.

c Innamominum e balanino oleo, & xylobalsami, calami, iunci odorati spissamētis, atq; cinnamomi, & seminis balsamini suauitate, quadruplaq; myrrhæ ad cinnamomū portione cōstat. Mel ad cogenda omnia adiicit. Laudatur acre, molli odore, plane myrrham redolēs, crassum, odoratum, gustu perq̃ amaro. Id nō a resina, sed myrrha crassitudinē obtinuit. Resina enī neq; amaritudinem præbet, neq; vllam odoris gratiam adiicit. Vim habet admodum acre, amaram, & calfacientē. Itaq; ora venarū aperit. Calfacit, discutit, dissipat. Humores & spiritus attrahit. Caput aggrauat. Contra vuluæ vitia cum duplo oleo, cæra, & medulla efficax est. Ita enim fere acrimonia exolefcit, & quædam emolliendi vis contrahitur. Alioqui adurit, et præ cæteris vnguētis indurat. Facit mirū in modū ad fistulas & vlcera quæ putredinis vitiū senserūt. Item ad hernias humidiores, carbūculos, febriū rigores, tremores, gangrænasq; cū cardamomo. Aduersus serpentium morsus, illinitur. Scorpionū & phalangiorum ictibus cum tritis grossis imponitur.

De nardino vnguento.

CAP. LXXIII.

r Atio nardinifaciendi euariat. Nam aut malabathrino folio, aut sine eo fit. Complurimum autem balanino oleo, aut omphacino, iuncus odoratus spissamenti gratia adiicitur, sicuti propter odoris suauitatē costus, amomū, nardum, myrrha, balsamū. Laudatur tenue, non acre, nardi aut amomi odorē referēs. Vis ei extenuās, acris. Expurgat. Excalfacit. Humorem extenuat. Hoc liquidum est, nec habet strigmenti crassitudinem, nisi resinam recipiat. Fit etiam simplex ex omphacino oleo, iunco, calamo, costo, & nardo.

De Malabathrino.

CAP. LXXV.

m Alabathrinū spissamēta nardini habet. Insup myrrha addit, q̃ de causa calfacit, crocino, aut amaracino, virib⁹ correspōdēs.

De Iasmino.

CAP. LXXVI.

a Pud perlas fit, quod iasminum cognominatur, ex albis floribus violæ, quorum sextans, in italicū sextariū sesamini olei demittitur, violis vt in lilino diximus, vicissim permutatis.

Apud persas inter epulādū vsurpatur odoris causa. Nā toti corpori cōuenit, præsertim cū in balneas descēdū est. Sed his opitulatur corporibus quæ calfactionē, laxationemq̃, desiderant. Grauius enim spirat, q̃ vt libenter a plerisq̃ recipiatur.

De Myrrha

CAP. LXXVII.

Myrrha lachryma est arboris, quæ in arabia gignitur, ægyptiæ spinæ non dissimilis, e cuius vulnere defluit lachryma in subiectas tegetes. Alia circum caudicem cōcrescit. Dicitur ex his aliqua pedalis, præpinguis, qua expressa statim emittitur. Alia gabirea, pinguis, læto & pingui solo nascens, ea copiosam sudat statim. Omnium prima est, quæ troglodytica appellatur, accepto cognomine ab tractu, in quo prouenit, splendens, subuicinis, ac mordens. Quæ etiam legitur tenuis quædam, quæ troglodyticæ secunda est, bdelij modo mollis, verum odore grauiuscula, apricis nascens. Alia caucalis cognominatur, scabra præter modum, nigra, & retorrida. Omnium deterrima, quæ ergasima dicitur, pingui carens, cano situ obducta, acris, ad gummi imaginem vergens, & viribus eius proxima. Improbatur aminea cognomine. Ex ijs pastilli fiunt, sed e pinguibus pingues, & odorati, e siccioribus haud quā pingues, & inodorati. Minus viribus pollet, quæ oleum non admittit, cum in pastillos digerebatur. Adulteratur macerato gummi aqua, in qua myrrha maduerit. Eligenda est recens, squallore obfusa, levis, vndiq̃ concolor, quæ contra fracta internatos quasi ungues, cādidos & læues ostendat, minutis globis, amara, acris, odorata, calfaciēs, Superuacua & inutilis est grauis, coloris piceæ. Calfacit, cohibet. Soporē gignit. Siccat, astrigit. Vuluam emollit, & præclusam laxat. Menses & partus celeriter extrahit, cum ab sinthio, lupinorum cremore, vel succo rutæ admota. Tuberculo fabæ deuoratur in vetere tussi, orthopnoea, in laterum pectorisq̃ doloribus, in alui profluvio, et dysenteria. Rigores discutit, duabus horis ante febrium accessiones, fabæ magnitudine pota cum pipere & aqua. Subdita linguæ liquataq̃, scabriciem arteriæ expolit. Et densam vocē expedit. Vētris tineas enecat. Contra grauem oris halitum mādatur. Et aduersus alarum tædia cū liquido alumine illinitur. Gingiuas & dentes stabilis, colluto cum vino & oleo ore. Vulnere capitis illitu glutinatur. Medetur fractis auribus, ac ossibus nudatis, peruncta cum cochleæ carnibus. Item purulentis auribus inflammatisq̃ cum meconio castorio & glaucio. Ad varos autem cum casia & melle illinitur. Impetigines ex aceto purgat. Defluentes capillos cum ladano & vino myrteo illita, firmat. Diurnas distillationes lenit, illitis pinna naribus. Oculorum vlcerā complet. Albugines tollit. Caliginem discutit. Sca-

DE MEDICINALI MATERIA

briciē læuigat. Fit e myrrha peride atq̃ thure fuligo, & vt postea ostēdemus, ad eadem conueniēs.

De Beotica myrrha CAP. LXXVIII.

b Eotica myrrha, dissecta radix est arboris cuiusdam in beotia nascētis. Melior est quæ myrrham odore repræsentat. Vis ei calfaetoria inest. Emollit discutitq̃. Suffimētis commodissime inferitur.

De Styrace CAP. LXXIX.

f Tyrax lachryma est arboris malo cotoneæ similis. Præfertur fordescens, flauus, resinofus, albicantibus grumis, q̃ plurimum in sua odoris gratia permanens. qui dum mollitur, melleum liquorem reddit, qualis e castabala vrbe, pissidia, & ciliacia deuehitur. Deterior niger, surfuosus, canoq̃ situ obductus. Cæterum lachryma inuenitur gummiū similitudine, perlucida, & myrrhæ æmula. Verum per pauca manat. Adulteratur ligni scobe quam vermiculi erodentes excusserunt, melle, & iridis crassamento. & quibusdam alijs. Alij cæram aut adipem odoribus imbutum, flagrantissimis solibus cum styrace subigunt, et per laxa cribri foramina in frigida aqua vermiculos exprimūt, venūdantq̃. Styracen hunc, quoniam in vermiculorum speciem contrahatur, scoleciten cognominant, quē tanq̃ syncærum imperiti approbant, non animaduertentes ad præcipuam odoris fragrantiam. Siquidem acer admodum est, qui adulterationis vitio caret. Styrax calfacit, emollit, et concoquit. Medetur tussis, destillationibus, rauedini, grauedini, et retusæ voci. Vuluæ præclusæ duriciæ laboranti conuenit. Cit menses potu appositusq̃. Aluum leuiter mollit, si exiguum cum resina terebinthina bibatur. Miscetur vtiliter discutientibus malagmatis, acopisq̃. Adoletur autem & igni torretur, vt fiat ex eo veluti ex thure fuligo, ad eadē conueniens ad quæ thuris fuligo. Ex eo etiam in syria styracinum oleum cōponitur, quod calfacit vehemēter, & emollit. Verum caput dolore afficit, adgrauatq̃, et soporem adfert.

De Bdelio CAP. LXXX.

b Delium alij Bolchon appellāt, alij madelcon. Lachryma est saracenicæ arboris. Probatur gustu amarū, trās lucidum taurini glutinis in morem, intus pingue, liquefcens facile, ligni ac sordis expers, suffitu oderatum, vngui simile. Est etiamnum bdelij genus sordidum, nigrum, in offas conuolutum, aspalathi odore, ex india aduectum. Defertur etiam a petra oppido ficcum, resinofum, liuescens, sed facultate secundum. Adulteratur gummi. sed ita vitiatum nō perinde gustui amaritudinem repræsentat, nec vsq̃ adeo suffitionibus

odoratū. Calfacit et emollit. Duricias, et turgētia guttura, humidasq; hernias discutit cū ieiuna saliuā impositum. Vuluæ spiracula laxat ap-
positu et suffitu. Et partus humiditatesq; omneis extrahit. Calculos
potu comminuit. Vrinam mouet. Tussientibus, a serpente percussis,
vtilissime datur. Valet ad rupta, vulsa, intentas laterum membranas,
et discursantes spiritus. Malagmatis inseritur, quæ contra duricias et
neruorum nodos profunt. Contusum resoluitur affuso vino aut aqua
calida.

De Thure

CAP. LXXXI.

Hus in ea gignitur arabia, quæ thurifera cognominatur. Pri-
t matum tenet in e genere masculum, stagonias appellatum,
suapte natura rotundū. Tale autem indiuiduū est, candidū,
cū frāgitur intus pigue, in suffitu statim ardēs. Indicū vero fuluescit,
et colore liuet. Sed rotundum industria facit ant. Nam in quadrangu-
lares formas dissectum dolijs versant, donec rotunditatē cōtrahat. Ve-
rum huiusmodi thus tēpore flauescit, quod atomum aut syagrum ap-
pellant. Secundum locum habet arabicum, et in smylo nascens, quod
aliqui copiscum vocant, minus multo et fuluius. Est et genus aliud cui
amymitæ cognomen est, alioqui candidum, quod dum mollitur masti-
ches more digitis cedit. Adulteratur pini resina & gummi, quod faci-
le depræhendī potest. si quidem suffitum gummi flammam non eiacu-
latur, & resina in fumū euanescit. Thus vero statim ardet. Idem male-
ficium odor prodit. Ad calfaciendum & astringendum pollet. Ocu-
lorum caliginem discutit. Caua vlcera complet. Et ad cicatricem per-
ducit. Cruēta vulnera glutinat. Infrenatq; sanguinis eruptiones, etiam
si cerebri membranis effluat. Vlcerā quæ cacoethe vocantur & sedis
et reliquarum partium permulcet, tritum cum eo & lacte linamentum.
Formicantes verrucas inter initia, impetiginēq; ex aceto & pice illi-
tum tollit. Ambusta igni, pernionesq; cū suillo adipe aut anserino, &
vlcerā in capite manātia cum nitro, si infricetur sanat. Paronychijs cū
melle, auribns fractis cum pice, medetur. Ad reliquos aurium dolores
cum dulci vino infunditur. Inflāmata a partu māmæ cum cimolia &
rosaceo magna vtilitate perunguntur. Additur ad arteriæ viscerumq;
medicamenta. Prodest sanguinis excreationi potum. Sed in secūda va-
letudine haustum insaniam monet, & largius cum vino potum interfi-
cit. In fictili mundo thus crematur flagrante glebula succēsum a lu-
cerna, donec exuratur. post perfectam vstionem operire oportet, vsq;
dum restinguatur, sic enim in cineres redigitur. Aliqui ollulam æneo
vase cauo circa medium perforato cīgunt ad excipiendam fulliginem,
vt in eius mentione mox ostendemus. Alij crudo fictili luto oblito, &
in furnum indito, cremāt. Fictili etiam nouo viuacibus prunis torrea

DE MEDICINALI MATERIA

tur, dum non amplius bullet, aut vaporem emittat, facile enim commi-
nuitur quod perustum non est.

De Cortice thuris.

CAP. LXXXII.

P Ræfertur thuris cortex crassus, pinguis, odoratus, recens,
læuis, minime scaber, sine membranis. Adulteratur admisto
pini aut nucis eius cortice, sed horum index ignis est. Siqui-
dē reliqui cortices suffiti nequaquam incenduntur, sed sine odore fumum
eructant. Thuris vero cortex ardet, & cum odoris fragrantia vaporem
ciaculat. Thuris modo vritur. Et vis eadēquæ thuri, sed validior astri-
gentiorque. Quare cruentis excreationibus, vuluis fluctione laboranti-
bus, in pecto confert. Ad caua oculorum vlcera, cicatrices, sordesque ef-
ficax est. Tostus scabris lippitudinibus auxiliatur.

De Manna thuris.

CAP. LXXXIII.

M Anna thuris probatur candore, micarum frequentia, & puri-
tate. Vim habet eandem quam et thus, sed inualidiusculam.
Sunt qui cribrata pini refina, ac polline, aut cortice thuris
contusi adulterant, sed hæc igne depræhenduntur. Neque enim eque
suffitu aeriū vaporem sed fuliginosum & impurum expuit, & permittit
suaveolentiæ odoris virus habet.

De Fuligine thuris.

CAP. LXXXIII.

F Viginem thuris sic facito. Forcipicula, lucernis accensas sin-
gulatim thuris glebas, in nouā fistilē ollā concauā imposito.
& æreo vase in medio perforato, deterfa diligenter sorde, obte-
gito. Aliā admoueto, in altero aut utroque labro, subiectis quaternū di-
gitorū altitudine lapillis, quo facilius perspicere queat, si vratur. Et qua
locus capax fuerit, glebula alias supponito, & antea quā prorsus pri-
or gleba reslinguatur, aliam imposito, donec sufficientem fuliginem
videaris aggregasse. Continuo tamē externæ æramenti partes spōgia
aqua frigida madefacta, abstergantur. Ita enim temperato æris feruore,
fuligo omnis inhærebit. Quæ alioqui per leuitatē decidua, thuris cine-
ribus admiscetur. Dersa itaque fuligine, cinis cremati thuris seorsum
substrahendus est. Idem opus quoad satisfactum tibi videbitur, obeun-
dum. Oculorum inflammationes mitigat, Fluctiones suspendit. Vlce-
ra purgat. Caua explet. Carcinomata fistit.

De Fuliginis compositione.

CAP. LXXXV.

F Imili modo e myrrha, refina, styrace, reliquisque lachrymis,
fuligo excipitur, ad eadem conueniens.

De Pinu & picea.

CAP. LXXXVI.

P Inus & picea generi eidem ascribuntur, sed quandam flagi-
tant specierum distinctionem. Arbores vulgo cognitæ.
Quarum cortex astringit. Prodest tritus & illitus in tertri-

gini, vlceribus summū corpus occupantibus, ambustisq; cum spuma argenti & māna. Vlcera delicatulorum acrimoniam recusantium carato myrtilino exceptus ad cicatricem perducit. Tritus cum futorio atramento serpentia cohibet. Suffitu partus et secundas eijcit. Potus aluum sistit, Vrinam mouet. Folia eorum trita & illita inflammationes leniunt. Vulnura ab inflammatione vindicant. Trita autem & decocta in aceto, feruenti collutione, dentium dolores mulcent. Hepaticis vtilia sunt, drachmæ pondere in aqua aut mulsa pota. Pineæ nucis cortex & folia potu eadem præstant. Teda particulatim secta si in aceto coquatur, et decocto dens colluatur, dolores leuat. Ex his etiam fit spatha acoporū pessorumq; cōpositionibus idonea. Quinetiam earum crematarum fuligo ad librarij atramenti confectionem excipitur. Ea circumlitionib⁹ efficacissime imponitur, quib⁹ palpebras ornāt, coloremq; mentiuntur, calliblephara græci vocāt. Arrosio oculorum angulis, callosis glabrisq; genis, & collachrymationibus opitulatur. Pityides appellantur pinorum piceæq; fructus, qui in conis inueniuntur. Vim astringentiam habent, et aliquā exalfaciētem. Tussi & pectoris vitijs auxiliātur, per se, aut ex melle sumpti.

De Pineis nucibus

CAP. LXXXVII.

Vces pineæ cum repurgatæ māduntur, aut cū passo aut cucumeris semine bibuntur, vrinam ciēt. Acrimonias in renibus aut vesica hebetant. Stomachi rosiones leniunt, datæ cum portulacæ succo. Virium infirmitatem roborant. Corruptorū quoq; humorum labē obtūdunt. Pineæ nuces recenter arboribus decerptæ in passo franguntur, & decoctæ, verustæ tussi ac tabitudini conferunt, si quotidie ex eo liquore terni cyathi bibantur.

De Lentisco.

CAP. LXXXVIII.

Entiscus nota arbor est, cui vis inest astringēdi. Semini enī, folio, ramo, cortici, radicibusq; cognatæ insunt vires. Liquamentum autē ita fieri solet. Folia cortex & radix in aqua coquuntur, et vbiabūde cocta sūt, folia abijciuntur. Aqua denuo coquitur, donec mellis habeat crassitudinē. Lentiscus sua astringēdi dote, valet aduersus sanguinis reiectiones, alui profluvia, & dysenterias in potu. Item contra eruptionem sanguinis e vulua & eiusdem aut sedis procidentia. In totum acatiæ & hypocythidis vicem repræsentat. Idem facit succus e tritis folijs. Decoctum fotu caua explet. Et fracta ossa ferruminat. Vuluæ fluctiones sistit. Nomus arcet. Vrinā pellit. Motus dentium collutione stabilit. Virētes surculi calamulorum vice dentibus repurgadis affricātur. Fit e semine oleum, quod prodest cum quid astringi opus est.

DE MEDICINALI MATERIA

De Refina lentiscina.

CAP. LXXXIX.

I Entiscus refinam gignit, quæ lentiscina cognominatur, et ab aliquibus massiche. Pota utilis est sanguinem reiicientibus, & tussi veteri. Stomacho auxiliatur, sed ructum mouet. Ad datur in dentifricia & illitiones faciei ad nitorem cutis conciliandum. Palpebras oculis incommodas replicat. Manducata halitum oris commendat. Gingiuas contrahit. Optima & copiosissima in insula chio prouenit. Præfertur nitedulæ modo resplendescens, & cādore tyrrhenicæ cæræ similis, adulta, friabilis, odorata, stridorem edens. Viridis autem inferior est. Adulteratur thuris, resinæq; mistura.

De Terebintho.

CAP. XC.

t Erebinthus cognita arbor est, cuius folia et semen & cortex astringunt, & ad eadē ad quæ lentiscus conueniunt, simili parata modo sumptaq;. Fructus esui aptus est, sed stomacho aduerfatur. Excalfacit. Vrinā mouet. Venerē excitat. Cōtra phalangiorū morfus conuenienter in vino bibitur. Refina eius ex petra arabie opido defertur. Prouenit etiam in Iudæa, syria, cyprio, aphrica & cicladibus insulis. Sed præualet candida, perlucida, vitreo colore & in cæruleum vergēte, odorata, terebinthū olens. Terebinthina resinas omneis antecedit. proxima lentiscina, & e pinu et abiete. Has sequitur e picea et pineis nucibus refina. Natura omnibus calfacere, molliare, discutere, expurgare. Tussi ac tibi conueniunt per se, aut in eclegmate ex melle. Vitia pectoris expurgant. Vrinam cient. Cruda concoquūt. Ventre emolliunt. Palpebras commodissime replicant. Lepras tollūt, cum erugine ac sutorio atramento, nitroq;. Auribus saniem emanantibus, item in pruritu genitalium vtilis. Malagmatis, acopisq; ammiscentur. Laterum doloribus illitu aut appositu auxilio sunt.

De liquida refina e pinu & picea. CAP. XCI.

I liquida refina e pinu & picea, a Gallia et hetruria conuehi solet atq; oli a Colophone petebat, hinc Colophonie sibi cognomētū vēdicauit. A galatia quoq; alpibus cōtermina, quā vernaculo nomine laticē appellant incolæ. Ea i linctu magnopere prodest tussi veteri. Colore inter se distant. Siquidem alia candida est, alia oleosa, alia mellei liquoris similitudine, vt larigna. Cupressus etiam liquidam fundit resinā, quæ ad eadem pollet. Quæ vero spissarū generi ascribuntur, quædam ex pineis nucibus, aliæ abiete, aliæ picea & pinu exierunt. Eligi debet longe omnium odoratissima, translucēs non ruffa, nec humida, quandam ceræ faciem præbens, et friabilis. E piceā et abiete resinæ, cæteras antecedunt, odoratæ enim sunt, atq; thus odore imitantur. Præstantiores a pytiusa insula deferuntur, quæ secundum hispaniā sita est. Sed quæ e picea, nucibus pineis & cupressu

so manarunt, nihil ad illas, nec tantis viribus potiuntur. Verumta-
men eorumdem gratia vt illæ sumi solent. Lentiscina terebinthinæ cor-
respondet. Vritur resina omnis liquida in vase quadruplæ capacitatis
ad humorem, qui infunditur. Itaq; resinæ congius, in duobus aquæ
pluuiæ coquitur, subiectis leuibus prunis, resina assidue mouetur, do-
nec omnis odor aboleatur, & friabilis et stridula reddatur, ac digitis
cedat. Cæterum vbi refrigit, in fistile non picatum, quod aconitum vo-
cant, id est non illitum, reconditur. Fiet etiam eximij candoris, si resi-
na omnis eliquata præcoletur, quo sæculenta sordes excernatur. Vrun-
tur quoq; sine aqua, primum lento igne, & vbi coire cœperunt, maior
carbonum strues supponitur, & triduo citra intermissionem disco-
quantur, vsq; dum suum odoris virus exuerint. Mox vt dictum est re-
ponuntur. Spissam vnus diei spacio decoxisse satis est. Vstæ odoratis
malagmatibus, & acopis & vnguentorum colorationibus magnope-
re vtiles sunt. Et resina perinde atq; thure fuligo excipitur, ad circunli-
tiones idonea, quibus palpebras fucant, & colorem mētuntur. Pro-
dest glabris genis, collachrymationibus, erosiq; oculorum angulis.
Ex ea fit atramentum scriptorium.

De Pice liquida.

CAP. XCII.

Picea liquida quam alij conum vocant, e pinguisimis pini pi-
ceæq; lignis congregatur. Optima est splendens, syncæra, læ-
uis. Contra venena, phthisin, purulentam excreationem, tuss-
se, suspiria, & pectoris humores qui difficile extussuntur, efficax est,
eclegmate cyathi mensura cum melle dato. Tonsillarum & vuæ in-
flammationes, anginaq; vtiliter perunguntur. Purulentis auribus in-
funditur cum rosaceo. Et illinitur cum trito sale serpentium morsu-
bus. Adiecta vero pari cæra scabros vngues extricat. Tubercula
vulvæ, et duricias sedis, discutit. Cum farinaq; hordeacea et pue-
ri impubis vrina decocta, strumas rumpit. Cohibet vlcera quæ sere-
punt, cū pineo cortice, aut sulphure, aut surfuribus illita. Cæterū cum
thuris manna & cærato subductos vlcerū sinus conglutinat. Rimis
sedis & pedū, magno auxilio illinitur. Vlcerā replet, & cū melle pur-
gat. Quin & cū vua passa & melle carbūculos, & putrida vlcerā emar-

c. j.

DE MEDICINALI MATERIA

ginat. Erodentibus medicamentis quas septas vocant, probe immiscetur.

De Picino oleo.

CAP. XCIII.

Pice fit quod pisselæon appellant, separato liquore aquoso qui supernatat pici, sicut serum lacti. Nam expansa quamdiu pix coquitur supra cortinam vellera madescunt, acceptoque halitu eius exprimuntur in vas. Quas pix liquida præbet utilitates. Alopecias capillo replet cum farina hordeacea illitum, quibus & liquida pix medetur. Iumentorum ulcera scabiemque emendat.

De Fuligine liquidæ picis.

CAP. XCIII.

In hoc modo est liquida pice fuligo. In lucerna noua quæ ellychnium habeat, nonnihil picis incendito, lucernamque fidei vase in clibani speciem conformato, superius in angustum fornicato, inferius perforato ut clibani esse solent, operito, & adoleri finito, consumptoque liquore nouum infundito, quo ad sufficientem vsui fuliginem collegeris. Vis ei adstringens, acrisque. Vtui est ad pigmenta quibus palpebras linunt & venustant, & ad circunlitiones, ite ubi glabris genis pilos restitui oportet, ad imbecilles lachrymososque oculos. Insuper ad eorundem ulcera non inutilis est.

De Sicca pice.

CAP.

XCIV.

Iquida pix decocta in spissam coit, quam vocant aliqui palimpissam, quo in genere quædam visci modo lentescit, boscas cognominata. Altera sicca est. Probatur pura, pinguis, odorata, subrufa, resinosa. Calfactorem vim habet. Dura emollit. Pus mouet. Tubercula panosque discutit. Ulcera replet. Vulnerarijs medicaminibus commode permiscetur.

De zopissa.

CAP.

XCVI.

Opissam aliqui aiunt derafam nauibus resinam cum cæra, quam alij apochyma appellant. Ea dissipandi naturam habet, quoniam marino sale macerata fit. Alij pineam resinam hoc nomine vocauerunt.

De Bitumine. CAP. XCVII.

Itumen iudaicū ceteris anteponitur. Cuius probatio est vt
 b purpuræ modo splēdeat, sitq; graue, ac validū odorē vibret.
 Nigrum autē et sordidum, vitiosum est. Adulteratur pice.
 Gignitur i scenice, babylone, zacintho, et sydone. Liquidū iuenitur in
 Agragrantino siciliæ, fontibus innatans, quo vtuntur ad lucernarū
 lumina olei vice. Hallucinātur qui id sicilicum oleū nominant. Nāq;
 liquidi bituminis genus esse constat.

De Pissasphalto. CAP. XCVIII.

Ascitur in apolloniatarū agro circa epidamnum quæ pissas
 n phaltos appellatur. Ea ceraunijs montibus deuoluta, impe-
 tu fluminis rapitur, æstuq; in littus expuitur, illic coacta in
 glebas. Mistam bitumini picem redolet.

De Naphtha. CAP. XCIX.

Aphtham vocant babylonij, bituminis colamen, colore cādī
 n dum. Inuenitur etiā nigrum. Vis ei ignium rapax, ita vt ex
 spacio protinus in eam transfiliat. Ad suffusiones oculorum,
 et albugines vtilis. Bitumen omne discutit, glutinat, emollit. Ab inflā-
 matione tuetur. Vuluarum procidētia, strangulationesq; olfactu, suffitu
 impositu, emendat. Comitiales morbos suffitum depræhēdit, gagatis
 lapidis more. Purgationes mulierum cum vino et castorio potum eli-
 cit. Tussim veterē et anhelitū adiuuat. Serpentiū moribus, coxendicū
 laterūq; doloribus, auxiliatur. Datur cœliacis in catapodio deuorādū.
 Cum aceto potum discutit sanguinem concretum. Dysentericis cum
 ptisana liquatum infunditur. Distillationibus suffitione medetur. Mi-
 tigat dentium dolores oblitum. Ceterū pilos incommodos siccum re-
 plicat, specillo impositum. Concalfactum autem et cum farina horde-
 acea nitro et cera illitū, podagris, articularū doloribus, lethargicisq;
 prodest. Pissasphaltos eadē quæ pix et bitumen si miscantur potest.

De Cupresso. CAP. C.

Vpressus refrigerat et astringit. Cuius folia ex passo et exigua
 c myrrha vesicæ rheumatismis, et vrinæ difficultati auxiliā-
 tur. Pilulæ autem ex vino tusæ in dysenteria, alui fluctione,
 tussi, et orthopnœa, aut si reijciatur sanguis, conuenientissime bibun-
 tur. Earum decoctum eosdem præbet effectus. Tusæ cum fico durici-
 as emolliūt. Nariūq; polypo medetur. In aceto coctæ & cū lupinis de-
 tritæ scabros vngues eiiciunt. Hernias intestinorum prolapsu erūpē-
 tes illitu reprimūt. Folia eadē præstāt. Pilulæcū arboris coma suffitæ,
 culices abigere existimātur. Folia trita & iposita vulnera cōglutinant.
 Sāguinē supprimūt. Capillū ex aceto tingūt. Illinūtur per se aut cū
 c .ij.

DE MEDICINALI MATERIA

polēta ignibus sacris, vlceribus quæ serpūt, carbūculis, & oculorū inflammationibus. Admota cum cærato stomachum corroborant.

De Iunipero parua. CAP. CI.

i Vniperum parua græci arceuthida, aliqui Mnesitheum, alij acatalidem, ægyptij Libium, Galli iupicellum, Romani iuniperum vocant. Eius duo genera. Altera maior, altera minor. Vtraq; acris est. Excalfacit, & vrinam mouet. Accensa serpentes fugat. Baccarum nonnullæ nucis iuglandis magnitudine nonnūquam grandescere, aliæ nucem ponticā æquare inueniuntur, rotundæ, odoratæ, in mandendo dulces, subamare, quæ archeutidis etiam nomē id est iuniperi retinuerunt. Modice calfaciūt & astringunt, stomacho vtiles. Contra pectoris vitia, tussim, inflationes, tormina & serpentium ictus efficacissime bibuntur. Vrinam cient. Vnde ruptis, conuulsis, & vuluæ strangulatui subueniunt. Folia acrimoniam habent. Ideo tam ipsa q̄ eorum succum ex vino contra viperarum morsus illini, aut bibi prodest. Corticis cinis cum aqua illitus lepras eximit. Ramenta ligni deuorata interficiunt.

De Iunipero magna. CAP. CII.

i Vniperus magna, quam aliqui syluestrem cupressum appellant, alij Mnesitheum, alij Acateram, Romani Iuniperum, vulgo cognita est, cupresso assimilis. Asperis maritimisq; locis plerumq; nascitur, easdem quas supradicta vires habens.

De Hærbæ Sabina. CAP. CIII.

g Ræcis brathy, alijs baryton, alijs baron, romanis hærbæ sabina appellatur. Duorum generum est. Vna folijs cupresso similis, spinis horridior, grauiter olens, acris & feruens. Arbor est coactæ breuitatis, quæ sese magis in latitudinem fundit. Huius folijs nonnulli pro suffitu vtuntur. Altera tamaricæ folio similis est. Vtriusq; folia nomas sistunt. Collectiones illitu mitigant. Et cū melle nigricias sordesq; repurgant. Carbunculos cū vino pota rumpūt. Sanquinem per vrinā eliciunt. Partus apposita extrahunt. Et suffitu idem præstant. Vnguentis calfacientibus immiscētur & priuatim gleucino.

De Cedro. CAP. CIIII.

c Edrus arbor magna est, ex qua picē colligunt, quæ cedria vocatur. Iuniperi modo baccas parit, baccarum myrti magnitudine, rotundas.

De Cedria. CAP. CV.

c Edria optima est crassa, perlucida, validi odoris. quæ dum effunditur, guttatim non dissipata coit. Cui ea vis inest vt de fundæ corpora conseruet, et viuētia corrumpat. Qua ex cau

sa mortuorum vitam aliqui appellauere. Vestimenta quoque & pelles, eximia calfaciendi et siccandi dote, corrumpit. Magni ad ocularia medicamenta vsus. Quippe illita oculis claritatem affert. Albugines cicatricesque detergit. Instillata autem cum aceto, vermes aurium necat. Cum hyssopi decocto infusa, sonitus sibilosque sedat. Causa dentium idita eos frangit, & dolores leuat. Quapropter cum aceto colluere eosdem prodest. Peruncto ante coitum genitali abortiuum fieri constat. Anginae ea perunguntur. Tonsillarum inflammationibus auxilio est. Lendes pediculosque illitu enecat. Cerastræ morsibus cum sale imposita subuenit. Contra hausta leporis marini venena, in passo sumpta auxiliatur. In elephanta aut linctu, aut perunctione proficit. Pulmonum vlcera purgat, & si cyathus eius sorbeatur, persanat. Tineas & cætera ventris animalia necat. Infusa partus extrahit. Fit et oleum, a cedria separatim dum coquitur, velleribus supra halitum eius expassis, ut in pice. Eiusdem ad omnia vsus. Priuatim vehementer perunctum scabiem quadrupedum, canum, bouumque persanat. Inhaerentes ricinos enecat. Vlcerum quæ ex tonsura acciperunt, ad cicatrices perducit.

De Cedride. CAP. CVI.

Edrides cedri fructus vocatur. Calfaſtoriâ vim habet. Stomacho aduersantur. Auxilio sunt tussi, couulsis, ruptis, straguriæ. Menses ciunt, ex polline piperis poti. Contra haustum leporem marinum in vino sumuntur. Serpentes fugantur, peruncto ex adipe ceruino, aut medulla, corpore. In antidota adduntur. Fuliginem quomodo ex pice, congeri oportet, quæ eandem quæ picea fuligo vim præbet.

De Lauro. CAP. CVII.

Aurus quædam tenui folio constat. Altera latiore. Vtraque ex calfaſtoriam naturam habet & emollientem. Vnde decoctum earum in muliebres infusus additum, vuluæ & vesicæ vitij conuenit. Virentia folia sensim substringunt. Illita quoque vesparum apiumque ictibus opitulantur. Eadem cum polenta aut pane illita inflammationem omnem mitigant. Sed pota stomachum effundunt, et vomitiones mouent.

De Baccis lauri. CAP. CVIII.

Auri bacca magis quam folia calfaciunt. Ergo in eclegmate cum melle vel passo profunt tabi, orthopnoeæ, & omnibus thoracis rheumatismis. Contra scorpionum ictus ex vino bibuntur. Vitilignes emaculant. Succus baccarum vtilissime aurium dolori et grauitati instillatur, cum vino vetere et rosaceo. In medicamentum autem adijciuntur quæ nervorum lassitudines reficiunt, acopa vocant, et ad vnguenta quæ calfaciunt et discutiunt. Cortex radice calculos rumpit.

c. iij.

DE MEDICINALI MATERIA

Partus necat. Hepaticis prodest, tribus obolis in vino odorato potus

De Platano. CAP. CIX.

t Enerrima platani folia in vino decocta, mox illita, oculorum
fluctiones fistunt. Tumores & inflammationes leuant. Deco-
ctus cortex in aceto, dentes in dolore colluit. Virides pilulæ
in vino potæ, serpentium moribus auxiliantur. Exceptæ autem adipe
igni ambusta sanant. Incidens foliorum pilularumq; lanugo, oculos &
aures defendit.

De Fraxino. CAP. CX.

f Raxinus arbor nota est, cuius folia cum succo peruncta, aut
ex vino pota, viperarum ictibus auxiliantur. Corticis cinis
ex aqua illitus lepras eximit. Ramenta scobemq; potu, per-
niciem afferre tradunt.

De populo alba. CAP. CXI.

p Otus albæ populi cortex vnciæ vnius pondere, ischiadicis
ac vrinæ stillicidio prodest. Abortiuum fieri tradunt, si cum
mulino rene bibatur. Folia quoq; cum vino post purgatio-
nes pota, idem præstare produntur. Tepens foliorum succus vtiliter au-
rium dolori instillatur. Pilulæ quæ primo foliorum partu exiliunt, illitæ
cum melle, oculorum hebetudini medentur. Memoria prodiderunt cor-
ticem albæ populi particulatim cæsum, & sulcis stercoreatis mandatū,
omni tempore anni edules fungos proferre.

De Macere. CAP. CXII.

m Acer ex barbaria aduehitur, cortex flauescens, crassus, gustu
perq; astringens. qui contra cruentas excreationes, dysente-
rias, & alui fluctiones bibitur.

De Vlmo. CAP. CXIII.

v Lmi & folia & cortex & rami, vim habent spissandi. Folia tri-
ta ex aceto ad lepras efficaciter illinuntur. Vulnera glutinant,
sed multo magis corticis tilia, si fasciæ loco intorqueatur. Nā
lori more flecti potest. Crassior cortex in vino aut aqua vnciatim po-
tus, pituitas trahit. Fracta ossa celerius solidescunt, si decocto foliorum
corticis aut radicis foveatur. Humor in folliculis enascens prima ger-
minis eruptione, cuti illitus nitorē inducit, faciemq; splendidiorē præ-
stat. qui dū siccatur, in animalia abit, quæ culicū formam gerunt. Folia
cum tenerefcunt, holerum more ad obsonia vsurpantur.

De Lignorum marcore. CAP. CXIII.

i Ncidens caudicibus lignisq; veteribus caries congeritur,
quæ farinæ modo illita, vlcera purgat, & ad cicatricem per-
ducit. Serpentina cohibet, si cum pari aniso & vino subacta,

linterisq; imposita, illinatur.

De Populo nigra.

CAP. CXV.

P Opuli nigrae folia cum aceto illita, magna vtilitate podagricis doloribus illinuntur. Resinam populus fundit, quae in malagmata additur. Semen potum ex aceto comitialibus vtile est. Lachrymam commemorant, quae in padum amnem defluat, durari ac coire in succinum, quod electrum vocant, alij chrysophoron. Id attritu iucundum odorem spirat, & aurum colore imitatur. Tritum, potumq; stomachi ventrisq; fluctiones sistit.

De Harundine.

CAP. CXVI.

I N harundinum genere quaedam nastos vocatur, ex qua sagittae factitari solent. Alia foemina qua tibiaram ligulas efficiunt. Alia quod fistulis addita sit, Syringias, cui multum inest carnis, crebris cineta geniculis, ad librorum conscriptionem accommodata. Alia crassa, coeua, apud amnes nascens, quae a quibusdam cypria, ab alijs donax appellatur. Alia phragmites seu vallatoria, gracilis, candidans, vulgo cognita. cuius trita radix per se, aut cum bulbis suis illita, spicula aculeosq; corpore extrahit. Luxata, lumborumq; dolores, cum aceto mulcet. Virentia folia tusa & imposita ignibus sacris medetur, & ceteris inflammationibus. Corticis cinere peruncta cum aceto alopeciae sanantur. Paniculae lanugo si aures intrauerit, exsurdatur. Eundem effectum implet harundo quae cypria dicitur.

De Papyro.

CAP. CXVII.

P Apyrus qua chartae fiunt, nullis non cognita, praecipue in medicina vtilitatis ad laxandas fistulas. Madafacta lino inuoluitur usq; dum inaruerit. Constricta enim atq; immissa in hiatum humore completur, et intumescendo fistulas aperit. Habet nescio quid alimenti radix. Itaque aegypti eam mandunt, succum tantum deuorantes, & mansam expuunt. Iplis radicibus pro ligno vtuntur. Crematae papyri cinis depascentia vlcera cum omnium partium, tum oris maxime, cohibent. Verum melius id combusta charta praestat.

De Myrica.

CAP. CXVIII.

M yrica seu tamarix arbor vulgo cognita est, cum apud pigras & stagnantes aquas enascatur, fructum quasi florē ferens copiose mucosum. Aegyptus syriaq; altera gignunt mitiore, syluestri caetera similem. Fructum parit gallae proximum, inaequaliter asperum gustu, quo conuenienter vtimur vice gallae in medicaminibus oculorum orisq;. Datur cruentae excreationi in potu, & coeliacis, & contra profluvia foeminarum, regium morbum, et phalangiorum morsus;

c. iiii,

DE MEDICINALI MATERIA

Illitus tumores inhibet. Cortex in eisdem vsus adhibetur. Decoctum foliorum cum vino potum, lienem absumit. Ad dolorem dentium in collutionibus salutare, & mulieribus fluctioni vuluæ oportunis, in defectionibus. Phthiriasi lendibusq; circumfusum prodest. Abundantiam fœminarum sistit impositus arboris cinis. Potorios calices e caudice lienosis moliuntur, quo datus in his potus proficiat.

De Erica. CAP. CXIX.

c Rica fruticosa arbor myricæ similis, longe minor, cuius flore apes reprobum mel efficiunt. Tam flos quam coma serpentium ictibus illitu medetur.

De Acacalide. CAP. CXX.

a Cacalis fructus est nascētis in ægypto fruticis, seminis myricæ quadā tenus similis, cuius aqua in qua maduerit ad collyria additur, quæ ad excitandā oculorū aciem conueniūt.

De Rhamno. CAP. CXXI.

r Hamnum alij persephonion vocant, alij leucacantham, Romani spinā albam, aut cerualem, Aphri atadim. Rhamnus fruticat, in sepibus ramos ferens rectos & aculeos in acutæ spinæ modum, folijs paruis, oblongis, suppinguibus, teneris. Alterū ei genus candidius. Tertium nigrioribus latioribusq; folijs constat, et quadam tenus rubentibus, cuius rami quinum cubitorum longitudinem implent, infirmioribus horrentes spinis, innocentioribusq; fructum ædit latum, candidum, tenuem veluti folliculum, hastulæ regiæ similem. Omnium folia igni sacro, & serpentibus vlceribus, efficaciter illinuntur. Fama est ramos huius valuis fenestrisve impositos, veneficia depellere.

De Halimo. CAP. CXXII.

h Alimum alij damafonium vocant, alij Erymon, alij Brettaniam, alij Rhabdion, alij Basilion, magi Mercurij basim, aut Ofiridis diadema, alij Elystephanon aut sacrum caulem, pythagoras Anthenoros, ægyptij asontiri, alij asphen, alij asealuri, alij asariphen, Latini Albutium aut Ampeluciam. Halimus frutex est sepimētis idoneus, similis rhamno, sine spinis, folijs oleæ, sed latioribus. Nascitur in sepibus & maritimis. Folia decoquantur ciborum gratia. Radix conuulsa, rupta, torminaq; mitigat, dragmæ pondere in aqua mulsa pota. Eadem lactis vbertatem facit.

De Paliuro. CAP. CXXIII.

p Aliurus frutex cognoscitur aculeatus, durus, cuius semen pingue et fuliginosum inuenitur. Quod potum tussi opitulatur. Vesicæ calculos cōminuit. Serpentium ictibus aduer-

LIBER PRIMVS

21

fatur. Folia & radix astringentiam vim habent. Quorum decoctum potu aluum sistit. Urinam trahit. Contra venena & serpentium morsus auxiliatur. Radix recētia tubercula, tumoresq; omneis discutit, trita & imposita.

De Acuta spina.

CAP. CXXIII.

Cuta spina, quam pyrinā aut pityanthen aliqui vocāt, arbor
a est pyrastro similis, spinosa, et minor. Baccas profert myrti, plenas, rubras, fragiles, & intus nucleū, radicē multifidā, alte descendente. Huius baccæ potu aut cibo, alui profluuium, & abundantiā fœminarum sistit. Radix illita aculeos & spicula extrahit. Arborum fieri tradunt, si ter radice vëter, aut sensim feriatur aut perungatur.

De Rubo canis

CAP. CXXV.

Rutex est arboris instar, rubo longe maior. Folia fert multo
f latiora myrto, firmis circa ramos spinis, flore candido, fructu oblongo, nucleo oliuæ simili, qui per maturitatem fuluescit. et floculos intus continet. Fructus exemptis interioribus flocis arefactus, aluum sistit. Feruefacti enim ij in vino, mox poti, arteriam infestant.

De Ligustro

CAP. CXXVI.

Igustrum arbor est oliuæ folijs circum ramos, latioribus, mollioribus, et virentioribus. Flore candido, muscolo, odorato, semine sabuci, nigro. Optimum nascitur in Canopæ et ascalone. Folia astringentiam vim habent. Quare commanducata vlcerebus oris medentur. Illita feruidis inflammationibus, carbunculisq; profunt. Decocto eorundem igni ambusta fouentur. Capillum ruffant trita folia, que in radiculæ succo maduerint. Flos ex aceto fronti illitus capitis dolorē sedat. Cyprinum oleum quod ex eo fit, excalfacit, emolliq; nervos, quoniā mista quæ feruenti natura prædita sint, assumat.

De Tilia

CAP. CXXVII.

Tilia arbor est ligustri magnitudine. Folijs oleæ, nigrioribus
t et latioribus. Fructu lētisci, nigro, subdulci, racematim coherentē. Asperis nascitur. Huius folia astringūt, ad eadem vtilia ad quæ oleaster, cum astringēte est opus, maxime ad infantium vlcera in ore, commanducata, aut si decocto colluantur. Pota urinā ac menses cient.

De cisto

CAP. CXXVIII.

Cistus quem aliqui citharon, aut cissaron vocant, ramosus fructu
c tex est, sed improcærus, foliosus, saxosis locis nascens. Folijs rotundis, acerbis, hirsutis. Flos masculo vt mali punicæ, fœminæ albet. Vis astringens, vnde flores in vino austero bis in die po-

DE MEDICINALI MATERIA

ti, profunt dysentericis. Et nomas illiti cohibent. Vetus tati vlcerum, et igni ambullis cum cerato medentur.

De Hypocistide.

CAP. CXXIX.

h Hypocistis Robertron, aut cytinus a nonnullis cognominata, iuxta cisti radices nascitur, floris punici similitudine.

Quædam flaua. Altera virens. Tertia candida. Liquatur acaciæ modo. Aliqui tamen exiccant, fractamq; macerant, et iocoquunt, reliqua; vt in lycio prosequuntur. Vires acaciæ habet. Verum aliæ quâto magis siccant, et astringit. Prodest dysentericis, cœliaciis, sanguinem excreantibus. Fœminarum profluuio et pota et indita.

De Ladano.

CAP. CXXX.

e St et alterum cisti genus, ledon a nonnullis appellatū, frutex simili modo nascens, longioribus folijs et nigrioribus, quæ verno tempore quiddam contrahunt pingue. Foliorum vis astringens, atq; effectus cisti præbens. Fit ex eo quod ladanum dicitur. Siquidem cum cisti frondes pascuntur capræ hirci; pinguitudinem conspicue barba carpunt, et suo lentore vilofiscruribus adhærescentem reportant, quam depeñtentes incolæ, colantesq; cogunt in offas, et ita recondunt. Alij vero attractis funiculis, insidentem fruticibus lentorem abstergunt, conglomerantq; in ladanum. Maxime probatur odoratum, subuiride, facile mollescens, pingue, quod arenas non collegit, nec squallore obfitum est, resinofum, quale in cypro gignitur. Arabicum vero lybicumq; vilius. Natura ei spissandi, calfaciendi, molliendi. Laxat ora venarum. Capillum fluentem continet, addito vino myrrha aut myrteo oleo. Cicatricibus decorem reddit cum vino illitum. Medetur aurium doloribus cum hydromelite aut rosaceo infusum. Suffitu secundas eiicit. Pessis immisum, vuluæ duriciæ sanat. In medicamenta quæ dolorem tussimq; finiunt & malagmata vtiliter inseritur. Aluum sistit cum vino vetere potum. Et vrinam ciet.

De Hebeno.

CAP. CXXXI.

h Ebenus optima habetur æthiopica & nigra, nullo habes venarū discursus, s& titij cornus læuitate. Cū frāgitur densa apparet, mordēs gustu, atq; astringēs. Suffitur iucūdo odore supra carbones sine fumi tædio. Recens autē ad ignē prolata ob pinguitudinem accenditur, & trita ad cotem flauescit. Altera est Indica internatis segmentis candicantibus, & modice fuluis, item frequentibus maculis. Cæterum prior, bonitate antecedit. Apud quosdā sesamina, aut spinea ligna, hebeni vice veneūt. quod discernitur ex eo, quod fungosa sunt, et in purpureas assulas resoluuntur, nichil mordacitatis in gustu nec redolentiæ in suffitu præferentia. Caliginem oculorum absterget.

LIBER PRIMVS

22

Ad veteres distillationes, pustulasq; mirū in modū pollet. Si quispiā facta ex eo coticula collyrijs vtatur, meli⁹ proficiet. Ad oculorū medicamenta efficax est, si scobes ramenta ve vino chio die noctuq; macerata, in collyria digerantur. Nonnulli prætrita ramenta excolant, reliquaq; eundem in modum peragunt. Alij pro vino aqua vtuntur. Vritur in fistili nouo donec in carbones redigatur. Lauatur plumbi modo, & ita siccis lippitudinibus conducit.

De Rosa. CAP. CXXXII.

Osa refrigerat & astringit, sed sicca multo magis. Succus recentibus folijs exprimitur, desectis forfice vnguibus, sic appellantur candidæ foliorū partes. Reliquū in pila premi & teri debet in vmbra, donec cogatur, & ita ad oculorū circūlitiones recodi. Siccatur etiam nū folia rosarum, continuo versata, ne muceāt, neve situs in ijs insideat. Aridis rosis & in vino decoctis expressus liquor, facit ad dolores capitis, auriū, oculorum, gingiuarū, sedis, recti intestini, ac vuluæ, pīna illitus aut infusus. Eadē sine expressione tusa, præcordiorum inflammationibus, humidis stomachi vitijs, igni sacro illini prodest. Siccis ac tritis fœmina asperguntur. Misceri solent vulnerarijs antidotis atq; compositionibus quas antheras vocant. Folia vruntur in calliblephara. Flos qui in medijs rosis inuenitur, siccatus, gingiuarum fluctationibus efficaciter inspergitur. Capita pota citam aluum, et cruentas reiectiones sistunt.

De Roseis pastillis. CAP. CXXXIII.

Astilli quos rodides vocant, hac ratione conficiuntur. Rosarum viridium, quæ nullo antea humore madefactæ exaruerint, drachmæ triginta, indicæ nardi drachmæ decem, myrrhæ drachmæ sex, tritæ digeruntur in pastillos, qui trium obolorū pondus æquēt. Siccatiq; in vmbra, in fistili non picato, atq; obturato recoduntur. Alij adiiciunt costi drachmas duas, iridis illyricæ totidem, & vinum chium cum melle miscent. Mulieribus monilium loco vsui sunt, ad retundendum graue sudoris virus. Tritis etiam vtuntur ad ilitiones & diaspasmata quæ fiunt ad sudores coercendos, ita vt a balneis inarescant corpora, dein frigida aqua abluantur.

De Lycio. CAP. CXXXIIII.

ycium quod aliqui pyxacanthan vocant, arbor est spinosa, ramis trium cubitorum, aut longioribus, folijs buxi, densis, fructu piperis, nigro, læui, amaro, densoq; cortice pallido, nō dissimili lycio madefacto, radicibus multis, obliquis, lignosis. Nascitur plurimum in Capadocia, Lycia, & plerisq; alijs locis. Aspera loca amat. Coquuntur rami cum radiculis tusi & ante per aliquot dies mace-

DE MEDICINALI MATERIA

rati, tum abiectis lignis denuo liquor coquitur, donec mellis crassitu-
do fiat. Adulteratur id lyciū adiecta decoctioni amurca, aut absinthij
succo, aut felle bubulo. Innatans spuma inter coquendum exempta, oculorum
medicamentis additur. Reliquo ad alia vtuntur. Simili modo
fit lycium, semine expresso & insolato. Optimum quod vri potest, res-
stinctumque rubentem spumam ostendit, glebis extrinsecus nigris, intus
cum fregeris ruffis, ingustabile, cum amaritudine astringens, crocino
colore, cuiusmodi Indicum est, ceteris præstātius. Lyciū astrigit. Caliginem
oculorum discutit. Genarum scabiem, pruritus, veteresque fluxiones sanat,
Facit ad purulentas aureis, exulceratas gingiuas, tonsillas, labiorum fissuras,
sedis rimas, attritusque illitum. Celiacis, dysentericis, potum inditumque
conuenit. Datur sanguinem excreantibus, & tussis ex aqua. Contra rabiosi canis
morsus in catapotio deuoratur, aut in aqua bibitur. Flauos facit pilos.
Paronychijs, vlcerebus quæ serpunt aut putrēt, medetur. Fœminarum
profluuia appositum sistit. Rabiosorum ictibus ex melle potum, aut vice
catapotij deuoratum, auxilium tur. Tradūt Indicum fieri lycium, ex frutice lonchitide
appellato. Ea spinarū generi ascribitur, ramos rectos habēs, ternū cubitorū
lōgitudine, maioresve, rubo crassiores, a radice numerosos. Fructus cortex
rubescit. Folia oleæ similia. Hærbæ in aceto decocta proditur lienis
inflammationibus et regio morbo mederi. Et fœminarū purgationes elice-
re. Assueuerant etiam crudam in potu, eisdem effectus præstare. Semen
cyatho dimidio potum, pituitam expurgare. Venenis quoque auxilio esse.

De Acacia.

CAP. CXXXV.

Acacia in ægypto nascitur instar arboris, frutice spinoso, non se in rectum attollente. Florem habet candidum, & semen lupino simile in folliculis, ex quo succus expressus ficatur in vmbra, niger ex maturo semine, subruffus ex viridi. Eligatur modice ruffus & odoratus. Aliqui folia cum semine exprimunt. Manat & gummi ex ea spina. Vis ei ad spissandum, refrigerandumque efficax. Succus oculorum medicamentis vtilis. Valet ad ignem sacrum, vlcera quæ serpunt, perniones, pterygia, & oris vlcera. Procidentes oculos reprimat. Mensium abundantiam sistit. Prociduam vuluam cohibet. Citam aluum suppressit aut potus aut inditus. Capillos denigrat. Lauatur oculorum medicamentis, trito in aqua, mox effuso quod concreuerat, donec pura extet aqua. Et ita cogitur in pastillos. Vritur etiam in fictili nouo fornacibus, torreturque in carbonum halitu perflata. Spinæ decoctum solutos artus fotu committit. Præfertur eius spinæ gummi, quod in vermiculorum speciem contrahatur, & vitri mo-

do perluceat, ligni expers. Proximum est candidum. Sordidum vero ac resinofum inutile. Cutis meatus obstruit. Et medicamentorum quibus ammiscetur, acrimoniam hebetat. Ambustis ex ovo illitum pustulas non patitur erumpere.

De Acacia altera. CAP. CXXXVI.

Alterum acaciæ genus in capadocia pontoque prouenit, ægyptiæ spinæ similitudine, longe minor, tenerior, humilis. Aculeorum vallo munitur, folia habens rutæ. Semen lenticulaminus fert autumno, in loculis ternū quaternumque seminū capacibus. Succus eius astringit, viribus inferior, & ocularibus medicamentis inutilis.

De Amurca CAP. CXXXVII.

Murca expressæ oliuæ recrementum est. Decocta in cupreo vase ad crassitudinē mellis astrigit, cæteros præbēs lycij effectus. Insuper dentiū dolori, & vulneribus, cū aceto, vino aut mulso, cōmode illinitur. Additur in medicamenta ocularia, et meatus obstruētia. Vetustate meliorem fieri constat. Vtiliter iufunditur sedis, genitaliū, et vuluæ exulcerationi. Si vero cum omphacio recoquatur ad mellis crassitudinē, cariosos dentes extrahit. Iumentorum scabiem cum decocto lupini et chameleonte illita sanat. Cruda et recenti amurca podagras articularesque dolores foueri vtilissimum. Peruncta in violosa pelle et hydropicis imposita, tumoris mollem reprimat.

De Vitice. CAP. CXXXVIII.

Gnon aliqui agnon, alij lygon vocant, alij Amictomia non, alij tridaetylon, magi semnon, alij hæma ideos. Aegyptij sum. Romani salicem marinam, alij piper agreste, alij lecrificum. Vitex seu castus frutex est in arborem assurgens. Nascitur in fluminum ripis, asperisque locis, ac torrentium alueis. Ramos gerit prælongos, fractu peruiaces, folia oliuæ, sed molliora. Duo genera eius. Vna harum album florem mittit cum purpureo, altera tantum purpureum, & semen vt piper. Excalfactorias vires habet & astrictorias. Semen eius potum venenatis idibus, aquæ quæ cutem subiit, lienosisque auxiliatur. Lac euocat. Menses ciet, drachmæ pondere in vino potum. Genituram exoluit. Caput tentat, & soporem affert. Decoctum hærbæ & seminis in defessione, mulieribus vuluæ malo opportunis opitulatur. Item inflammationibus. Purgationes mouet semen cum pulegio potum, etiam suffitu vel appositu. Capitis dolorem dissoluit illitum. Instillatur cum aceto & oleo capiti in letargo & phrenitide. Folia suffitu aut substratu fugant venenata. Illita quoque serpentium morsibus auxiliatur. Testium duricias cum butyro et folijs

DE MEDICINALI MATERIA

vitium emolliūt. Rimas sedis semen cum aqua illitum mitigat, et cum folijs medetur luxatis, vulneribusq. Virgam qui manu teneat dū iter facit, negatur intertriginem sentire. Agnum quasi dicas purum vocāt Græci, quoniam matronæ in thesmophorijs atheniensium castitatem custodientes, folijs cubitus sibi sternunt. & lygon quasi vimen, propter inuidiam fere ramorum flexilitatem.

De Salice. CAP. CXXXIX.

f Alix vulgo nota est, cuius semē, folia, cortex, & succus spissā di vim habent. Trita folia cum exiguo pipere et vino pota, ileosis subueniunt. Sumpta cum aqua præstant mulieribus ne concipiant. Salignum semen in potu sanguinē expuentibus prodest. Cortex eodē præbet effectus. Corticis cinis admissio aceto illitus, clauos et callos tollit. Ex folijs et cortice succus cū rosaceo in calice punici calfactus, aurium doloribus auxiliatur. Decocto eorum podagras foueri vtilissimum. Furfures purgat in corpore. Excipitur succus qui manat ex ea, cum floret exciso cortice. In plaga enim concretus humor inuenitur, qui ad purganda quæ obstant oculis, suam vim præbet.

De Syluestri olea. CAP. CLX.

f Syluestris olea, quam aliqui oleastrum appellant, alij æthiopicam oliuam, folia astringunt. Trita autem & imposita ignem sacrum, vlcera quæ serpunt, epinyctidas, carbunculos, paronychia, nomasq. cohibent. Crustas emarginant cū melle illita. Quin etiam sordida repurgant. Inflammationes panosq. cum melle imposita discutiunt. Cutem a capite vlsam conglutinant. Oris vlceribus com manducata medentur. Succus et decoctum eodē habent effectus. Sanguinis eruptiones, ac muliebre profluuium, ad motus succus inhibet. Vuæ oculorum pustulisq. prodest. Vlcers & veteres defluetiones fistit. Quapropter in collyria additur, ad genarum erosiones perq. utilis. Exprimitur succus tuis folijs, affuso vino ex aqua, siccatusq. sole in pastillos digeritur. Sed longe validior ad recondendum succus habetur, qui cum vino q. cum aqua expressus est. Auribus subuenit, siue vlcerentur, siue pus effluat. Folia conuenienter celiacis cum farina hordeacea illinuntur. Vruntur enim floribus folia, vt spodij viscem cinis præstet. In cruda olla oblito ore luto, vsq. dum figlinū percoquatur, restinctaq. vino & rursus subacta, eodē modo vruntur. Postremo cerusæ modo elota coguntur in pastillos. Huiusmodi cines rem in medicamentis oculorum constat spodio non cedere. Sed eisdē viribus præditum esse putandum est. Foliorum satiuæ olea eadē vis intelligitur, sed aliquanto inferior. Vnde ocularibus medicamē

tis ob suam mitiorem vim conuenientior est. Sudor ligno virenti ac cēso manans, illitu sanat lichenas, furfures, et scabiem. Oleaginum semen illitu medetur furfuribus, et vlceribus quæ depascunt vorantq. Quod autem intra nucleum est ex adipe & farina scabros vngues excutit.

De Colymbadibus oliuis CAP. CXLI.

Olymbades tritæ & ambustis illitæ, pustulas gigni prohibēt. Sordida vlcera purgant. Muriæ succus collutas gingi-
c uas contrahit. Et motus dentium firmat. Oliua flaua & recēs-
stomacho vtilior est. Vētri difficilis. Nigra autem & matura, corrup-
ptioni oportuna est. Stomacho aduersatur. Oculis non conuenit. Ca-
pitis dolorem mouet. Arefacta illitu depascentia vlcera fistit. Et car-
bunculos emarginat.

De Oleo syluestris oliuæ CAP. CXLII.

Leum syluestris oliuæ humidis gingiuarū vitijs colluitur.
o Dentiū mobilitates stabilit. Calfacti fatus, gingiuis fluctio-
ne laborantibus vtilis est. Lanā enim specillo circūligatam
oleo madefacere oportet, et gingiuis adinouere, donec albæ spectētur.

De Lachryma æthiopica olea CAP. CXLIII.

Achryma quam æthiopica olea stillat, scamoniæ similis est,
l fulua, stillis exilibus constans, mordax. Quæ autē ammonis
aci, aut gummi similitudinem refert, colore nigricans, nec
gustum mordens, superuacua est. Nostrates olea, oleastriq. similem la-
chrymam sudāt, quæ cōmode ad oculorū hebetudines illinitur. Cica-
trices albuginesq. illitu emendat. Vrinā et menses ciēt. Cavis dentiū
ipressa, ad dolores efficax est. Inter venena scribitur. Partus pellit. Le-
pras et ipetigines sanat. Appellatur autē æthiopica et agrestis olea.

De quærcu CAP. CXLIII.

Værcus omnis adstrictoriā vim habet, præsertim liber qui
q cortici & ligno intercedit. Quinetiā tunica putamini glādis
subiecta. Decoctum ex ijs datur dysentericis, coeliacis, sangui-
nem excreantibus. Trita in pello, fœminis fluctione vuluæ laboran-
tibus subijcitur.

De Glande CAP. CXLV.

Landes eisdem effectus exhibent. Vrinā ciunt. Capitis do-
g lorem & flatus in cibum sumptæ pariunt. Resistent esitæ
venenatorum ictibus. Decoctum corticis cum lacte vacci-
no potum prodest contra toxica. Intritæ crudæ, inflammationes illitu
leniunt. Ad duricias quas cacoethæ vocant, & malefica vlcera cum sal-
sa axungia conueniunt. Iligneæ glandes viribus quærnas præstant.

DE MEDICINALI MATERIA

De Fago & ilice. CAP. CXLVI.

f Agus & ilex quærcus generi assignantur, & consimile munus obeunt. Illignæ radice cortex cum aqua coctus dum eliquescat & tota nocte illitus, denigrat capillos, prius cimolia terra purgatos. Folia omnium tusa & trita tumoribus profunt. Et imbecillas membrorum partes corroborant.

De Castaneis. CAP. CXLVII.

f Ardianæ glâdes quas aliqui castaneas, aut lopima, aut glandes Iouis appellât, adstringunt, similesq; effectus præbent. Præfertur tunica quæ carnem & corticem media intercurfat. Caro his qui ephemerum biberunt conueniens est.

De Galla CAP. CXLVIII.

g Alla fructus est quærcus. Aliqua omphacitis appellât, parua quidē sed torosa, solida, nullo foramine peruia. Altera plana leuis, perforata. Eligi debet omphacitis, quæ efficacior est. Vtriusq; vis vehemēter adstringere. Tritæ excrescētia in carne, fluctiones gingiuarū & vuæ, atq; oris vlcerationem cohibent. Nucleus, dentium caruēnis inditus dolorem sedat. Crematæ carbonibus donec igne flagrent & vino aut aceto aut acida muria extinctæ, sanguinem supprimunt. Decoctum quibus infidere expedit efficax est. Et contra vuluas procidentes, fluctionesq; Capillos denigrant aceto aut aqua maceratæ. Dysentericis celiacisq; cum vino aut aqua trita conuenienter illinuntur, aut bibuntur. Obsonijs addi debent, aut integræ in aqua præcoqui, in qua nonnihil excoquendum est, quod ipsis conferat. In summa his vtendum ad adstringenda quæ opus sunt.

De Rhoe. CAP. CXLIX.

f Hus quæ obsonijs aspergitur, ab aliquibus erythros appellata, semen est coriarij fruticis. Ita vocari solet, quoniam coriorum insectores ea vtantur ad inspissandas pelles. Arbuscula in petris nascens, binum cubitorum altitudine, folijs oblongis, rubicantibus, in ambitu ferratis, acino vuarum gracilium, denso, magnitudine terebinthi, quadatenus lato. Cuius corticosa tunica perq; utilis est. Folia vim habent adstringēdi & acaciæ effectus præbent. Decoctum capillos denigrat. Dysentericis infunditur, et in potus eorum infususq; adijcitur. Instilatur auribus purulentis. Gangrænas et pterygia cohibent folia ex aceto aut melle illita. Liquamentum fit ex aridis folijs, ad crassitudinē mellis in aqua decoctis, ad eadem vt lyciū cōueniens. Semen eosdē effectus exhibet. Celiacorū, dysentericorumq; obsonijs inspergitur. Fracta desquamata, liuidaq; illitū ex aqua ab inflammatione vindicat. Linguae asperitates cum melle abstergit.

Candida fœminarū profluvia sistit. Hæmorrhoidas sanat, cū quærno carbone intrito admotū. Latex in quo semen maduit decoctus, cogitur coitq̃, efficacior ipso semine. Gummi deferit quod dentium cauis imprimitur, ad dolores finiendos.

De Palma.

CAP.

CL.

Alma in ægypto gignitur. Ea medio autumnī vigore decerpī solet, arabici myrobalani similis, pomatis cognomine, colore viridi, & odore mali cotonei. quod si ematurescens sole percoquatur, phœnicobalanus fiet. Palma acerba est et adstringēs. Contra alui fœminarūq̃ profluvia, in vino austero bibitur. Hæmorrhoidas sistit. Vulnera glutinat illitu. Phœnicobalani plus siccis adstringunt. Capitis dolorē afferunt. Copiosiores in cibo inebriāt. Sicciores sanguinē excreantibus, stomachicis, & dysentericis vtilēs in cibo. Illi nuntur cū cotoneo et cærato œnanthino vesicæ vitijs. Cariotæ præsertim faucium asperitati esu medentur.

De Thebaicis palmis.

CAP.

CLI.

Hebaicarū decoctū potu æstuationē sedat. Vires recreat cum hydromelite veteri sumptū. Cibo idē faciunt. Fit ex eis vinū ad eadē conueniens. Decoctū potu & gargarisatione magnopere adstringit, & cohibet. Nuclei palmarum cæterorū more cremati in crudo fistili, & vino restincti cinere loto, spodij vicē efficiunt. Miscenturq̃ in calliblephara. Quod si non iustam vlsionē acceperint, de nouo cremandi. Vim adstringendi habent, & spiracula cutis obstruunt. Contra oculorum vnam, & pustulas, palpebrarum defluuia, cum nardo effectum præbent. Corporis excrementas reprimunt. Vlcera ad cicatricem perducunt. Sed inter primas vtilēs ex palmis humilibus ægyptiæ.

De Palma Elatē.

CAP.

CLII.

Alma, quam aliqui elaten aut spatham appellāt, fructus palmarum adhuc florentium, tegumentum est calyxq̃. quo in spissamenta vnguentarij vtuntur. Optima habetur odorata, adstringēs, grauis, præclusa, intus pinguis. Vis ei adstrictoria. Sistit vlcera quæ depascunt. Laxatos artus committit. Trita miscetur cataplasmatibus & malagmatis. Prodest præcordijs, imbecilli stomacho, & iocineri affecto, mista cōferentibus cataplasmatibus. Eius decoctum subinde deterfum, capillos denigrat. Datur bibēdum congrue, renum vesicæ & viscerum vitijs. Vuluæ ac ventris fluxiones sistit. Scabiem cum resina & cæra sanat, si viginti diebus recens apponatur. Fructus quem suo amplexu fouet, Elatē etiam vocari solet, & ab aliquibus Borassus. Adstringit & spathæ effectus præstat, non sic vnguentis expetitus. Alba medula caudicis recens in cibo, aut decocta eadem facit.

d. j.

DE MEDICINALI MATERIA

De Malo punico.

CAP.

CLIII.

m Alū punicū omne boni succi est, stomacho vtile, nullū sufficiens alimentū. Dulcia stomacho vtiora habentur. Sed aliquantulū in eo calorem gignūt. Inflationes pariunt. Vnde in febris abdicantur. Acida adstringūt. Aestuanti stomacho auxiliantur. Et multo magis cōtrahūt, ac vrinā ciēt. Ora gingiuasq; lādūt. Vinosa vero mediā fortiūtur naturā. Nuclei acinorū acidi punici i sole siccati, & obsonijs insparsi, concoctive, fluentē aluū stomachūq; hñsunt. Cœlesti aqua madescūt, bibūturq; cōmode sanguinē excreantibus. Ad defessus dysentericorū, fœminarūq; fluctione vuluæ laboratiū vtilēs sunt. Expressus nuclei succus coquitur cū melle ad oris, virilitatis, & sedis vlcera, nomas, reduuias, & ea quæ in corpore extuberant, aurīū dolores, & narium vitia, præsertim acidi.

De Cytino id est flore punici.

CAP.

CLIIII.

h Vius flores cytini vocātur, qui adstringūt, siccāt, cohibēt. Sanguinolēta glutināt. Quas punicū præstāt vtilitates. Humida gigniuarū vitia mobilesq; dētes decocto colluūtur. Herniā prolapsu intestini erūpētē cataplasmate repellūt. Memorix tradūt quī tres q̄minimos cytinōs deuorauerit, nullā eo āno lippitudinē passurū. Eliquat hypocistidis exēplo.

De Mali corio.

CAP.

CLV.

m Alicoriū asperū est mali punici putamē, quod aliqui fidion appellant. Id spissandi vim habet, & quos cytini, præbet vsus. Decoctū radiceis potu latas vētris tineas pellit. Et eadē euocat.

De Balauſtio.

CAP.

CLVI.

b Alauſtiū syluestris punici flos est cytino similis. Cui cōplura genera reperiūtur, cādidū, fuluū, rosaceū. Liquamētū ex eo fit hypocistidis modo. Cui adstrictoria vis inest, eadē faciēs quæ hypocistis & cytinus.

De Myrto.

CAP.

CLVII.

m Myrtus satiuā nigra vtior est medicinæ q̄ candida. Sed hac multo magis mōtana. Semen tamē imbecillius parit. Vis & myrti & seminis adstringit. Semē viride aut aridū in cibo datur sanguinē excreantibus, & vesicæ erosionibus. Succus virentibus baccis expressus eodē effectus exhibet. Stomacho vtilis. Vrinam cit. Prodest cōtra phalāgij morsū, & scorpionis ictus in mero. Seminis decoctū capillū tigit. Ius decocti in vino vlcera in extremitatibus sanat. Oculorū inflammationes illitū cū polline polētæ lenit. Cōtra ægilopas illinitur. Crapulā arcet præsumptū vinū, quod feruefacto semine exprimat, alias enī acorē cōtraheret. Præstat vinū seminis effectus. Vtile procidētix vuluarū in defessionibus, sedis vitijs, & fœminis fluctione vuluæ laborantibus. Purgat furfures, vlcera capitis manantia, atq; eruptiones papularum. Fluentes capillos continet. Additur

quoq; in medicamēto quod liparas vocāt, vti oleū quod ex folijs eius factū est. Decoctū foliorū ad defeffiones balnearū conuenit. Et contra laxatos artus, & male folidescentes. Eo fracta ferruminationi repugnātia vtilissime fouētur. Vitiliginē emēdat. Purulentis auribus infunditur. Et capillos denigrat. Succus eadē efficit. Trita folia & ex aqua illita humidis vlceribus, & mēbris omnibus fluctione laborātibus, cœliacisq; profunt. Et admisto omphacino oleo aut exiguo rosaceo cum vino ad vlcera serpētia, ignē sacrū, testiū inflāmationes, epinyctidas, & cōdylomata. Arētium foliorum farina vtiliter inspargitur paronychijs, pterygijs, & cōtra alarū sœminūq; perfusiones. Cardiacorū sudores cohibet. Folia cruda seu cremata cū cærato ambustis, paronychijs, pterygijsq; medentur. Exprimatur folijs succus adfuso vetere vino aut aqua cœlesti, cuius recētis vsus est. Nā exiccatus plane cariē sentit, & vires amittit.

De Myrtidano. CAP. CLVIII.

Myrtidanū dicitū incremētū inæquabile, verrucosum & cōcolor. Quod perinde quasi manus myrti caudicē amplectitur. Magis q̄ myrtus adstringit. Tustum addito austero vino reponitur, coactūq; in pastillos siccāt in vmbra, multo efficacius & folio & semine, cærato, pessis, infessionibus, cataplasmatibus, admistū vbi adstringēdū aliquid est.

De Ceraijs. CAP. CLIX.

Erasia vētri vtilia sunt, si viridia sumant. Eadē siccata aluū fīstunt. Gūmi quod cerafi resudarūt, cū vino diluto tussi vetustate medet. Colore cōmēdat. Visū exacuit. Appetētā iuitat.

Idē ex vino potū calculosis auxilio est. De Siliquis CA. CLX.

Illicquæ recentes stomacho aduersantur. Aluū soluunt. Eadē siccata fīstunt. Stomachoq; vtiliores sunt. Vrinam ciunt, sed præcipue quæ vinaceis condiuntur.

De Malo. CAP. CLXI.

Olia flores & germina cū omnis mali, tū maxime cotoneæ adstringūt. Pomis acerbis adstringendi vis inest. Maturis vero longe secus. Ex ijs verna bilem gignūt. Nervos lædūt. Inflationes pariūt.

De Cotoneo malo. CAP. CLXII.

Otonea stomacho vtilia. Vrinam cient. Verum tosta accommodatiora habentur. Profunt cœliacis, dysentericis, purulentis lenta extussientibus, cholericis, præsertim cruda. Maceratorum liquor cōmode in stomachi aut vētris fluctionibus, potui datur. Succus crudorum assumptus orthopnoicis salutaris est. Decocto fouentur vuluæ & sedes si procidant. Cotonea quæ melle condiuntur, vrinam mouēt. Mel autem sibi constringentem illā vim & inspissantem adsciscit. Quæ cū melle coquūtur stomacho atq; ori gratiora sunt.

d. ij.

DE MEDICINALI MATERIA

sed minus inspissant. Cruda cataplasmatibus adiunguntur, ad cohibendā aluū, aut si stomachus æstuet, aut in vomitiones effundatur, ad māmārum inflammationes, præduros lienes, & condylomata. Fit vinum ex ipsis tuis expressisq;. Sed quo perduret, quidecim sextarijs succi vnus mellis adiungitur, alioquin in acorē degenerat. Prodest ad omnia quæ dicta sunt. Fit & oleū ex ijs quod melinū vocauimus, quo vtimur quoties adstringēti oleo est opus. Eligi oportet vera, rotūda, parua, & odorata. Quæ vero struthia dicuntur magna quidē sunt, sed minus vtilia. Flos & viridis & fucus cataplasmatibus imponitur, ijs conueniens quæ adstrictionē desiderant. Inflammationibus oculorū, reiectionibusq; sanguinis, contra citam aluum, & mensium impetus, in vino bibitur.

De Malis dulcibus. CAP. CLXIII.

m Elimela vētrē molliūt & animalia expellūt. Stomacho ne-
gociū exhibēt. Aestuosa. Ea a multis dulcia mala vocātur.

De Orbiculatis malis. CAP. CLXIII.

c Pirotica mala quæ latine orbiculata dicūtur, stomacho vti-
lia. Sistunt aluū. Vrinās euocant. Malis tamen cotoneis in-
validiora.

De Syluestribus malis. CAP. CLXV.

f Syluestria mala similia sunt vernis, & adstringunt. Sane in
hunc vsū immatura opus sunt.

De Perficis malis. CAP. CLXVI.

p Erfica poma matura tā stomacho q̄ vētri vtilia sunt. Acerā
ba aluū cohibent, sed sicca vehementius. Decoctum e ficcis
alui stomachiq; fluxiones sistit.

De Præcocibus. CAP. CLXVII.

a Rmeniaca quæ a latinis præcocia dicūtur, minora sunt sue-
prædictis, & stomacho vtiliora.

De Medico malo seu citreo. CAP. CLXVIII.

m Edica mala aut cedromela quæ latini citrea vocāt, nemini
nō cognita. Arbor ipsa omnibus anni tēporibus pomifera,
alijs deciduis, alijs subnascētibus. Malū oblōgū est, rugo-
sum, colore aurum imitans, cū grauitate odoratū. Semen habet pyri.
Id in vino potum venenis resistit. Aluum mouet. Oris suauitatē cō-
mendat, decocto eius colluto, aut succo. Estur in malacia mulieribus.
Vestiaris impositū ab erosionis vitio vestes vindicare existimatur.

De Pyro. CAP. CLXIX.

p yrorum multa genera, quæ tamē omnia adstringunt. Addū-
tur conuenienter in repellentia cataplasmata. Decoctum e
ficcis & cruda ipsa aluum sistunt. Ieiunos esitata lædunt.

De Pyraſtro. CAP. CLXX.

a Chras pyraſtri genus eſt, quod tardiffime matureſcit. Vim pyro adſtringentiorẽ habet. Et ad eadem conuenit. Stringunt etiam eius folia. Ligni pyrorum cinis efficaciter his auxiliatur, quos fungi ſtrangulant. Aiunt fungos ſi ſylueſtria pyra cū eis coquantur, innoxios fieri.

De Meſpilis. CAP. CLXXI.

m Eſpilus quæ a nonnullis Aronia vocatur, ſpinofa arbor eſt, folio acutæ ſpinæ. Fert pomū ſuaue, exigū, tribus itus offi- culis. Qua ex cauſa id nōnulli tricoccon appellauere. Tar- de matureſcit. Eſu adſtringit. Stomacho gratū eſt. Aluūq; ſupprimi- t.

De Setanijs. CAP. CLXXII.

a Lterum meſpili genus in Italia naſcitur, quod aliqui Seta- nium, alij Epimelida vocāt. Arbor folijs mali, ſed minori- bus. Pomum fert rotundum eſui aptum, ima parte latius. Quod adſtringit, ſeroq; matureſcit.

De Loto arbore ſeu faba græca. CAP. CLXXIII.

l Otus arbor eſt vaſtæ magnitudinis, ferens baccā pipere ma- iorẽ, dulcem, graui odore, ſtomacho facilẽ. Aluū ſiſtit bac- cis. Rametorū ligni decoctū ſiue potu ſiue infuſione dyſen- tericis, ac ſceminis fluſtione vuluæ laborantibus, auxilio eſt. Ruſſat capillos. Citam aluum cohibet.

De Corno. CAP. CLXXIIII.

c Ornus dura arbor eſt baccas ferens oliuæ modo oblongas, quæ primum virent, dein per maturitatem rubescunt, aut caræ colorem repræſentant. In cibo adſtringunt. Proflu- uio alui atq; dyſenteria ſalutares, ſiue in edulio, ſiue in cibis exhibean- tur. Muria vt oliuæ condiuntur. Sanies quam virentia folia torrendo reſudarunt, impetigini conuenienter illinitur.

De Sorbis. CAP. CLXXV.

f Orba colorẽ malorū referētia priuſq; matureſcāt, diſſecta & ſole ficcata mandūtur, vt aluū ſiſtāt. Eadẽ eſt functio moli- torum farina, ſi polentæ loco ſumatur. Quod & decoctum eorum in potu præſtat.

De Prunis. CAP. CLXXVI.

p Runus arbor eſt nota, cuius pomū eſt. Sed ſtomachum male habet. Aluum mollit. Syriaca pruna & præcipue quæ damasci gignuntur, exſiccata ſtomacho vtilia ſunt. Aluū adſtringunt. Folia pruni in vino decocta gargarizatu vnam, gingi- uas, & tonſillas fluſtione laboranteis reprimunt. Præſtant idem ſyl-
d .iij.

DE MEDICINALI MATERIA

uestrium prunorum baccae, post maturitatem exsiccate. Cum sapa vero decoctae stomacho vtiliores redduntur. Aluumque magis adstringunt. Gummi prunorum agglutinat. Potum in vino calculos comminuit. Ex aceto quoque illitum impetigines infantium sanat.

De Arbuto. CAP. CLXXVII.

a Rbutus siue vnedo arbor est cotoneae malo non dissimilis, tenui folio. Cuius fructus pruni magnitudinem implet, nullo intus nucleo. Huic apomacolae cognomen est. Maturus aut flauet, aut rubescit, in esu acerosus. Stomacho aduersatur. Capitisque dolorem mouet.

De Amygdalis. CAP. CLXXVIII.

a Mygdalae amarae radicū decoctum, vitia cutis in facie corripit. Illitae nuces idem munus praestant. Menses admotae ciunt. Capitis dolori auxiliatur, illitae fronti aut temporibus cum aceto vel rosaceo. Epiphytidas sanant ex vino. Item putrescentia vlcera, & quae serpunt, & morsus canum cum melle. Earum autem esu dolores finiuntur. Aluum emolliunt. Somnum faciunt. Vrinam cient. Contra sanguinis reiectiones cum amylo assumentur. Renum vitijs, & pulmonum inflammationibus ex aqua in potu aut eclegmate cum resina terebinthina dantur. Calculosis difficilius urinae in passu auxiliatur. Et illinctu cum melle & lacte hepaticis, tussi, & inflationibus coli, nucis auellanae magnitudine. Quinis septenisue praesumptis ebrietatem non sentiunt potiores. Vulpes si cum quauis esca eas vorauerint, emoriuntur. Gummi eius calfacit & adstringit. Reijcientibus sanguinem, potum auxilio est. Impetigines quae summum corpus occuparunt, illitum cum aceto tollit. Tussi vetustae cum diluto vino potum medetur. Calculosis cum passu bibere prodest. E nucibus graecis dulces cibo idoneae, sed multo minus valent in remedijs quam amarae. Attamen extenuant. Vrinam ciunt. Recentium esu cum suo putamine humida stomachi vitia recreantur.

De Pistacijs. CAP. CLXXIX.

p Istacia quae in syria gignuntur, pineis nucibus similia sunt, & stomacho facilia. Trita cum vino contra serpentium ictus profunt, siue edantur siue bibantur.

De Nuce iuglande. CAP. CLXXX.

n Vces iuglandes sunt difficiles concoctu, stomacho inutiles, biliosae, capitis dolorem inferentes, tussientibus inimicae, & vomitus ieiunis in cibo aptae. Cum ruta vero & ficis praesumptae venenis resistunt. Nec minus si a veneni haustu comedantur. Largius esitatae tineas latas pellunt. Illinuntur mammarum inflammationi,

abscessibus, luxatisq; cum mellis exiguo & ruta. Cum cepa autem sale et melle, canis hominisq; morsui proficiunt. Tormina cum calyce suo perustæ, & vmbilico admotæ sedant. Putamen combustum tritumq; in oleo & vino, infantium capite peruncto, nutrit capillum. Alopecias replet. Sistunt menses nuclei vsti, si triti ex vino admoueantur. Idem e veteribus illiti carbunculis, gangrænis, & ægylopijs medentur. Alopecijs commanducati & impositi præsentis sunt remedio. Nucibus tufis oleum exprimitur. Recetes stomacho innocentiores sunt, & suauiores. Itaq; allio mistæ eximunt acrimoniã. Liuiore in corpore illitu tollunt.

De Nucibus auellanis. CAP. CLXXXI.

Vces auellanæ quas & leptocarya vocant, stomacho infestæ sunt. Ipsæ tamẽ tritæ & in aqua mulsa potæ, tussi veteri medentur. Tostæ & cum exiguo piperis potæ distillationem concoquunt. Crematarum cinis cum axungia aut adipe vrsi perunctus alopecijs capillum reddit. Aiunt nonnulli vsta earum putamina, & in cineris speciem redacta cum oleo, cæciorum oculorum pupillas infantibus denigrare, perfuso fincipite.

De Moro. CAP. CLXXXII.

Orus arbor nota est, cuius fructus aluum soluit. Stomacho inutilis est, & facile corruptionem sentit. Hoc idem præstat mori succus. Decoctus autem æreo vase atq; insolatus adstringentior redditur. Facit ad fluxiones, nomas, & tonsillarum inflammationes, addito mellis exiguo. Sed inolefcit vis eius adiecto scissili alumine, galla, croco, & myrrha, item myricæ semine, iri, & thure. Imatura mori poma siccantur, tusaq; acinorum rhois vice obsonijs miscetur, vt celiacos iuuent. Radicis cortex decoctus in aqua & potus aluum resoluit. Latas vëtris tineas excutit. His quoq; auxiliatur qui aconitum hauserunt. Folia ex aceto illita ambustis igni medentur. Tinguntq; capillum, vitium & fici nigræ frondibus simul coctis in aqua cœlesti. Succus foliorum cyathi mensura potus contra phalangiorum morsus auxilio est. Feruifacit corticis & foliorum iure dentes aptissime in dolore colluuntur. Radix circiter messem incisa, facto in ambitu scrobe, succum emittit qui postridie concretus inueniri solet. Is in dolore dentium efficax est. Tubercula discutit. Et aluum purgat.

De Sycomoro. CAP. CLXXXIII.

sycomorū aliqui etiã sycaminū id est morū vocāt, cuius fructus sycomorū etiã propter inefficacẽ gustū appellatur. Arbor est magna, fico similis, frōdosa, multo lacte abūdās, folijs mori. Pomum ter aut quater in anno fert, non ramis vt ficus, sed caudice ipa
d. iiii.

DE MEDICINALI MATERIA

fo, caprifico non dissimile, dulcius grossis, sine granis interioribus. Quod non maturefcit nisi vngue aut ferro scalpatur. Nascitur plurimum in caria, rhodo, locisq; non multi tritici feracibus, vbi prouentu fecundo iuumentum adfert, cum annonæ caritas premit. Pomū aluo vtile est, sed nullam præbet alimoniam. Stomacho aduersatur. Succus tenera arbore antequam fructū ferat eximitur, lapidis istu summo cortice desquamato. Si enim altiore plaga violetur cortex, nihil effluet. Spōgia aut vellere lachryma excipitur, quæ ficcata & in pastillos coacta reponit. Vis succi emollit. Vulnere cōglutinat. Discutit collectiones cōdioni repugnantes. Bibitur etiam aut illinitur contra serpētium morsus, duratos lienes, stomachi dolores, & horrores. Celerrime pomum teredinē sentit. Gignitur & in cypro arbor genere distans, quod vlmus esse videatur, folijs sycomori, fructu pruni crassitudine, multo dulciore, supradictis cætera similis.

De Ficis.

CAP. CLXXXIIII.

Ici maturæ recētes stomachum lædunt. Aluū solunt. Sed facile contracta ab eis fluxio sistitur. Sudorem euocant papulasq;. Sitim sedant. Calorem restingunt. Siccis natura exalfaciendi. Vires alunt. Sed sitim magis stimulat. Aluo vtilis. Rheumatismis vētris et stomachi contrariæ. Gutturi autē, arteriæ, renibus, vesicæ, & ijs quos longa valetudo decolorauit, anhelatoribus, hydropticis, comitialibus aptissimæ. Feruescētæ cum hyssopo & potæ, pectus purgant. Tussi veteri, diurnisq; pulmonum vitijs conueniunt. Aluū molliunt tusæ cum nitro & croco, dein manducatæ. Decoctum arteriæ & tōsillarum inflammationibus gargarizatu prodest. Cum hordeacea farina cataplasmati miscentur. Et in muliebres fetus cum fœno græco & ptisana. Cæterum cum ruta coctæ torminibus infunduntur. Coctæ illitæq; duricias discutunt. Parotidas ac panos emolliunt. Furunculos ad maturationem perducunt, maxime nitro, iri, aut calce addita. Crudæ si cum antedictis tundantur, eadem efficiunt. Cum mali corio, pterygia purgant. Cum atramento sutorio deploratis fere tibiarum fluxionibus, & cacoethicis vlceribus medentur. Quin & cū vino decoctæ addito absynthio & hordeacea farina, vtilissime hydropticis illinuntur. Crematæ cum cæratofanant perniones, prurigines. Sonitusq; si crudæ terantur, & synapi liquido exceptæ auribus instillantur. Tam syluestri, q̄ satiuæ fici lacteus succus coaguli modo lac cōtrahit, concretumq; dissoluit, vt acetum. Exulcerat corpora. Venarū spiracula laxat. Soluit aluum. Vuluam aperit cum detrita nuce græca potus. Mēstrua ciet cum luteo oui appositus, aut tyrrenica cara. Podagricorū cataplasmatibus cū farina fœnogræci & aceto vtilis. Lepras,

lichenas, vitilignes, vitia cutis in facie, pforas, vlcera in capite manantia, cum polenta expurgat. Instillatum plagæ percussis a scorpione, venenatorum ictibus, & rabiosi canis moribus auxiliatur. Prodest dentium dolori lana exceptus, & in cauis eorum additus. Verrucarum informicationes tollit cum adipe, circumlita in ambitu carne. Hoc idem præstat succus e teneris ramis sylvestris fici, qui lacte prægnates, filente adhuc oculo tusi exprimuntur, & ficcatus in vmbra reponitur. Et lac & succus imponuntur exulceratorijs medicamentis. Decocti cum bubulis carnibus ramuli ficulni, facilem afferunt decoctionem. Lac efficiunt quod magis soluat, si inter coquendum ficulneo furculo spathe loco moueatur.

De Grossis. CAP. CLXXXV.

Rossi quæ erinei nonnullis vocantur, coctæ illitæ & strumas
 g nodosque omnes emolliunt. Crudæ formicantes verrucas & thymos nitro farinaque additis tollunt. Folia eadem possunt. Illita cum sale & aceto vlcera in capite manantia, epinyctidas, & furfures sanant. Ijs ficosæ extuberationes, & genarum scabriciæ perfricantur. Nigræ ficus folijs cauliculisque candidæ vitilignes perunguntur. Faciunt ad canum morsus & vlcera quæ ceria id est fauos vocant. Grossi cum sylvestris papaueris folijs ossa extrahunt. Furunculos cum cera discutiunt. Contra muris aranei morsus, & scolopendræ venena, cum eruo & vino illitæ auxiliantur. Fit ex cinere ficus tam sylvestris quam satiæ lixiuium, crematis ramorum cauliculis, quod subinde macerari opus est & inueterascere. Si quidem inter caustica intelligitur. Gangrænis prodest, namque expurgat & consumit quæ excrescunt. quo vtendum ita est. Spōgia assidue hoc lixiuio imbuta superponitur. Interdum dysentericis, & in fluxiones vetustas, & sinus cuniculatim exedentes, magnosque, instillari conueniet. Etenim purgat, conglutinat, carne replet, & oras committit, non secus atque emplastra quæ cruentis vulneribus iniiciuntur, enihæma vocant. Bibitur ad discutiendum sanguinem concretum, & contra præcipitationes, rupta, conuulsa, cum cyatho aquæ recenter colatum, addito olei exiguo. Cæliacis, dysentericis per se cyathus datus prodest. Nervorum vitijs, conuulsionibus commode illinitur ex oleo, vt pote quod sudores moueat. Aduersus gypsopotum & phalangiorum morsus bibitur. Hæc eadem præstant reliqua lixiuia, præsertim quærnium. Omnia tamen adstringunt.

De Persea. CAP. CLXXXVI.

Persea arbor est, in ægypto fructum ferens cibo idoneum, stomacho utilem, in quo phalangia cranocolapta nomine iniun-
 p niuntur, præsertim in thebaide. Arida folia illitu sanguinis

DE MEDICINALI MATERIA

eruptiones sistunt. Arborem hanc prodiderunt aliqui in perfide exitiosam esse, translataque in ægyptum, mutata natura in cibos receptam.

De Iberide. CAP. CLXXXVII.

i Beris siue cardamantica folia habet nasturcij, vere virentia, caulem cubitalē, aut minorē. In incultis nascitur. Aestate lacteum florē prōmit, quo tempore efficacior est. Radices duas nasturcio similes habet, calfacientes, et adurentes. Ipsæ eni ischia dicis cum salsa axungia emplastro vtilis, quaternis horis alligatæ, vt dein in balneas descendatur, & postea oleo cum lana locus perungatur.

De Halicacabo. CAP. CLXXXVIII.

h Alicacabum aliqui diræon, alij strychnon, alij quod infamiam faceret manicon, alij dorichnyon quod cuspides eo tingerentur appellauere. Rhomani Apollinarē minorem, aut vlticanā hærbam, alij opfaginem, Daci cocalidam, Aphri cancabon. Frutex est multos habens ramos fractu peruicaces, surculosos, folia plurima, pingua, cotoneæ malo similia, florem rubrum, acinum in foliulis paruis croceum, ciceris magnitudine, semina quina senave erui modo rotunda. Nascitur in petris non procul a mari. Huius succus cum vino potus drachmæ pondere somnum conciliat, vt papaueris opium. Semen vrinam cit. Dantur hydropicis duodecim corymbi. Plures autē poti mētis alienationem

creant. Remedio est aqua mulsa copiosa potui data. Succus & cortex miscentur pastillis, qui doloris sensum auferūt. Decoctū in vino si in ore contineatur, dētium dolorē mitigat. Radicis succū melle illitus oculorū hebetudines discutit.

F I N I S

30

LIBER SECVNDVS
 PEDACII DIOSCORIDIS ANAZARBEI
 DE MEDICINALI MATERIA LI
 BER SECVNDVS, IOANNE
 RVELLIO SVESSI
 ONENSI IN
 TERPRE
 TE.

I N primo charissime Ari libro, quem de medici-
 nali materia condidimus, de aromatibus, oleis,
 vnguentis, arboribus, & nascentibus in eis suc-
 cis, lachrymis, seminibusq; differuimus. In hoc au-
 tem secundo de animantibus, melle, lacte, adipe,
 frumentis, atq; oleribus explicabimus, subnexis
 hærbaceis quæ acri prædita sūt facultate. Vt pote
 quæ cum ipsis cognatione iuncta sint. Qualia allium, cepa, synapi, in-
 telliguntur. Idq; ideo, ne cognatorum vires disiunxisse videamur.

De Aquatili echino. CAP. I.

Arinus echinus stomacho ventriq; utilis est. Vrinam cit.
 m Huius testa recens inassata, commode medicamentis ammi-
 scetur, quæ pforas abstergunt. Crematæ vero cinis sordida
 vlcera expurgat. Luxuriantem carnem reprimit.

De Terrestri herinaceo. CAP. II.

t Errestris herinacei coriū combustum alopecijs cum pice li-
 quida aptissime illinitur. Assicatum corpus, & cū aceto mul-
 so potū, renum vitij auxilio est. Item aquæ quæ cutē subijt,
 conuulsionib⁹, elephantia, & male habitis, quos cachectos vocāt. Vi-
 scerum fluctiones exsiccat. Eiusdem iecur testa insolata arefactum, ad
 eosdem vsus vtilissime reconditur.

De Hippocampo. CAP. III.

h Ippocampus marinum animal est exiguum, cuius cremati
 cinis cum liquida pice aut axungia seu amaracino vnguen-
 to illitus, alopecias replet.

De Purpura. CAP. IIII.

p Vrpura vsta exsiccat. Dentes abstergit. Excrecentias in car-
 ne cohibet. Vlcers purgat. Et ad cicatricem perducit.

De Buccinis. CAP. V.

e Adem præstant concremata buccina, sed vehemētius vrūt.
 Si quis salis plena, fistili crudo adurat, dentifricio cōueniūt.
 Ambustis vtiliter illinuntur, quibus solui medicamentum

DE MEDICINALI MATERIA

non oportet. Nam postea q̄ vulnus cicatricem duxerit, ipsum in testæ modum induratum, sp̄te sua decidet. Fit etiam calx e buccinis, vt in eius mentione demonstrabimus.

De Ionijs. CAP. VI.

i Onia vocantur purpurarum buccinorūq; media, qua parte testæ volumē clauiculatim intorquetur. Cremata simili modo, maiorem purpuris buccinisq; facultatem vrendi consequuntur, vt pote cum ea parte, eorum natura prematur. Buccinorum carnes origratæ sunt, & stomacho vtilis. Sed aluum non molliunt.

De Myacibus. CAP. VII.

m yaces laudatissimi in ponto. Cremati eundem buccinis effectum præbēt. Priuatim plūbi more eloti, oculorum medicamentis cum melle vtilis habentur. Genarum crassitudines absumunt. Albugines purgāt, & cætera quæ oculis caliginem offundunt. Carnes eorum ad canis morsus vtilissime imponuntur.

De Tellinis. CAP. VIII.

r Ecetes tellinæ aluo vtilis, sed maxime ius earum. Salitæ vruntur, tritæq; in cinerem & cū cedria instillatæ, auulsos pilos renasci non patiuntur.

De Chamis. CAP. IX.

c Hamarum conchularumq; in exigua aqua decoctarum ius, aluum ciet. Id cum vino assumitur.

De Onyche. CAP. X.

o Nyx conchylij tegumētum est, ei simile quo purpura integitur. Quod in Indiæ nardiferis lacubus inuenitur, suauem ideo spirans odorem, q̄ conchyliis inibi nardi pabulo vescantur. Colligitur posteaq; stagnantes aquæ æstiuis squalloribus inaruerunt. Laudatissimus qui a rubro mari deferitur candicans, pinguis. Babylonius nigrescit, atq; minor conspicitur. Ambo odoris gratia suffiuntur. Sed aliquatenus castoreum olent. Idem suffitu excitant fœminas vuluæ stragulatū oppressas, comitialesq;. Poti ventrem molliunt. Crematum conchylium eadem efficit quæ purpura & buccinum.

De Cochleis. CAP. XI.

t Errestres cochleæ stomacho vtilis sunt & non facile corrumpuntur. Optimæ sardonica, aphrica, astypaleica, & quæ in sicilia, chio, & liguriæ alpibus gignuntur, pomatiæ id est operculares cognominatæ. Marina stomacho idonea, & facile aluo excernitur. Fluuiatilis virus olet. Quæ vero vepribus frutetisq; glutinata cohæret, quā vocāt nōnulli cehilon, ventrem & stomachum turbat. Vomitiones excitat. Crematæ omnium testæ excalfaciendi et vrendi

LIBER SECVNDVS

31

naturam fortiuntur. Purgant lepras, vitilignes, dentesq̃. Emendant oculorum cicatrices, & vitia cutis in facie, albugines, ac visus hebetudines, si vsta tritaq̃ ex melle illinantur. Crudæ cum tegumentis impositæ, aquæ inter cutem tumores exugunt. Sed non ante soluantur, quam omnis hauriatur humor. Podagricas inflammationes leniunt. Impactos corpori aculeos illitæ euocant. Menfes tritæ & admotæ ciuat. Carnes earum cum thure & myrrha illitæ, cum vulnera alia, tū maxime quæ nerui acceperunt, conglutinant. Tritæ in aceto sanguinem naribus erumpentē infranant. Viuæ corpus & præsertim aphricanæ cum aceto deuoratum, stomachi dolores mitigat. Trita cum testa, vino & myrrha, si exiguū inde bibatur, coli vesicæq̃ cruciatus sanat. Terrestris pilos incommodos replicat, si quis abrafo acu lēto, pilum attingat.

De Cancris.

CAP. XII.

Ancrorum fluuiatiliū exustorū cinis qui duo cochlearia c expleat, adiecto consimili radicis gētianæ modo, triduo potus cum vino magnopere prodest canis rabiosi morfibus. Rimas pedum sedisq̃, perniunculos, & carcinomata, cū decocto melle lenit. Triti crudi, potiūq̃ ex asinino lacte, auxiliantur contra serpentium phalangiorumq̃ morsus, atq̃ scorpionum ictus. Decocti autem & cum iure esitati, ijs profunt qui tabe conficiuntur, aut leporem marinum hauserunt. Necant scorpiones triti & cum ocimo admoti. Posunt eadem marini, verum inefficacius omnia præstant.

De Terrestris scorpione. CAP. XIII.

Terrestris scorpio tritus & impositus, suæ plagæ remedium t est. Quin inuenitur assatus ad eadem prodesse.

De Marino scorpione. CAP. XIII.

Arini scorpionis fel conuenit ad suffusiones oculorum, albugines, & hebetudines. m

De Dracone marino. CAP. XV.

Raco marinus replicatus atq̃ impositus, ictus spinæ suæ d qua ferit, medela est.

De Scolopendra. CAP. XVI.

Colopēdra in oleo decocta si illinatur auellit capillos. Sed f contactu pruritus facit.

De Torpedine pisce. CAP. XVII.

Arina torpedo diuturnis capitis doloribus admota, cruciatus vehementiam mulcet. Eadem apposita cōuersam sedem m prociduiamq̃ coercet.

DE MEDICINALI MATERIA

De Viperinis carnibus. CAP. XVIII.

Iperinæ carnes si coctæ edantur, claritatem oculis afferunt.
v Neruorū vitijs auxiliantur. Increfcentes strumas reprimūt.
detrahta autem cute, caput caudaq̃, quoniam carne vacante,
amputari debent. Quippe commenticiū est quod præcipitur, certam
vtrinq̃ mensuram præcidi oportere. Reliquum vero corpus elotum
dissectumq̃ discoquitur cum oleo, vino, salis exiguo, & anetho. Aiunt
ijs qui vyperas esitent pediculos procreari, quod plane a veritate ab-
horret. Adijciunt aliqui longam senectutem agere, qui eo cibo vescun-
tur. Sal ex eis ad eadem conficitur, sed inefficacior est. Viua autem vi-
pera in fictile nouum demittitur. Adijciuntur salis caricarumq̃ trita-
rum, singulatim quicq̃ sextarij, mellis cyathi sex. Mox fictilis opercu-
lum luto oblinitur, & fornacibus inassatur, donec sal in carbones re-
digatur, qui postea tritus in pulueris faciem, recōditur. Plerumq̃ quo
stomacho gravior fiat, immiscetur nardi spica, aut folium, aut malaba-
thri momentum.

De Senecta anguium. CAP. XIX.

Enectus anguium in vino decocta dolori aurium infusu, &
f dentium, collutione auxilio est. Addunt eam in medicamen-
ta oculorum sed præcipue viperinam.

De Lepore marino. CAP. XX.

Epus marinus lolligini parue similis est, qui per se tritus
l aut cum vrtica illitus, capillos euellit.

De Lepore terrestri. CAP. XXI.

Errestris leporis inassatum cerebrum manditur, iuuandis tre-
t moribus qui valetudine contracti sunt. Affrictu aut cibo faci-
lem infantibus dentitionem præstat. Exustum caput & cum
adipe vrsino aut aceto illitum, alopeciarum inanitatibus medetur. Le-
porinum coagulum post triduum a concubitu potum, conceptum adis-
mere, partusq̃ spem intercipere proditur. Vuluæ & alui fluorem sistit.
Comitiales iuuat. Cōtra venena ex aceto bibitur, præsertim aduersus
concretum lac, & viperarum morsus. Sanguis eius si calidus illinatur
vitia cutis in facie, vitiliginem, lentiginemq̃ sanat.

De Pastinaca. CAP. XXII.

Arinæ pastinacæ radius, qui eius cauda enatus aduersis squā-
m mis reflectitur, detiū dolorē mitigat. Nā eos frāgit & euocat.

De Sepia. CAP. XXIII.

Epia coctæ comesum atramentum ægre conquoquitur. Al-
f uum mollit. Collyrijs e testa factis cōuenienter genarum sca-
briciæ perfricantur. Vsum in sua testa donec id quod crusto

sum est abscedat, postea tritū, expurgat vitilignes, fursures, dentes, & vitia cutis in facie. Elotum in medicamenta oculorum addi solet. Cōtra albugines, oculis iumentorum efficaciter inspuitur. Pterygia oculorum absumit, cum sale tritum & iniectum.

De Mulo pisce.

CAP. XXIII.

Vlorum assiduo cibo, aciem oculorum hebetari constat. Is marini draconis, aranei, ac scorpionis morfibz medetur, si crudus atq; dissectus admoueat.

De Testibus hippopotami

CAP. XXV.

Ippopotami testes exiccati ac triti contra serpentiū morsus bibunt.

De Fibrinis testibus.

CAP. XXVI.

Iberancipitis vitæ animal, plerumq; cū piscibus & cancris ex aqua vitum capescit. Huius testes serpētium venenis aduersantur. Sternutamenta mouent. Et in vniuersum varios obtinent vsus. Siquidem menses ac partus ciunt, duabus drachmis cum pulegio poti. Secundas quoq; eijciunt. Contra inflationes, tormina, singultus, venena, ixiāq; ex aceto bibuntur. Lethargicos, & vtcūq; veterno obdormiscentes excitant infusi. Cum aceto autem & rosaceo, olfactu & odoris suffitu, idem faciunt. Poti & illiti profunt tremulis, conuulsionibus, & omnibus neruorum vitijs. In summa calfa toriā vim habent. Eligi debēt testes qui ex vno ortu connexi sunt. Fieri enī non potest vt gemini folliculi in vna membrana coniuncti reperiantur. Liquore intus veluti mellis cerosi odoris grauis, gustu acri, mordente, ac friabili, naturalibus tunicis circumdato. Quem fraude aliqui corrumpunt conijciantes in follem gummi, aut ammoniacum cum sanguine & castorio subactum, & ita exiccantes. Vanum est quod traditur, testes ab ipsis euelli, & a sese abijci, quum venatu vrgentur. Siquidem tangi nequeunt, ita vt in sue sustrecti. Operæ autem precium est, diuisa pelle melleum liquorem cum euestiente tunica assumere, & ficcatum potui dare.

De Vulgari mustella.

CAP. XXVII.

Vstella quæ in domibus nostris oberrat, ambusta exenteratur, & inueterata sale in vmbra ficcatur. Ea binis drachmis cū vino pota aduersus omnia serpentium venena præsentaneo est remedio, Toxico, simili sumpta modo resistit. Eius ventriculus coriandro fardus inueteratusq; percussis a serpente, & comitialibus potu auxiliatur. Cremata in fistili podagricis confert, cinere ex aceto ilito. Sanguine perunctæ strumæ iuantur. Comitilibus etiam prodest.

DE MEDICINALI MATERIA

De Ranis.

CAP.

XXVIII.

Ontra omnium serpentium venena pro antidoto sunt ranæ,
c si ex sale et oleo decoctæ edantur, iusq; earum itidem sorbeatur. Cōtra inueteratos tendonum rigores pollent. Illitus earum cinis, profluentis sanguinis impetus sistit. Explendis alopeciarū inanitatibus ex liquida pice illinitur. Viridium ranarū cruor auulsos genis pilos renasci prohibet, in vestigia euulsorum instillatus. Decoctæ in aceto & aqua, dentium dolores collutione leniunt.

De Fele.

CAP.

XXIX.

Ecens felis in cibo nutrit, & facilem præbet aluum. Sale vero conditus, non suppeditat alimētum. Arteriam expurgat. Et vocem expedit. Illita saliti caro, aculeos extrahit. Muria eius incipientibus dysenterijs prodest, si in defidentium fots adijciatur. Fluctiones siquidem ad summa cutis elicit. Ischiadicis infusa medetur.

De Cerro pisce.

CAP.

XXX.

Erri saliti caput exustum, excrecentes vlcera oras puluili
c losq; reprimit. Nomas cohibet. Thymos clauosq; absumit. Caro non secus atq; salsamentum prodest a scorpione percussis, aut a cane demorsis.

De Menis.

CAP.

XXXI.

Enarum ex capitibus cinis si illinatur, callosas sedis rimas
m abolet. Eius etiam garrum corporis putredines collutione sedat.

De Gobio.

CAP.

XXXII.

Obius recens in suillum vētrem coniectus, si confuta rima in
g duodecim aquæ sextarijs, donec duo super sint decoquatur, & sub diuo refrigeratus potui detur, alius sine molestia deijciatur. Illitus contra serpentium canumq; morsus auxilio est.

De Thunno.

CAP.

XXXIII.

Onditanei thunni caro, quam omotharicon vocant sumpta
c ijs auxiliantur, quos vipera nomine prester in omorderit. Sed oportet vinum q̄ plurimum subinde cogantur haurire, ita vt vomitione reddatur. Cōtra acrimonias esciatorum maxime valet. Canum moribus vtilissime illinitur.

De Garro.

CAP.

XXXIII.

Arrum omne, quod ex piscibus carnibusq; sale maceratis liquamen est, illitū depascentia vlcera sistit. Morsis a cane medetur. Dysentericis atq; ischiadicis infunditur. Nonnullis vt exulcerata adurat. Alijs autem ad lacestanda, quæ vlcera non senserunt.

De Iure piscium.

CAP. XXXV.

r Ecentium piscium ius, modo per se, modo ex vino potum, aluum subducit. Priuatim ad hunc usum conficitur e gobijs, & scorpionibus, & iulide, e percis, & recentibus alijs saxatilibus, nec virus recipientibus, simpliciter cum aqua oleo & anetho.

De Cimicibus lectularijs.

CAP. XXXVI.

c Imices qui in cubilibus enascuntur, cauis fabarum inclusi, si ante febrium significationes septeni deuorentur, quartanis auxilio sunt. Et citra fabas illiti, percussis ab aspidē profunt. Vuluarum exanimationes olfactu reuocant. Poti cum vino aut aceto adherentes sanguifugas abigunt. Triti, & vrinariæ fistulæ impositi, stranguriam leuant.

De Millepeda.

CAP. XXXVII.

m Illepedæ, quæ sub aquario vase stabulantur, animalia sunt multis pedibus nitentia, quæ cōtacta manu contrahuntur in orbem. Hæ ex vino potæ difficili vrinæ, & regio morbo auxiliantur. Millepedas illini anginis vtilissimum. Tritæ, & in cortice mali punici calfactæ, doloribus aurium addito rosaceo conuenienter instillantur.

De Blatta pistrinaria CAP. XXXVIII.

b Lattæ eius quæ in pistrinis inuenitur, interanea trita aut cum oleo decocta, aurium dolores instillatu mitigant.

De Pulmone marino CAP. XXXIX.

p Odagras pernionesq; emendat pulmo marinus recens, tritus & illitus.

De Suillo pulmone CAP. XL.

f Villus & agninus vrinusq; pulmo impositu, intertrigines ab aquis contractas, ab inflammatione tuetur.

De Vulpino pulmone CAP. XLI.

p Vlmo vulpis si arefactus bibat, suspiriosos adiuuat. Adeps quoq; liquefactus, infususq; auris dolorem finit.

De Asnino iocinere CAP. XLII.

a Sini iecur inassatum, esu comitialibus prodest. Verumtamen ieiunis edendum præcipitur.

De Genitali cerui maris CAP. XLIII.

g Enitale masculi cerui tritum & in vino potum, a vipera demorsis auxiliatur.

DE MEDICINALI MATERIA

De Vngula Asini. CAP. XLIIII.

v Ngularum asini cinis, per dies multos binis coclearibus potus, proditur comitiales adiuuare. Eadem oleo subacta strumas discutunt. Et illitæ pernionibus medentur.

De Lichenibus equorum. CAP. XLV.

l Ichenes sunt in equorum genibus, & super vngulas indurati calli, qui triti & in aceto poti comitialibus mederi traduntur.

De Vngula capræ. CAP. XLVI.

v Ngularum caprinarum cinere peruncta ex aceto alopecie sanantur.

De Caprino iocinere. CAP. XLVII.

c Apræ inassati iocineris decidua sanie, inungi lusciosos prodest. Et dū coquitur apertos oculos vaporari. Carnes assas vesci perq̃ vtile. Tradunt hircini iocineris cibo comitiales depræhendi.

De Apri iocinere. CAP. XLVIII.

i Ecur apri recens si arefactum teratur, ex vino potum cōtra serpentium volucrumq̃ morsus auxilio est.

De Cane rabioso. CAP. XLIX.

i Ecur canis qui rabie exagitatur, ab emorsis sumptum, ne tententur metu aquæ tueri creditur. Vtuntur autem ad arcendos aquæ pauores dente eo, qui caninus dicitur. Hūc a cane qui mormordit exemptum, & folliculo inditum, pro amuleto brachio adnectunt.

De Soleis veteramentarijs. CAP. L.

v Eteris soleæ crematæ illitus cinis ambusta igni, intertrigines, necnon calciamentorum attritus sanat.

De Mergi iocinere. CAP. LI.

f Iccatum mergi iecur & ex hydromelite binis coclearibus potum, secundas expellit.

De Gallina. CAP. LII.

d Isectæ gallinæ & adhuc calentes appositæ, serpentium moribus auxiliantur. Sed identidem alias sufficere oportet.

De Gallinaceo cerebello. CAP. LIII.

g Allinarum cerebellum in vino bibendum datur contra serpentium morsus. Sanguine a cerebri mēbrana profluentē fistit.

LIBER SECVNDVS

34

Subdita autem ventriculo galli membrana cornu non absimilis, cuius pellis in decoctionibus detrahi solet, siccatur. Trita in vino conuenientissime stomachicis datur in potu. Ius e vetere gallinaceo aluum soluit. Abiectis itaque interaneis salem conijci oportet, & confuto ventre decoqui in viginti sextarijs aquæ, donec ad treis heminas redigatur. Totum id refrigeratum sub diuo, datur. Aliqui incoquunt olus marinum, mercurialem, cnicum, aut filiculam. Crudos humores crassosque, atram bilem & strigmenta elicit. Prodest longis febribus, suspirijs, articularijs morbis, & inflationibus stomachi. Eorum venter sale conditus & in umbra siccatus, contra eximias vacuationes medicamentorum trium drachmarum pondere, præsentis est auxilio. Quandoquidē protinus deiectiones cohibet. Teri autem debet in farinam, & aqua subactus dari.

De Ouorum natura. CAP. LIIII.

Vum molliculum plus alit forbili, & durum plus molli. Lutum oui contra oculorum dolores vtile est. Inassatum sedis inflammationibus prodest, cum croco & rosaceo. Et condylomatibus cum meliloto. Cum vua autem fruticis eius quæ rhoa dicunt, & galla in patinis frigitur, vt cibo aluos fistat. Per se etiā offerri solet.

De Candido oui. CAP. LV.

Andidum oui crudum refrigerat. Spiramenta cutis obstruit. inflammationes oculorum infusum lenit. Ambusta si statim cooperungantur, pustulas non sentiunt. Faciē a solis adustione tuetur. Fronti impositum cum thure fluctiones arcet, auertitque. Inflammationes oculorum lana exceptum, addito rosaceo melle & vino mitigat. Vtiliter contra hæmorrhoidum morsus crudum sorbetur. Summe tepidum prodest vesicæ rosionibus, renū exulcerationibus, faucium scabritiæ, reiectionibus sanguinis, destillationibus, & thoracis rheumatismis.

De Cicadis. CAP. LVI.

Icadæ quæ inassatæ manduntur, vesicæ doloribus profunt.

De Locustis. CAP. LVII.

Ocistæ odoris suffitu vrinæ difficultates adiuuant, præsertim quæ scæminas male habent. Earum carnes nullo sunt vsui. Est & quoddam genus locustæ quæ assiracos aut onos dicitur, sine pennis, prælongis membris. Exiccata autē si ex vino bibatur, contra scorpionis morsus magnopere proderit. Hac abūde vescuntur Aphri, qui leptim incolunt.

De Ossifrago. CAP. LVIII.

Enter eius auis quam latini ossifragum appellant, particulatim potus, calculos cum lotio pellere proditur.

c. ij.

DE MEDICINALI MATERIA

De Galerita. CAP. LIX.

g Alerita auicula est parua, apicem in vertice pauonis modo gestans, quæ assa & in cibo sumpta cœliacos adiuuat.

De Hirundinibus. CAP. LX.

d Iste & crescente luna pullis hirundinis, qui primo partu exclusi sunt, in ventre eorum lapillos offendes. E quibus duos, vnum vericolem, alterum purū eximes. Ij priusq̃ terrā attigerint, in iuuenæ corio, aut ceruina pelle, lacerto aut collo adalligati, comitialibus proderunt. Et sæpe prorsus eos recreabunt. Hirundines vti ficedulæ in cibo, aciei visus medicamentū præbent. Tam pullorū q̃ matrū cinis cū melle oblitus, oculis claritatē adfert. Anginæ eo cōmode perunguntur. Vuæ & tonsillarū inflammationibus hoc cinere succurritur. Et ipsæ & pulli exiccati, si drachmæ pōdere ex aqua bibantur, hos iuuant qui anginæ morbo conflantur.

De Ebore. CAP. LXI.

e Boris scobe illito paronychia sanantur. Vim adstringendi ebur obtinet.

De Suillo talo. CAP. LXII.

f Vis talus comburitur, dū e nigro albescat, qui tritus & postus inflationibus colici, longiq̃ torminibus medetur.

De Ceruino cornu. CAP. LXIII.

c Eruini cornus cinis elotus, binis cochlearibus epotus prodest dysentericis, excreantibus sanguinē, cœliacis, regio morbo, & vesicæ doloribus cū tragacantha. Fœminis fluctione vuluæ laborantibus, cū liquore huic rei accommodato. Cerui cornu cōtusum, crudo fistili luto circūlito & in furnum indito vritur donec albescat. Id cadmiæ modo elotū, vlceribus oculorum & defluationibus salutare est. Infriktum dētes expurgat. Crudi cornus suffiti nidore serpentes fugantur. Feruefactum in aceto si eo gingiuæ colluantur, maxillarum a dentitione dolorē adimit.

De Eruca. CAP. LXIIII.

e Rucis quæ in oleribus gignuntur cum oleo peruncti, a venenatis bestiis feriri negantur.

De Cantharidibus. CAP. LXV.

e Frumētis cōgestæ cantharides ad recondendū idoneæ sunt, quæ fistili vase nō picato cōduntur, & raro linteo obligato ore, & deorsum cōuerso suspēdūtur super acetiferuētis quæcerimi halitū, donec æstu examinētur. Postea lino trāssixæ reponunt. Potentissimæ omnes variæ, luthis lineis, quas in pēnis trāsuersas habet, promissosq̃ corpore, crassæ, ac blattarū modo præpignes. Sed inertes.

ac imbecillæ quæ, vnius sunt coloris.

De Bupreste.

CAP.

LXVI.

Imili modo reconduntur buprestes, genera quædam cantari-
 dum, & pinnorum erucæ, quæ supra cribrum suspensum fer-
 uenti cinere paulisper intostæ, reponuntur. Vis omnium cō-
 munis erodere, vlcerare, calorem elicere. Qua de causa ammiscētur me-
 dicamentis quæ lepras, ferofq; lichenas, & carcinomata sanant. Men-
 ses ciunt pestis emollientibus additæ. Aliqui cantaridas antidotis
 impostas, aquæ subter cutem auxiliari prodiderunt. Argumento q
 vrinam moueant. Alij pennas pedesq; contra potarum veneficia, reme-
 dio esse tradiderunt.

De Salamandra.

CAP.

LXVII.

Alamādra lacertæ genus est, iners, varium, quod frustra cre-
 ditum est, ignibus non vri. Vim habet erodentē, calfactoriā,
 exulceratē. Additur vt cantaris in medicamenta, quorum
 vis est exesse, & lepras abolere. Similiq; modo reconditur. Liquefacta
 in oleo pillos euellit. Exenterata detractis pedibus & capite in melle
 seruatur ad eundem vsum.

De Araneo.

CAP.

LXVIII.

Raneus quem olcum, alij lycium vocant, subactus cum sple-
 a nio, & linteo illitus, prolatusq; vtrifq; temporibus aut fron-
 ti, tertianos circuitus persanat. Tela eius imposita sanguinē
 fistit. Vulnere quæ summam cutē occuparunt, ab inflammationis iniu-
 ria vindicat. Est & alterum aranei genus qui cādidā, tenuē, densamq;
 telam orditur, quē in loculo ligatū, & lacerto appensum, quartanis cir-
 cuitibus mederi narrāt. Decoctus ex rosaceo & infusus, aurium dolo-
 ribus auxiliatur.

De Lacerta.

CAP.

LXIX.

Acertæ caput intritū & appositū, aculeos & omnia corpori
 l infixa extrahit. Varos, formicantes verrucas, & penfiles quas
 acrochordonas vocant tollit. Iecur exesis dentibus coniectū
 dolores finit. Si diuulsa admoueatur, ictis a scorpione leuamentum
 præstat.

De Sepe.

CAP.

LXX.

Eps quam aliqui lacertam calchidicam vocarūt, in vino pos-
 f ta morsus suos sanat.

De Scinco.

CAP.

LXXI.

Cincus aut ægypti, aut indiæ, aut rubri maris alumnus. quis
 f inueniatur in lydia mauritanix. Est autem terrestris croco-
 dilus sui generis, qui salsus affertur in nasturcio. Aiūt carnes
 quæ renes amplectantur, id sibi viriū vēdicasse, vt si drachmæ pōdere
 bibantur, venerē accēdant. Verū decocto lentis cū melle aut semine la-
 c .iij.

DE MEDICINALI MATERIA

Etucæ cū aqua potō, veneris cupiditates inhihentur. Additur in anti-
dota.

De Terrēnis vermibus. CAP. LXXII.

Errēni vermes, impositi præcisos neruos glutinant. Tertia-
t nas discutiunt decocti cum anserino adipe. Infusi, affectis au-
ribus medentur. Cum oleo autem decocti si in contrariam
aurem instillētur, dentium doloribus præstant auxilium. Poti ex pas-
so vrinam ciunt.

De Mure araneo. CAP. LXXIII.

m Vs araneus dissectus & impositus, sui morsus veneficia luit.

De Muribus. CAP. LXXIIII.

m Vres qui in domibus oberrant, concisos scorpionum plagis
vtilissime imponi, in cōfesso est. Si in affatos infantes ederint,
oris saluam exicari promittunt.

De Vsu lactis. CAP. LXXV.

l Ac generatim omne boni succi est. Corpus alit. Aluū emol-
lit. Stomachum & intestina, inflatione vexat. Vernū tamen
dilutius æstiuo habetur. E viridi pabulo aluum magis læui-
gat. Probatum autem candidum, æquali crassitudine, quod vngui in-
stillatum cogitur. Aluum minus tentat caprinum. Quoniam adstrin-
gentibus pabulis, robore, lentisco, & oleaginis frondibus, magna ex
parte vescūtur. Inde stomacho accommodatissimum reddi solet. Ouil-
lum autem dulce, asperū, & præpingue, non vsq; adeo vtile stomacho.
Bubulum tamen, asininum, & equinum, ventri magis idonea. Sed ip-
sum turbant. Quibus in locis pecora, scamoniā, veratrū, lematidem,
aut mercurialem pascuntur, lac omne ventrem & stomachum subuer-
tit. Quale in iustinis montibus esse, a nobis proditum est. Siquidem
capræ quibus candidum veratrū pabulo fuerit, primo foliorum partu,
euomunt, & eorum lac haustum nauseam creat, & stomachum in vom-
itiones effundit. Adstringentius omne decoctum, præcipueq; candē-
tibus calculis marinis exuctum. In summa, omnibus auxiliatur inter-
nis exulcerationibus, præsertim faucium, pulmonis, interaneorum,
vesicæ & renum. Foris vero contra pruritum cutis, eruptiones papu-
larum, & vitiatos corporis succos. Recens cum melle crudo, addito
sale, datur exigua aqua dilutum. Minus inflat quodcunq; feruescat.
Decoctum cum calculis marinis ad dimidias, vlcerosas vëtris fluctio-
nes adiuuat.

De Sero lactis. CAP. LXXVI.

l Ac quodcunq; serum continet implicitum. Quod vbi disces-
sit a lacte, multo potentissimum ad purgationes redditur.
Datur quibus sine acrimonia volumus deiectionem moli-

ri, vt melancholicis, comitialibus, lepris, elephantijs, & erumpētibus toto corpore papulis.

De Schisto ceu scissili lacte. CAP. LXXVII.

X omni lacte fit quod schistum appellant. Lac autem fissili
e nouo feruet, ramoq; ficulneo recēti mouetur, insparis postq;
bis aut ter efferbuerit, totidem aceti muli cyathis, quot sunt
heminae lactis. Ita enim serefcens liquidū ab eo diuiditur, quod in ca-
seum concreuit. Sed cum feruet, ne superfundatur, cōueniet spongia ex
frigida cōtinuo fissilis labrum detergere, seltariumq; argenteū frigidae
aquae plenum demittere. Bibitur heminis per interualla singulis vsq;
ad quinas, ita vt intercedentibus spatijs, potantes ambulent. Lac autē
recens efficax est contra rosiones vstionesq; ab exitialibus medicamē-
tis factas, vti a cantharidibus, aut salamandra, bupreste, aut pinorum
eruca, hyoscyamo, dorycnio, aconito, aut ephemero. Præsertim bu-
bulum ad id eximie confert. Gargarizatur autē exulceratis faucibus,
tonillisq;. Asininum peculiariter collutos dentes gingiuasq; stabilis.
Fluctiones alui si vlcera sentiantur tenesmosq;, ouillum, bubulum aut
caprinum cum marinis lapillis decoctum, sistit. Per se autē & cum hor-
deacea ptisana aut halicaceo cremore infusum, magnopere intestino-
rum rosiones mitigat. Exulceratae vuluæ immittitur.

De Muliebri lacte. CAP. LXXVIII.

V manum lac dulcissimum est. Et maxime alit. Mammis au-
h tem exuctum, prodest tibi & stomachi rosionibus. Contra
haustum leporē marinum præsidio est. Oculis cruore ex ictu
suffusis, cum thuris polline instillatur. Podagricis vtile est cum meco-
nio & cærato illitum. Lac omne respuēdum splenicis, hepaticis, comi-
tialibus, vertiginosis, & neruorum vitio laborantibus, febriculosis,
& capite dolentibus, nisi si quis interdum purgationis gratia vt osten-
dimus, schistum præbeat. Primiperae canis lacte perunctos narrant
glabrescere. Potum contra venena antidoti vicem obtinet. Abortus
mortuos expellit.

De Caseo. CAP. LXXIX.

Aseus recens sine sale sumptus alit. Stomacho utilis est & fa-
cile in mēbra delegatur. Corpus auget. Aluū modice emol-
lit. Alius tamen alio præstantior, pro natura lactis a quo con-
ficitur. Decoctus autem & expressus, deinde inassatus, aluum sistit.
Illitus, oculorum inflammationibus & fugillatis prodest. Qui vero
recens salitus est, minus alimenti præbet. Corpus apte minuit. Sto-
macho aduersatur. Negocium ventri interaneisq; exhibet. Verustio-
e .iiij.

DE MEDICINALI MATERIA

refistitur aluus. Sero quod a caseo manauit, q̄o p̄time canes alūtur.

De Hippace.

CAP. LXXX.

Vod hippacen vocant, caseus est equinus. Ea virus redolet. Magnopere alit. Bubuloq; proportionē correspōdet. Nec defunt qui hippacen, equinum coagulum appellarint.

De Butyro & eius fuligine.

CAP. LXXXI.

Lacte pinguiſſimo probatum fit butyrum, quale bubulum est. Fit & ex caprino, agitato in vasis lacte, donec pingue diſcedat. Butyrum natura oleoſum eſt & emolliens. Vnde largius epotum, ventrem reſoluit. Prodeſt vbi oleum nō adſuerit, contra venena. Cum melle ſi inſtricitur, dentitiones adiuuat. Gingiuarum pruritus, & oris vlcera infantibus emendat. Illitum foris capaciora alimentorum facit corpora. Et ab albidis puſtulis per ſumma ſcatentibus aſſerit. Cōtra inflammationes & duricias vuluæ, quod nec virus reſipit, nec vetuſtatem ſentit, butyrum efficax eſt. Dyſentericis, & coli exulcerationibus inſūdatur. In medicamēta addi ſolet, quæ pus mouent. Vtile præſertim cum nerui, aut cerebri membranæ, veſica, aut ceruix, vulnera accēperit. Id autē purgat. Replet. Carnē creat. Ab aſpide percuffis vtiliſſime imponitur. Recens obſonijs additum olei vicem penſat. & adipis vice fungitur in bellarijs. Colligendæ ex eo fuliginis ratio hæc eſt. Butyrum in lucernā nouam ingeſtum accēditur, fiſtiliq; operculato quod ſuperne in ſiphunculum deſinat, & ſub pedibus cuniculos clybani modo habeat, crematur. & ſubinde aliud in abſumpti locum ſufficitur, dū coaceruetur fuliginis modus, quem facere inſtitueris. Penna poſt deraditur ad vſus. Eius effectus eſt in medicamētis oculorum, exiccare & adſtringere. Fluſiones cohibet. Et vlcera celeriter ad cicatricem perducit.

De Medicina lanarum.

CAP. LXXXII.

Vccidæ lanæ molles, e collo fœminibusq; laudatiſſimæ habentur. Subueniunt inter initia vulneribus, percuffis, deſquamatis, liuidis, oſſibus fractis, aceto oleo aut vino imbutæ. Si quidem capaces ſunt liquidorum, quibus obleſæ partes fouentur. Et ob pecudum ſordem, ſic enim œſypum vocant, emolliunt. Capitis, ſtomachi, aliarumq; partium doloribus, cum aceto & roſaceo efficaciter imponuntur.

De Lanis vſtis.

CAP. LXXXIII.

Rematarum lanarum cinis cruſtas obducit. Excreſcētias in carne cohibet. Et vlcera ad cicatricem perducit. Mūdæ autem & carpræ in fiſtili crudo cæterorum more vrūtur. Nec

secus purpurarum tomēta cremari solent. Aliqui cum sordibus lanas carpunt & melle irrigant, eodemq; modo vrunt. Alij in fictili oris patuli, verucula inter se distantia componūt, & conceptas lanas oleo ita suffusas, vt ne stillare quidem possint, assulis tædæ subiectis & eisdem lanisq; permutatim interstratis, leuiter succendunt, & vstas tollunt. Quod si e tæda pix, pinguitudine vlla profluxit, collecta recōditur. Lauatur ad oculorum medicamenta. Cinerem in labellis aqua addita manibus confricant, & cōfidere patiuntur. Idq; sæpius, mutātes aquā donec linguam adstringat, nec mordeat.

De Oesypo pecudum forde. CAP. LXXXIIII.

Oesypum vocant græci, succidarum lanarum pinguitudinē.

o Cuius parandi ratio hæc est. Succidæ molles radícula curatæ, calida aqua lauantur, & quibuscunq; sordibus expressis, & in labellum oris ampli coniectis, aqua infunditur, magnoq; impetu cocleari vti respumet agitur, aut lignea rude validiuscule conturbatur, quo largius sordida spuma colligi possit. Deinde marina respergitur. Et confidete pingui quod supernatabat, collectoq; in fictili vase, denuo aqua in labellum fusa agitur. Spuma mari perfunditur, & demum eximitur. Hoc tantisper fieri solet, dū consumpta pinguitudine nihil prorsus spumæ extet. Collectū oesypū manibus emollitur, & si qua infedit spurcitia, cōfestim demitur. Exclusaq; sensim omni aqua, recentiq; affusa, manibus misceatur, donec admotum linguæ oesypū, adstringat leuiter, nec mordeat. Atq; pingue candidūq; spectetur. Tū in fictili vase conditur. Verum omnia feruido sole fiant. Nonnulli ex colatum pingue frigida aqua eluunt, & manibus non secus atq; cæratum fœmine, confricant. Ita enim cādidius redditur. Alij elotis lanis, & sordibus quibuscunq; exemptis, ac lento igni in æneo vase ex aqua decoctis, pingue quod supernatat collectum, aqua vt diximus lauant, colatumq; in fictilem ollam quæ calidam aquam contineat, linteo operiunt, atq; soli mandant, donec candidum fiat, & satis crassum. Alij bi diu spacio aquam effundūt, nouamq; adiiciunt. Melius est læue, radícula non curatum, quod succidarum virus oleat. Et si manu in concha fricetur cum aqua frigida albescat, nihil in se duri aut concreti habens. Veluti quod cærato aut adipe adulteratur. Oesypum excalfacit, explet vlcera, & emollit, præsertim sedis ac vuluæ, cum meliloto & butyro. In vellere appositum menses & partus euocat. Vlceram nō aurium modo sanat, sed & genitalium cum anserino adipe. Cōtra erosos angulos oculorū, scabiososq; genas quæ occalluerunt, & ciliorum defluuia, efficacis est. In testa noua torretur, donec redactum in cinerem pinguitudinē amittat. Ex eo etiā fuligo colligitur, vti demonstrauimus. Quæ

DE MEDICINALI MATERIA

in oculorum medicamenta commode addi solet.

De Coagulo. CAP. LXXXV.

I Eporis coagulum tribus obolis ex vino, venenatorum mor-
fibus, cœliacis, dysentericis, & fœminis fluctione vuluæ labo-
rantibus, ac reiectionibus a pectore, auxiliatur. Sanguinem
concretum discutit. Post menstruas purgationes appositum vuluæ cū
butyro, præstat mulieribus vt concipiant. Potum vero partus enecat.
Et post excretiones, pariēdis spem adimit. Equi coagulum quam hippa-
cen aliqui vocant, priuatim cœliacis dysentericisq; conuenit. Hædi,
agni, hinuli, capræ, apri, cerui, vituli, bubaliq; coagula similes natu-
ras fortiuntur. Contra aconiti potum in vino, & cōcretum lac in ace-
to, conuenienter assumuntur. Hinuli coagulum triduo a purgationi-
bus admotum, partus spem intercipit. Vituli marini coagulum casto-
rei vires repræsentat. Comitilibus, strangulatis vuluis, potu confer-
re existimatur. Sed syncæri hoc experimentum est. A qua inspergitur,
qua paulisper cum alterius animantis, tum præcipue agni coagulum,
maduerit. Quod si verū est, statim liquefcit in aquam. Sin minus, cō-
simile permanet. Excipitur autem catulis qui nondum natare possunt.
In summa coagulum omne dissipata cogit, & coacta dissoluit.

De Adipis ratione. CAP. LXXXVI.

a Deps anserinus aut gallinaceus recens & sine sale conditus,
ad vuluæ vitia proficit. Sale inueteratus, & qui tēporis spa-
tio acrimoniam concepit, vuluæ inimicus est. Recens exem-
ptis membranis in fictilem ollam demissus, quæ altero tantopere ca-
paciore fit, quantus fit modus adipis quem curare institueris, obstructo
diligenter vase, flagrantissimo soli exponitur. Eliquescent inde humor
in fictile alterum excolatur, donec adeps omnis absumatur. mox loco
vehementer frigido reconditur. Et ad vsus digeritur. Alij fictile ful-
ciūt super aquam calidam, aut tenuem & elāguidam prunam, quæ so-
lis vicem penset. Est & alia curandi ratio. Exemptis membranis teri-
tur, coniectusq; in ollam eliquatur, adiecto minuti salis momēto. Mox
lineo colo trāsfusus reponitur. Vtiliter in medicamenta additur, quæ
lassitudines & fatigationes leuant. Suillus adeps & vrsinus hoc curā-
tur modo. Recēs, præpinguis, renibus potissimum detractus, in lar-
giore aqua cœlesti & q̄frigidissima, exēptis tunicis, diligētissime ma-
nibus confricatur, & exprimendo ferme ficcatur, subindeq; noua aqua
abluitur. Cæterum fictili capacitatis duplæ inditus, in aquam demergi-
tur. Et subditis leuibus prunis spatha mouetur. Eliquatusq; colo trās-
funditur in aquam. Vbi vero refrixit & guttatim aquam omnem exclu-
dit, in prælotum fictile demittitur. Et infusa aqua leniter eliquari debet,

& manu deprimi, quo facilius sæculentum virus pessum eat. Postea in pilam spongia madefactam transfunditur. Vbi coire cœpit, residens in imo sordes eximitur. Tertio citra aquam eliquatur, repurgatusq; fictili bene operculato, perq; frigidis locis reponitur. Hircinũ seuum, ouilum, ceruinumq; ita curato. Elotũ ex his quodcunq;, tunicis vt in suilli mentione dictum est exemptis, pilæ emolliẽdum tradito, ac manibus fricato, affusa paulatim aqua, donec ne amplius quidem cruentum virus excernatur, aut pingue aliquod innatet, sed nitida spectetur. Deinde in ollam conijcito, & adiecta aqua vt superemineat, leui pruna liquefacito, atq; in aquam colato. Cumq; refrixerit, iterum in loto fictili eliquato. Et quæ ante diximus facito. Tertio sine aqua liquefactum, in perfusam liquore pilam colato. Refrigeratumq; vt in suilli ratione diximus, recondito. Bubulum autem seuum renibus maxime detractũ, exemptis membranis, aqua, marina ex alto petita eluendum est. Mox in pila tundendum diligenter, affusa maris aqua. Cum vero dissolutũ fuerit, in fictilem ollam conijciẽdum. & marina aqua quæ nõ minus dodrante superemineat, proluẽdum. Decoquendum donec omnis aboleatur odor, additis ad singulas seui atticæ minas, quaternis tyrrenicæ cæræ drachmis. Excolatumq;, detractis quæ pessum ierant sordibus, in nouo fictili reponendum. Opertumq; soli interdiu credendum, vt ad candorem reducat, & virus euanescat. Priuatim taurorũ pingua sic curari debent. Renibus euulsum pingue profluente amnis aqua abluito, detractisq; tunicis fictili nouo postq; exiguum salem insperferis, liquefacito. Dein in nitẽtẽ aquã excolato, & vbi concresecere cœpit, manibus iterum confricando vehementer lauato, aqua sepius infusa refusaq;, donec q̃ optime elotum videatur. Rursus in olla cũ pari modo vini odorati decoquito. Et cũ iterũ efferbuerit, dempto ab igni vase, ibidẽ finito pernoctare. Postridie si grauiter adhuc oleat, noua olla repetitum, vino odorato perfundatur. Eadem quæ prius fiãt, dum omne virus euanescat. Colliquatur & sine sale, præsertim affectionum earum causa, quibus sal aduersari solet. Sed ita paratum nõ magnopere albescit. Eodem modo pardorũ ac leonum pingua curari oportet. Taurorum autem & vitulorum pingua, necnon ceruorum medullæ, odoramentis imbuuntur, hac ratione. Pingue quod odoratũ reddi debet, demptis quo diximus modo membranis, elotum & vino q̃ odoratissimo nulla maris aqua diluto feruesfactum, pernoctare finitur. Alterum id genus vinum eadem mensurã infunditur, colliquatur, & exquisite colatur. Nouẽq; eius heminis, iunci arabici septẽ drachmæ adijciuntur. Quod si ipsum odoris fragrantioris fieri voles, quadraginta floris eiusdem drachmæ, cum paribus palmæ, calami, & ca.

DE MEDICINALI MATERIA

fiæ modis addūtur. Et xylobalsami, aspalathi singulæ drachmæ, cinna-
momi, cardamomi, & nardi, singulæ vnciæ. Omnia exactius tundun-
tur, & affuso vino odorato, in vase operto quod supra carbones firma-
ter collocatum sit, ter efferuescunt, & semoto ab igni vase inibi perno-
tant. Postridie vinum effunditur. Aliudq; generis eiusdem adijcitur.
Ter simili modo conferuescat. Matutinis vinum effundatur. Et ablu-
to vase, si quid imo subsidēs hæsit, detergatur. Postremo eliquatū pin-
gue & excolatū, ad vsus recōditur. Hoc autē modo odoramētis imbu-
rur, quod antea curatum est. Verum ante dicta prius inspissari solent,
quo facilius sibi odoramētorum vires adsciscant. Itaq; assumens quod
voles cum vino feruefacito, impositis vna myrti ramulis, serpylo, cy-
pero, item aspalatho plenius tuso. Aliqui tamen pro vsu, vno dumtaxat
horum contenti sunt. Cum autem ter efferbuit, exemptum leniter
& linteo colatū, aromatis vti expositum est imbuitur. Adipibus spiss-
samenta sic fiunt. Syncærus & sanguinis expers adeps, reliqua habēs
quæ sæpe retulimus, in ollam nouā demittitur, infuso vino albo vete-
re odorato, quod semipedis altitudinem superet, lento igni feruescat,
dum vernaculus odor aboleatur, planeq; vinum redoleat. At vbi de-
posito vase refrigit, duæ adipis minæ in ollam mittuntur, & duo vini
eiusdem sextarij, & seminis loti, eius inq; cuius e ligno ludicræ tibie fa-
ctantur, tusi minæ quattuor adijciuntur. Lento igni subinde miscēdo
decoquuntur. Cumq; odoris virus euauerit, excolatusq; adeps refri-
xerit, vna contusi aspalathi mina, cū amaracini floris minis quattuor,
& vetere vino subigitur. Nocte vna hæc odorē rapiunt, cōbibuntve.
Postridie in fictilem ollam tricongialem ea omnia cum adipe iniecta,
additis sextarijs tribus vini, vna feruescūt, quousq; & vim & odorem
spissamentorum adeps ipse contraxerit. qui eliquescent colatur & re-
ponitur. Quod si maiore odoris fragrantiam efflagites, drachmas octo
q; pinguius myrrhæ vino macerate quod multos in annos asserua-
tum est, misceto. Gallinaceus anserinusq; sic odoribus imbuī solent.
Cuiusvis eorum percurati sextarij duo fictili olla excipiuntur, erysæ-
ptri, xylobalsami, palmæ elatæ, & calami plane contusi singulorum
fescūcia admiscetur. Vini lesbij veteris cyathus vnus adijcitur. Ea ter
efferuescunt prunis. Mox vase sublato ab igne, die noctuq; refrigeran-
tur. Postridie liquata per linteū mundū in vas excolatur. Vbi vero
adeps coierit, concha excipitur, fictiliq; nouo densius operto perfrigi-
dis locis reponitur. Hyberno tēpore id instituere oportet. Aestate si-
quidem pingua nō cogūtur. Nec desunt qui tyrrhenicæ cæræ momē-
tum adijciant, quo facilius in vnum corpus omnia coalescant. Eadem
ratione suillus adeps & vrsinus cæteri q; id genus, odoramentis imbu-

untur. Verum sanfuci odorē adeps ipse repræsentabit hoc modo. Curati quod optimi adipis præsertim taurini mina vna, tempestiuque sanfuci exquisitè confracti sesquimina miscentur, & insparso largiore vino digeruntur in offas, quæ in vase cooperto nocte quiescunt. Matutinis in fictili olla leuiusculo igni, affusa aqua coquuntur. Dumque suum adeps odorē exuerit, defæcatus ac bene opertus, nocte tota permanet. Postero die deterfa sorde quæ pessum ierat, sanfuci ut dictum est contusi iterum sesquimina priori pastillo adijcitur. Eodemque modo in offas cogitur. Alijs quæ diximus peractis, decoquitur & colatur. Quod si qua fundo hæsit spurcitiâ deraditur, & frigido loco reconditur. Si quis tamen incuratum adipem anserinum, gallinaceum, aut vitulinum, a putredine tueri velit, ita faciendum est. Quamuis adipem diligenter elotam & ficcata in umbra super cribrum per lintea munda manibus vehementer exprimat, linoque consutam umbroso in loco suspendat. Et post multos dies noua charta inuolutam, frigido loco recondat. Pingua autem indito melle vindicantur a putredinis vitio. Vis omnium est excalfacere, mollire, odorem ciere. Taurinus adeps, bubulus, & vitulinus aliquantum adstringunt. Earundem virium compos leoninus. Nam resistere eum aiunt ijs qui infidias moliantur. Ceruino, elephantinoque perunctos, serpentes fugiunt. Adstringetior est caprinus. Quæ ex causa decoctus cum pollenta, rhoe & caseo, dysentericis datur, & cum ptisanæ succo infunditur. Ius decocti phthysicis in sorbitionibus prodest. Datur quoque vtiliter hijs qui cantharidum venena hauserunt. Hircinus, ut qui validissime discutiat, podagricis auxiliatur cum fimo capræ & croco impositus. Huic proportionè respōdet ouillus. Suillus vero contra vuluæ & sedis vitia idoneus est. Ambustis igni medet. E sue vetustissimus quisque sale conditus excalfacit, & emollit. Elotus vino pleuriticis prodest. Cinere aut calce exceptus, inflammationibus, fistulis, ac tumoribus succurrit. Asininum tradunt, cicatrices corpori concolores reddere. Anserinus gallinaceusque conueniunt muliebribus malis, & ad labiorum rimas, ad mangonizandam faciem, & contra aurium dolores. Vrsinū constat raptos vitio alopecie capillos restituere. Pernionibus subuenire. Vulpinus medetur aurium doloribus. Fluiatilium piscium pingua perunctis oculis claritatem afferunt, si in sole liquecant, & melli ammisceantur. Viperæ adeps contra oculorum hebetudines suffusioneque efficax est, addita cedria, melle attico, & pari oleo vetere. Pilos alis euulsos perunctis radicibus obliterat.

De Medullarum ratione. CAP. LXXVIII.

Audatissima est ceruina. Mox vitulina. Post hanc taurina.

I Dein caprina, & ouilla. Colliguntur æstatis exitu, cum appe-

DE MEDICINALI MATERIA

tit autumnus. Quippe cum alijs anni temporibus concrementū sanguinis, & veluti caro friabilis, in ossibus inueniatur. Nec facile cognosci potest nisi quis eam ossibus extrahat & recondat. Omnes medullæ molliunt, sedant, rarefaciunt. Vlcera explent. Ceruina perunctos venenata fugiunt. Curantur recentes aquæ resparlu mollitæ, selectisq; ossibus elotæ, donec aqua syncæra emanet, & deterfa sorde pîna, si qua innatet, liquatæ per duplicatū linteum in pillam exprimuntur. Et ubi coiere, omni fæce quæ ad ima sidit derafa, fictili nouo reponuntur. q; si libet incuratas reponere, facito omnia quæ de anserum & gallinarum adipe demonstrauius.

De Felle.

CAP. LXXXVIII.

El omne curatur hoc modo. Recens præligato ore folliculi
f lino, demissum in feruētem aquam, spatio quo quis stadia tria
percurfaret, mox exemptum ficcatur vmbroso loco aspergi-
nem non redolente. Sed quod ad oculorum medicamenta adijci solet,
ligatum lino in vitreum vas quod mel habeat immittitur, circumuolu-
to ad os vasis lini principio, & operto vase reconditur. Est enim vis
omnium acris & excalfaciens. Intensis tamen & remissis viribus diffe-
runt. Siquidem præstātius in effectu esse videtur fel marini scorpionis,
& piscis qui callionius appellatur, marinæ testudinis, hyenæq;. Item
perdicis, aquilæ, gallinæ candidæ, & sylvestris capræ. Quod priuatim
prodest contra suffusiones incipientes, & oculorum caligines, albugi-
nesq; & genarū scabricias. Ouillo, suillo, hircino, atq; vrsino, taurinū
multo efficacius. Felle omni perfacilem præsertim infantibus deiectionem
quis molietur, si intinctum eo tomentum sedi subijciat. Priuatim
taurino anginae cum melle perunguntur. Sedis vlcera sanat, & ad ci-
atricem vsq; perducit. Idem auribus fractis, & purulentis, cum mu-
liebri lacte aut caprino instillatum, medetur. Et sibillo earumde ex por-
risucco. Admisceri insuevit vulnerarijs emplastris, & circumlinationi-
bus quæ contra venenata parantur. Phagedænicis vlceribus, colis &
scroti doloribus, ex melle prodest. Lepras, surfures cum nitro & terra
cimolia q̄optime purgat. Ouillum & vrsinum contra eadem pollut.
Verum inefficacius hæc præstant. Vrsinū eclegmate comitiales adiu-
uat. Fel testudinum anginis, & in ore infantium nomis, prodest. Nari-
bus inditum comitiales erigit. Sylvestrium caprarum felle peculiari-
ter peruncti lusciosi sanantur. Hircinum idem obit munus. Thymia
abolet. Et luxuriantes elephantorum extuberationes illitu reprimi-
t. Suillum autem contra auriū vlcera, reliquaq; omnia, magno vsu assu-
mitur.

LIBER SECVNDVS

40

De Sanguine.

CAP. LXXXIX.

Anguis anseris, agni & hædi, vtilissime in antidota miscetur. Palumbi autem turturis & columbæ, necnon perdicis, oculis cruore suffusis, & recentibus eorum vulneribus, luscio fuscq; illinuntur. Peculiariter columbæ sanguis, cruorem membranæ cerebri erumpentem inhihet. Hirci, capræ, cerui & leporis sanguis patinis inassatus, dysenterias & celiacorum profluvia sistit. In vino potus contra toxica efficax est. Leporinus sanguis ita vt tepet illitus, vitia cutis in facie, lētiginēsq; emaculat. Caninus commode ab his bibitur quos efferata in rabiem bestia momorderit. Contra epotum toxicū auxilio est. Testudinis terrestris sanguinem epotum tradunt prodesse comitialibus. Marinæ autem testudinis cum vino & leporis coagulo cuminoq; contra serpentium morsus, & hausta rubetæ venena, conuenienter bibitur. Taurinus cū polenta illitus, duricias discutit, emollitq;. Sanguis equarum quæ admissuræ expertæ sunt, in medicamenta additur quæ erodūt, septica vocant. Sanguine chamæleonis genarū palpebras euelli creditum est. Hoc idē viridium ranarū sanguine præstatur. Menstruus sanguis fœminarum, circumlitu conceptionem inhibere existimatur, aut si omnino mulier mēstrua supergrediatur. Leuat podagras muliebres & ignem sacrum illitus.

De Fimo.

CAP. XC.

Rmentarij bouis fimum si recens admoueat, vulnerum inflammationes mitigat. Folijs autem inuoluitur, & calfactum cinereferuenti superponitur. Coxendicis cruciatus tali impofitu compescit. Illitū ex aceto duricias, panos, & strumas discutit. Priuatim suffitu fimi, quod a masculo boue redditum est, procidētes vuluæ reprimuntur. Accensi nidore culices abiguntur. Fimum caprarum præsertim quæ in montibus errant, potum in vino regium morbum emēdat. Menses cit cum odoramētis haustum. Et partus euocat. Tritum in farinam, & impofitum lanis cū thure, fœminarum profluvia sistit. Cæterosq; sanguinis ipetus ex aceto cohibet. Medetur alopecijs exustum, & cum aceto mulso illitum. Cum axungia vero impofitum, his qui podagra tentantur auxilio est. Caprillum in aceto decoctum imponitur serpētium morfibz, vlceribus quæ serpunt, igni sacro, & parotidibus. Vtilem ischiadici vstionem hunc in modum accipiunt. In interstitio pollicis qua parte brachio committitur, caua veluti lacuna subsidet, in qua lana oleo imbuta substernitur, deinde sigillatim feruētes stercoreis caprini pilulæ imponuntur, dum vapor per brachiū ad coxam sentiat peruenire, & coxendicis dolorem mitigare. Aduſtio id genus arabica appellatur. Fimum pecudum ex aceto illitum sa-

DE MEDICINALI MATERIA

nat epinyctidas, clauos, pēfiles verrucas, thymos, & ambusta igni rosaceo carato exceptum. Finum suis syluestris aridum, in aqua aut vino potum, reiectiones sanguinis sistit. Vetus tum lateris dolorem mulcet. Adrupta & conuulsa ex aceto bibitur. Luxatis cum carato rosaceo medetur. Tam asinorum q̄ equorum finum, siue crudū siue crematum addito aceto, sanguinis eruptiones cohibet. Armentarij qui herba pascitur siccum finum liquatum in vino, mox potum, contra scorpionū iētus magnopere auxiliatur. Columbinum vehementius excofacit & vrit cum hordeacea farina mixtum. Strumas ex aceto discutit. Carbunculos emarginat, tritum cum lini semine & oleo. Ambustis igni medetur. Gallinaceum vero omnia eadē, sed inefficacius pręstat. Priuatim tamē contra venenafungorū, & coli cruciatus ex aceto aut vino bibitur. Ciconiæ finum si ex aqua hauriatur, comitialibus prodesse credunt. Vulturini fini nidore partus excuti produntur. Murinum detritum cum aceto & illitum alopecijs medetur. Cum thure & mulso calculos expellit. Subditæ infantibus muscerdæ alui deiectionem promouēt. Caninum quod flagrantissimo canis sydere fuerit exceptum, cum vino aut aqua potum, sistit aluū. Humanum stercois illitum, vulnera inflammationem minantia intumescere nō patitur. Sed ea statim glutinat. Sicco ex melle angina perungi commodissime traduntur. Terrestris crocodili finum crocodileam vocant, quæ mulieribus colorem nutrit infacie, nitoremq̄ seruat. Optima est tenuissima & friabilis, amyli modo minime ponderosa, in humore statim eliquescent, quæ cum teritur fermenti acorem quadātenus refert. Adulterant eam sturnorum fimo, quos captos oryza pascunt. Ipsumq̄ non dissimile vāndunt. Alij Amylū aut Cimoliam miscent, & adscito colore per rarum cribrum paulatim exprimunt, vt se cōtrahat in vermiculorum speciem. Qui siccati pro crocodilea vāneūt. Inter omnes cōuenire inuenio humanum stercois caninumq̄ gutturi impositum, anginis auxiliari.

De Vrina.

CAP. XCI.

h Vmanam vrinam suam cuiq̄ bibere, contra viperæ morsus ac venena, incipientemq̄ aquam intercutem proderit. Marini scorpionis, viperæ, draconisq̄ morsus ea cōuenientissime fouētur. Canina ad perfundēdos canis morsus idonea est. Pruritus & lepras nitro addito expurgat. Sed vetus vlcera capitis manātia, furfures, pforas, & feruidas eruptiones, multo magis abstergit. Nomas & præcipue genitaliū cohibet. Auribus infusa manans pus suppressit. Decocta in calice mali punici, earum vermiculos abigit. Pueri impubis resorpta vrina, orthopnoicis auxiliatur. Decocta in æreo vase

cum melle emendat cicatrices, argema, caliginesq. Ex ea & cupro idoneum auri ferrumen conficiunt. Lutum quod in vrina subsidit, illitu ignem sacrum mitigat. Feruefactum cum cyprino, inditumq, vuluæ dolores mulcet. Stragulus leuat. Genas deterget. Oculorum cicatrices expurgat. Taurina si cum myrrha instilletur, aurium dolores lenit. Aprina viribus eisdem prædita est. Priuatim comminuit vesicæ calculos, & potu expellit. Ad aquam quæ cutem subiit, cum nardi spica cotidie binis cyathis cum aqua bibitur, vrinamq, per aluum extrahit. Aurium doloribus instillata medetur. Asinina traditur renum vitij mederi. Lyncis vrinam quam lyncurium appellant, simulac excernitur, glaciæ ri coire ve in calculi duriciam, vulgo creditum est. Quare quod de ea proditum est, vanum esse conuincitur. Est enim quod a nonnullis vocatur succinum pterygophoron, Id potum ex aqua stomacho aluoq, fluctione laboranti conuenit. Asininae vrinae potu renum vitia sanari traduntur.

De Melle.

CAP.

XCII.

Rincipem locum obtinet mel, quod atticae regionis est, præcipue ex hymeto, mox cycladibus insulis, & e sicilia cognomine simblion. Maxime probatur dulcius & acre, odoratum, sufflauium, nec humectum, graue, & minime fluxum, quod ob sequentem lenticiam non facile abrumpitur, tractumq, resilit in digitos. Mel abstergendi vim habet. Ora venarum apperit. Humores euocat. Quæ ratione in sordida vlcerâ sinuq, commodissime infunditur. Decoctum atq, impositum abscedentem carnem glutinat. Medetur impetigini costum cum liquido alumine & illitum. Item aurium sonitui & dolori cum fossili sale tepido instillatum. Lendes & fœda capitis animalia illitum necat. Nudam glandem recutitis operit, præsertim quæ circumsione aperta non est, si melle coles a balineo triginta diebus emollitur. Oculorum caliginem discutit. Faucibus, tonsillis, anginae illitum gargarisatumve medetur. Vrinam ciet. Auxiliatur tussi, & a serpente percussis. Contra haustum meconium, cum rosaceo calidum assumitur. Aduersus venena fungorum, & rabiosi canis morsus linctum aut potum proficit. Crudum tamen aluum inflat. Tussim laceffit. Et ea de re despumati vsus aptior est. Primatum tenet in mellis genere verum, deinde æstium. Hybernium vero utpote quod crassius constat, deterimum reputatur. Siccas eruptiones excitat. Quod in Sardonia gignitur mel, amarum est. Quonia apes inibi absinthio vescuntur, quo vitia cutis in facie & macula aptissime perunguntur. Heraclia in poto quibusdam anni temporibus, propria quorundam florum dote, mel conflatur, quod qui edere, mente ab alienantur, ac sudore diffluunt. Remedio sunt

f. j.

DE MEDICINALI MATERIA

estata ruta, & balsamēta, aut epotū mulsū, resūpta quoties vomitio-
ne reijciūtur. Acre autē est. Et olfactu sternutamēta mouet. Quod cū
colsto illitū fœminarū cutē emēdat, & cū sale sugillationes rapit. Est et
aliud cōcreti mellis genus, quod saccharon nominatur. In India vero
& fœlici Arabia in arūdinibus iueniūt. Salis modo coactū est, dētibus
vt sal fragile. Aluo idoneū, & stomacho vtile. Si aqua dilutū bibatur,
vexatæ vesicæ, renibusq; auxiliat. Illitū ea discutit, quæ tenebras oculo-
lorū pupillis offundūt.

De Cæra, CAP. XCIII.

Aera optima est subfulua, odorata, suppiguis, pura, odorisq;
quadatenus mellei, natione pontica, aut cretica. Secūdū locū
obtinēt cādida, & suapte natura pinguis. Cādida fit hoc mo-
do. Ex ea radunt album syncerūq; atq; transfundunt in vas, quod sa-
tis habeat marinæ ex alto petiti, insparsoq; niri momēto, decoquunt.
Cūq; iterū tertiove inferbuit, separatū vas refrigerant, ac cæræ pasta-
lum eximūt, deterfā sorde, siqua forte adhæsit. Tū denuo indita noua
maris aqua feruet, vt retulimus. & vase dēpto ex igne, basin ollulæ no-
uæ aqua frigida madefactā, in cærā summā suspēsa manu intingūt, quo
celerius cōcreseat, & q̄ minima portio extrahatur. Suscepto primo cæ-
ræ orbiculo, iterū vas inum aqua refrigeratū, tantisper immitti debet,
dū tota excipiat. Orbiculi lino cōsuti, ita vt intercedat spatiū, suspen-
dūtur. Et interdiu, cōtinuo sub sole, noctu sub luna aspergūtur, vsq; dū
perfecte albescant. Verū si eximius ille candor desyderetur, eadē factita-
ri, & identidē recoqui, operæ preciū est. Nec desunt qui pro marina, in-
muriā q̄ acerrima, semel aut iterū excoquant. Dein languicula, tenui,
rotunda, ansam habente, extrahunt. Postea orbiculos, substrato cespi-
te hærbofo insolāt, donec candorē summū cōtraxerit. Præcipiūt hoc
obeūdū munus vere, cū sol remissā vehemētia humorē pariat, vt nō fa-
cile liquetur. Cæra omnis mollit, calfacit, modice explet corpora. Da-
tur in forbitione dysentericis. Ac milij magnitudine decē grana cæræ
hausta, lac in laetantibus non patiuntur coagulari.

De Propoli. CAP. XCIII.

Ropolis eligi debet flaua, odorata, styracē referēs, in vehemē-
ti ariditate mollis, & mastiches more ductilis. Magnopere
calfacit & euocat. A culeos & omnia infixā corpori extrahit.
In vetere tussi suffita proficit. Impetigines admota tollit. Ea i alueariū
foribus, cærosæ naturæ iueniūt.

De Tritico. CAP. XCV.

Prima e tritici generibus ad secūdæ valitudinis vsus habent,
quæ recētia & iā perfecte adulta, colorē mali referūt. Dein se-
quūtur trimestria, quæ nōnullis Sitania nominant. Itaq; cruda i cibis

*De saccharo. quod fit
in mellis gēna remmā.*

teretes tineas gignūt. Canū morib⁹ profūt māsa & iposita. Cōfectus eorū simlagine panis, plus alit q̄ cibarius. E trimestriū farina panis leuio^re cibū prābet, & qui facile in mēbra demādet. Farina eorū cū hyoscyami succo illiniē aduersus neruorū fluctiones, quas Grāci rheumatismos vocant. Itē cōtra interaneorū inflationes. Lentigines ex aceto mulso tollit. Furfures autem in acri aceto decocti, turgētes māmas sedant. Viperarum ictibus auxiliantur. Et torminosis profunt. Farina cū fermetum calfaciendi extrahendiq; vim habet. Priuatim callos pedum, clauosq; extenuat. Cætera tubercula furunculosa ex sale concoquit, & aperit. Siraniorum farina, contra venenatos ictus cū aceto aut vino cōmodissime illinitur. Eadem si decocta in glutini modum deslingatur, cruētis excreationibus proderit. Contra tussim & exasperatas fauces, cum menta & butyro decocta efficax est. Tritici pollen si ex aqua mulsa, aut hydræleo decoquat, omnē discutit inflātionē. Panis & crudus & coctus inflātionem omneis illitu mulcet, cū emolliat & quadamtenus refrigeret. Sed hærbus succisve huic rei accōmodatis ammiscetur. Vetus panis aridus, adiectis cōueniētibus, citā aluū cohibet. Recēs muria maceratus illitu, vetustas impetigines sanat. Glutinū ex simlagine & polline, quo chartæ glutinātur, sanguinē excreatibus prodest, si liquidius ac tepidū cochlearis mensura detur sorbendum.

De Hordeo. CAP. XCVI.

Ordeū optimū est candidū purūq;. Id minus q̄ triticū alit.
 h Ptilana tamen ob cremorē in decoctione redditū, plus alimēti prābet q̄ pollenta ex hordeo facta. Cōtra acrimonias atq; fauciu scabrias, exulcerationesq; pollet. Quibus etiam triticea ptilana præsidio est. Sed plus alit magisq; vrinam mouet. Lac abunde supeditat, si cum fœniculi semine decocta sorbeatur. Hordeū abstergit. Vrinā ciet. Inflationē parit. Stomacho aduersatur. Tumores concoquit. Farina hordeacea decoquitur in mulsa aqua cū fico, vt inflammationes collectionesq; discutiat. Duricias cū refina & fimo columbarū cōcoquit. Cū meliloto autē et papaueris calyce dolores finit, qui latus excruciat. Aduersus intestinorū inflationes cū lini semine, fœnogræco, & ruta, illini iuuat. Strumas cū pice liquida, cæra, oleo, & impubis pueri vrina, ad cōcoctionē perducit. Et cū myrto, vino, malicorio, syuestribus pyris, & rubo, alui profluvia sistit. Podagricis inflātionibus, cū cotoneis aut aceto prodest. Decocta in acri aceto, modo quo hordeaceū cataplasma, & calida imposita, lepris medetur. Liquata eadem cū aqua, atq; cum pice decocta, pus excitat. Cum aceto liquata itidem contra articulorum fluctiones prodest. Farina ex his aluum cohibet, inflammationesq; mitigat.

*ptilana hordeana plus nutrit
 pollenta ex hordeo.*

DE MEDICINALI MATERIA

De Zytho. CAP. XCVII.

X hordeo potus fit, cui zytho nomen est. Is vrinam cit. Re-
e nes & nervos tentat. Membranis præsertim cerebrum velli-
entibus officit. Inflationem parit. Vitiosum succum creat.
Elephātia fin gignit. Qui eo potus genere perluitur, agilis, & ad opus
obeundum expeditus, euadit.

De Courmite. CAP. XCVIII.

It & ex hordeo potus quem Courmi nominant. Eoq̃ sæpe
f potu, pro vino vtuntur. Verum dolorem capitis mouet. Ma-
lum succum gignit. Neruis nocet. Cōsimilia etiam potus ge-
nera ex tritico fieri solent, in Britania, & quæ occidentem spectat ibe-
ria.

De Zea seu semine. CAP. XCIX.

Ea duorum generum est. Vna simplex. Altera in geminis pu-
z taminibus grana bina iuncta gerit. Ob id dicoccos appella-
tur. Plus q̃ hordeū alit. Ori grata. Digeritur in panificia, mi-
nus q̃ triticū alens.

De Crassiore farina. CAP. C.

Rimnon crassior est ex zea triticoq̃ farina, ex qua pultē fa-
ciant. Abunde alit. Facile conficitur. Aluū vehemētius ad-
c stringit, si zea ex qua fit, prius torreatur.

De Siligine. CAP. CI.

Idem generi filigo adscribitur, sed minus aliquanto nutrit.
e In panes vt zea cogitur. Fit quoq̃ e siligine crassior farina,
quam græci crinnou vocitant.

De Athera idest tenui pulticula. CAP. CII.

Athera ex zea fit tenuissime molita. Est autem sorbitio, quasi
a liquida pulticula infantibus conueniens, & cataplasmatidis
efficax.

De Trago. CAP. CIII.

Ragos quamdam halicæ figuram gerit. Multo minus q̃ zea
t nutrit, q̃ multum aceris habeat. Quare ægrius conficitur. Al-
uumq̃ magis emollit.

De Bromo. CAP. CIIII.

Romus genicula quædam habet. Folio & stipula triticum
b imitatur. Et in cacuminibus dependentes paruulas veluti
locustas gerit, in quibus semen continetur, vtile ad cataplas-
mata vti hordeum. Pulte huius aluus sistitur. Prodest tussientibus in
forbitione succus.

De Oryza. CAP. CV.

Oryza frugum generis est, in paluistris riguisq̃ nascēs. Me-
o diocrem cibum præstat. Sed aluum suppressit.

De Halica. CAP. CLVI.

Alica fit ex zea, quam dicoccon appellauimus. Plus alit q̃
h oryza. Aluum magis cohibet. Stomacholonge vtilior. De-

LIBER SECVNDVS

43

cocta in aceto illitaq; lepras tollit. Vnguium scabrias extricat. Incipientibus ægyptijs medetur. Decoctum dysentericis quos excruciat dolor, infusum idoneum est.

De Milio.

CAP. CVII.

m Ilium in panes coactum, minus cæteris frugibus alit. Sistit pulte sua aluum. Vrinam cit. Torretur milium; feruensq; in sacco ponitur, vt torminibus, reliquisq; doloribus, auxilio fit.

De Panico.

CAP. CVIII.

p Anicum frumentaceis seminibus annumeratur, milio simile. Eodemq; modo in panes subigitur. Eisdem habet vsus. Minus tamen & nutrit & stringit.

De Sefama.

CAP. CIX.

f Esama stomacho iutilis cibus. Halitus grauitatē facit, quoties inter mandendū, commissuris dentium inhæsit. Nervorum crassitiē illitu discutit. Medetur auribus fractis, ambustis, inflammationibus, coli doloribus, & cerastæ moribus. Capitis dolores qui æstuatione concitantur, ex rosaceo lenit. Eadē efficit hæba decocta in vino. Præsertim inflammationibus oculorum, doloribusq; prodest. Ex ea fit oleum quo ægyptij vtuntur.

De Lolio.

CAP. CX.

l Olum quod inter segetes nascitur, molitum, illitu nomas, vetera vlcera, gangrænasq; emarginat. Sanat cum raphanis, sale & aceto, feros lichenas. Et ex aceto & sulphure viuo, lepras. Strumas quoq; discutit, cum fimo columbino & lini semine decoctum in vino. Abscessus etiam rumpit, qui ægrius ad coctionem perducuntur. Decoctum ex aqua mulsa vtilissime ischiadicis illinitur. Si cum polenta, thure, myrrha, aut croco suffiatur, conceptionem adiuuat.

De Amylo.

CAP. CXI.

a Mylum ex eo appellatum est q; sine mola fiat. Optimum ex trimestri, natione creticum aut ægyptium. Ratio faciendi amyli hæc est. Purgatum trimestre triticum madescit quinque dies in die, & si fieri potest nocte. Cum emollitum fuerit, effunditur sensim sine agitatione aqua, quo minus cremoris dulcedo vna excludatur. Vbi molliissimum esse videtur, mutata aqua pedibus calcari oportet. Rursus infusa, teri. Tum demum enatantes ibi surfures incerniculo eximēdi. Reliquūq; quallo sportisq; siccātū tegulis nouis cōfestim torreatur flagrantissimo in sole. Nāq; si paulisper vdu maneat, acorē concipit. Cōtra fluxiones oculorū, pustulas, cauaq; efficax est.

f. iij.

DE MEDICINALI MATERIA

Sanguinis reiectiones potu cohibet. Exasperatas fauces lenit. Lacti atq; obsonijs amimiscetur. Fit etiam amyllum ex zea, quæ maceratur, ac eluitur vno aut altero die, & farinæ modo manibus subigitur. Prefaqa feruentissimo in sole, vt ante retulimus, exiccatur. Nullius in medicina vsus. Ad alia tamen conueniens.

De Fœni græci farina. CAP. CXII.

g Ræci Telin, alij Carpon, alij Buceras, alij Aegoceras. Latini fœnum græcū appellant, Aegyptij itasin. Vis farinæ est mollire, dissipare. In aqua multa decocta aduersus tam internas, quam externas inflammationes, efficaciter illinitur. Lienem cum aceto & nitro trita extenuat. Succus decocti eius fœminarum malis subuenit, & siue tumor, siue præclusio sit vuluæ, fouentur, & insident. Decocti cremor, capillos, furfures, & manantia capitis vlcera purgat. Locos laxat & emollit, si cum anserino adipe pessi vice subijciatur. Viride cum aceto vtilissimum imbecillis partibus, & vlcera sentientibus. Decoctum eius prodest aduersus tenesmos fœtidamq; dysentericorum proluuiem. Oleum quod ex eo exprimitur, ex myrto, capillos et genitalium cicatrices absterget.

De Lino. CAP. CXIII.

l Inum aliqui linocalamin vocant, alij annon, alij linon agrion, Romani linum, Pœni zeraphoes. Vulgo notum est. Cuius semen easdem quas fœnum græcum vires habet. Discutit & emollit omnem intus forisq; inflammationem, cum melle, oleo, exiguaq; aqua decoctum, aut melle cocto exceptum. Vitia cutis in facie varosq; crudum tollit. Illitum cum nitro & ficulneo cinere, parotidas duriciasq; discutit. Vlcerata quæ serpunt, fauosq; cum vino decoctum expurgat. Vngues scabros eximit, cum pari modo nasturcij & mellis. Vitia pectoris extrahit, si ex melle in eclegmatidis vicem substituatur. Tussim lenit. Venerem stimulat, si farina piperis & melle exceptum, pro placenta largius adsumatur. Huius decoctum interaneorum vuluæq; erosionibus immittitur. Alui excrementa euocat. Ad vuluæ inflammationes in desessionibus perquam vtile.

De Cicere. CAP. CXIIII.

c Icer satium aluo idoneum est. Vrinam ciet. Inflationē parit. Colorem commendat. Menfes ac partus expellit. Lac auget. Cum eruo decoctum illinitur ad inflammationes testi-

um, verrucosas informicationes, ad scabiem, vlcera capitis manantia, impetiginesq;. Contra carcinomata, & vlcera quæ cacoethe vocantur, cum melle & hordeo prodest. Alterum genus arietinum nominatur. Vtrumq; cit vrinas, dato cum rore marino, hydropicis aut regio morbo laborantibus eorum decocto. Lædunt ea exulceratam vesicam & renes. In verrucarum formicantium pensiliumq; genere, prima luna singulis granis singulas tangunt, eaq; grana lintheolo deligata abijci post se præcipiunt. Ira decidere eas arbitrantur. Sylvestre cicer, folijs satiuo simile est, odore acris. Sed semine discrepat. Idè quod satium præstat.

De Faba.

CAP.

CXV.

faba inflationē excitat. Aegre cōcoquitur. Tumultuosa somnia facit. Tussi cōfert. Carnem gignit, media calidi frigidiq; natura. Decocta in posca, & cum suo cortice esitata, dysenterias & celiacorum profluvia sistit. Contra vomitiones conuenienter manditur. Inflatio leuior contrahitur, si aqua prior inter coquendum abijciatur. Viridis plus negocij stomacho exhibet, maioremq; flatum parit. Lomentū eius & per se, & cū polēta illitū, inflammationes quas vulnus excitauit, mitigat. Cicatrices concolores facit. Turgentes præduræq; mammas, etiam si inflammatione tētentur, adiuuat. Lac reslinguit. Furunculos, sugillata, parotidasq;, cum fœnigræci farina & melle discutit. Cum rosa autem, thure & oui candido, procidētes oculos, tumores, vnasq;, reprimit. Subactū vino, suffusos ictu oculos recreat. Manducata sine cortice faba, ad auertēdas fluctiones, fronti illinitur. Decocta in vino testium collectiones sanat. Quo tardius pubes erumpat, pueris imo ventri illinitur. Vitiliginem purgat. Fabarum cortice illiti capilli, qui post euulsionem renascūtur, gracilescūt, & minus alimenti capescunt. Cum polenta scisso alumine & vetere oleo impositi cortices, strumas discutunt. Decocto earum lanæ inficiūtur. Faba dempto cortice in illas parteis diuisa, in quas suapte natura scinditur, imponi solet sanguinis defluctionibus ab hirudine concitatis. Namq; eas suppressit, si semisecta apprimatur.

De Faba ægyptia.

CAP.

CXVI.

Ægyptia faba, quam aliqui ponticam vocant, in ægypto plerumq; provenit. In Asiæ etiā Siciliaq; lacubus, iuenitur. Folia habet ampla, etiam si ad arborum frondes comparentur, caulem cubitalem, digiti crassitudine, florem roseum, dupla papaueris apertitudine. Et vbi flore exiit, fert folliculos loculis similes, in quibus faba supra operculū bullæ modo prominet. Cibotium ideo nominant, id est arculam, quoniam seratur ipsa, humenti glebæ mandata, &

f. iiii.

DE MEDICINALI MATERIA

ita in aquam demissa. Radice firmatur harundine crassiore, quæ cruda coctave estur. Ei collocasiæ nomē est. Faba virens manditur, & exicata nigrescit. Græcam magnitudine superat. Adstringendi facultatem obtinet, & stomacho vtilem. Dysentericis cæliacisq; prodest, in sparso polentæ vice lomento. Datur quoq; in pulte. Cortices in vino mulso decocti, si terniq; inde cyathi bibantur, magis proficient. Facit ad aurium dolorem, quod in earum medio viride spectatur, gustu amarum, si tritum & cum rosaceo coctum instilletur.

De Lente.

CAP. CXVII.

1 Ens suo cibo aciem oculorū obtundit. Aegre concoquitur. Stomachū male habet. Eūq; & intestina inflat. Sed aluū cū cortice cocta sistit. Præstat in cibo, quæ facillime coquitur, nihil atri in maceratione reddens. Vim habet adstringendi. Qua ex causa aluū cohibet, si detracto antea cortice discoquatur accurate, priusq; aqua inter coquendū effundatur. Quippe primū id decoctū ventrem resoluit. Somnia tumultuosa excitat. Capiti, nervis, ac pulmōni inutilis. Melius suo fungetur munere cōtra alui fluxiones, addito cū aceto intybo, aut portulaca, aut beta nigra, aut baccis myrti, aut putamine punici, aut aridis rosis, aut mespilis, sorbisve, pyris thebanis, aut malis cotoneis, aut cichorio, aut plātagine, aut gallis itegris, quæ post decoctionem abijciuntur, vel vuarum rhois quæ obsonijs insparguntur. Verum acetum cum eo diligenter percoqui debet, alias aluum conturbat. Contra subuersionem stomachi, triginta grana lētis delibata deuorari proderit. Decocta cum polēta & illita podagras lenit. Sinus cum melle glutinat. Crustas rumpit. Vlcera purgat. Decocta in aceto duricias & strumas discutit. Cum cotoneo aut meliloto medetur inflammationibus oculorum, sedisq; addito rosaceo. Sed in amplo sinu aut inflammationibus sedis, quæ maius remedium exigūt, cum putamine punici ac ficcis rosis, adiecto melle decoquitur. Nomis quæ in gangrænam euaserunt, adiūcta maris aqua, pustulis, & his quæ serpūt, igni sacro, pernionibusq; vt antea dictum est. Contra, turgentes māsas & vsq; eo duras vt quamdam cartilaginis speciem referant, cocta in aqua maris & illita auxiliatur.

De Phasiolis.

CAP. CXVIII.

p Phasioli inflant. Spiritus ciēt. Aegre coquuntur. Virides cibo aluum emolliunt, ad vomitiones idonei.

De Eruo.

CAP. CXIX.

c Ruū paruus frutex omnibus cognitus, angustofolio, tenuis, semina in valvulis habēs, e quibus farina fit nomine eruina, ad multos medēdi vsus conueniens. Eruum capiti onerosum

est. Aluum esu turbat. Sanguinem per vrinam extrahit. Elixo boues saginantur. Paranda farina ratio hæc est. Vberiora grana cādidāq; deliguntur, permiscendoq; aqua resperguntur, donec sufficienter combibant. Postea torrentur, vsq; dū hians cortex disrumpatur. Molitaq; farinario cribro incernuntur. Postremo farina reconditur. Hæc aluo utilis est. Vrinam ciet. Meliorem colorem efficit. Sāguinem per vesicam aut aluū cū torminibus elicit, si largius in cibo aut potu assumatur. Vlcera cum melle purgat. Lentigines & vitia cutis in facie, & maculas, totumq; corpus emēdat. Nomas, gangrænas, duriciasq; serpere non patitur. Mammarum duricias emollit. Atra vlcera quæ theriomata vocant, fauosq; emarginat. Carbunculos rumpit. Cum vino illitum moribus viperarum, canum, hominumq; medetur. Vrinæ difficultates, tenesmosq; ex aceto mitigat. Tabidis, qui alimentum non sentiunt, tostum, & in nucis magnitudinem melle collectum, conuenit. Eius decoctum perniones, & pruritus in toto corpore, sanat fouendo.

De Lupinis

CAP. CXX.

Atius lupinus notus est. Cuius farina cum melle delinctu. aut potu, vētris animalia expellit. Ipsi quoq; macerati, & cū sua amaritudine esitati eadē efficiunt. Decoctū eorū idē munus præstat, cū ruta & pipere potū. Quare lienosis prodest. Eodē vlcera tetra quæ theriomata vocant, gangrænas, incipientē scabiē, eruptiones pustularū, vlcera in capite manātia, vitiligines, maculasq; fouere vtilissimū. Menses & partus extrahit, cū myrrha & melle subditum in vellere. Eorum farina cutem liuoresq; corrigit. Inflammationes cū polenta & aqua mitigat. Tubercula, & coxendicū cruciatus, ex aceto lenit. Strumas in aceto cocta illitaq; dissipat. Carbunculos rumpit. Decocti cœlesti aqua, donec in liquamenti crassiciem redigantur, faciē abstergunt. Medentur pecorum scabiei, cum radice nigri chamaeleontis, ita vt tepēte decocto abluantur. Cit vrinam radix cū aqua cocta. Lupini triti, vbi maceratu dulcescere cœperit, cū aceto poti, fastidium detrahunt, & cibi auiditatē faciūt. Gignuntur & sylvestres lupini satiuus similes, sed omnino minores, qui eadem quæ satiuus possunt.

De Rapo.

CAP. CXXI.

Decocta rapi radix alit. Inflationem parit. Mollesq; spongiosasq; carnes creat. Venerem stimulat. Decocto podagræ, pernionesq; fouentur. Contritoq; rapo atq; imposto iuuantur. Si excauata radici rosaceum cæratum adigatur, & feruenti cinere eliquescat, exulceratis, pernionibus proficiet. Asparagi eius decocti esu,

DE MEDICINALI MATERIA

vrinam ciunt. Semen antidotis & theriacis, præsertim quæ sensum doloris auferunt, anodyna vocant, idoneum est. Potum contra venena salutare est. Venerem concitat. Muria conditum, minus alimenti sufficit. Sed multo magis appetitiam recreat. Sylvestre rapum in aruis nascitur, fruticosum, in cubiti altitudinē assurgēs, ramosum, læue. In cacumine folia fert læuia, digitali latitudine, aut maiora, & fructū in filiquis calyculatis. Cumq; pulpæ aperiuntur, alia intus filiqua spectatur, quæ quandā capitis speciem præbet. In qua semina paruula concipiuntur, foris nigra, intus alba. Additur in medicamenta quibus ad detergendam cutem in facie, totoq; corpore, vtimur, præsertim quæ ex lupini aut erui, tritici aut lolij farina, fieri solent.

De Buniade napo. CAP. XXII.

Octa buniadis napi radix inflat. Modicum alit. Semen eius potum venenorum vires heberat. Antidotis ammiscetur. Conditur sale radix.

De Radice. CAP. CXXIII.

Aphanus latine radix dicitur. Excalfacit. Flatus gignit. Ori suavis est. Sed stomacho aduersatur. Ructus ciēt. Vrinā pellit. Aluo aptior. Summo tamen cibo sumi debet, quo magis eius distributionem adiuet. Cum autem præsumitur, cibum subleuat. Quare vomituris commodissime datur, ante cibum. Sensuum aciem excitat. Decocta contra veterem tussim, & pituitæ crassitiem in pectore, efficax est. Cortex ex aceto mulso, celerius vomitiones mouet. Hydropicis commodissime illinitur. Lienosis utilis. Sugillata cum melle tollit. Contra viperarum ictus auxiliatur. Alopecias ad pilum reducit. Lentigines cum loliacea farina emendat. His qui fungis strangulantur, tam cibo q̃ potu salutaris est. Semē vomitiones facit. Vrinam mouet. Menses ciēt. Lienem extenuat. Cum aceto potū gangranas validissime emerginat. Coctum cum aceto mulso, anginis perq̃ vtiliter gargarizatur. Contra cerastis morsus, potum ex vino auxilio est. Sylvestris raphanus quam Romani Armoraciam vocāt, alij montanum raphanum, alij apium, alij iscada, alij chamæbalanum, Romani etiam radicem sylvestrē, ramulos tenues iunceos duos siue tres spargit, rubentes, folijs rutæ, sylvestris, oblongioribus, & angustioribus, semine paruo, radice albuci, rotundiore, turbinatiore pyri figura, candido cortice. Ea lacteo succo madet. Pars radicis superior vomitione, bilē pituitamq; extrahit, inferior per aluum. Tota susq; deq; purgationes mouet. Quod si tibi in animo est succū extrahere, radix tusa in fidili mergitur, & qui supernatat succus pinna eximitur. Is sesquibolo potus, vtraq; parte purgat.

De Syluestri raphano. CAP. CXXIIII.

Syluestris raphani quam Romani Armoraciam vocant, folia satiuo similia, & quadamtenus lampsanam imitantur. Radix gracilis, tenera, subacris. Tam folium q̄ radix in olera recipitur. Excalfacit. Vrinam concitat, æstuosus.

De Sisaro. CAP. CXXV.

Isarum vulgo cognitum. Cuius radix decocta ori grata est, & stomacho utilis. Vrinam ciet. Et appetentiam inuitat.

De Lapatho et rumice. CAP. CXXVI.

Generibus lapathi, oxylapathum vocant quod in acutum tendit, prædura habens extrema, non nisi in palustribus nascens. Aliud est satiuum, illi dissimile. Tertium syluestre, paruum, plantagini proximum, humile & tenerum. Quartum genus est quod alij oxalida, alij anaxyrida, aut lapathon vocant, syluestri ac exiguo rumici simile, caule non magno, semine subacuto, rubente, acri, in caule, & agnatis appendicibus, emicante. Omnium decocto olere alius emollitur. Crudi illitu, melicerides temporis tractu discutiuntur. Syluestris & oxilapathi, & eius quæ oxalida nominat, semen ex aqua aut vino vtiliter bibitur, contra dysenterias, & celiacorum affectus, stomachi fastidia, scorpionum ictus. Quod si quis in potu præsumat, nihil molesti ex ictu patietur. Radices ex aceto coctæ, aut illitæ crudæ, lepras, impetigines, & scabrosos vngues persanant. Sed antea locus aceto & nitro in sole perfricandus est. Pruritus corporis, decoctum earum sedat, si foueatur, aut in solijs balnearum cõfricetur. Coctæ in vino & instillatæ, aurium dentiumq; dolorem mulcent. Strumas parotidasq; discutiunt. Lienem cum aceto extenuant. Aliqui amoliendis strumis radicum gestamine vtuntur, eas collo appendentes. Tritæ & inditæ fœminarum profluuia sistunt. Cum vino autem potæ, regio morbo mendentur. Calculos vesicæ cõminuunt. Menses cient. Scorpionum ictibus auxiliantur.

De Lampšana. CAP. CXXVII.

Lampšana quod Romani napiũ vocant, syluestre olus est. Plus alit q̄ rumex, et stomacho vtilius. Cuius folia caulesq; coquuntur in cibo.

De Hyppolapatho. CAP. CXXVIII.

Hyppolapathon olus est magnum, in paludibus nascens. Eadem habet vires quas supradicta rumicis genera.

De Bunio napi genere. CAP. CXXIX.

Bunio alij adtiuum vocant, alij Anemosphoron, magi paradachry, Aegyptij erxonē, Romani Scopā regiam, Aphri

DE MEDICINALI MATERIA

zigar, aut tempso. Caulem emittit quadrangulum & in eo foliosos ramulos, tenues, prætenuibus foliolis & flosculis scærentes, longitudine digitali, folia propter radicem, apio similia, sed multo tenuiora, & quæ modo quodam folia tribuli imitentur. Flores anethi, semen odoratum, minus Hyoscyamo. Excalfacit bunion. Vrinam ciet. Secundas detrahit. Lienî, renibus, & vesicæ vtile. Eo humenti aridove vtuntur, ex empto radice & caulibus succo, ex aqua mulsa.

De Blitto. CAP. CXXX.

b Litton ægyptij echlotoripam appellât, alij triplam. Romani blitû, Daci bles. Olus est aluo vtile, nullius in medicina momenti.

De Maluâ. CAP. CXXXI.

m Aluam hortensiam pythagoras Antena vocauit, zoroastres diadema, ægyptij cochortem, magi lienem capræ, aut muris vrinam. Satiua est, longe aptior syluestri. Stomacho aduersatur. Aluum iuuat, sed multo magis caules. Interaneis & vesicæ utilis. Cruda folia cum salis exiguo mâducata, ægylo pas ex melle sanât. Verum cum cicatricem trahere cœperint, ea demum citra salem vtedum est. Contra aculeatos apium vespærumq; ictus, illita efficax est. Ea demum cum oleo trita peruncti, non feriuntur. Vlcerâ manantiâ in capite, furfuresq; cum vrina sanat. Sacris ignibus & ambustis decocta folia, tria q; vtilissime ex oleo imponuntur. Eius decoctum vulvas in sessione molliat. Prodest erosionibus vesicæ, & intestinorû, vuluæ, sedisq; clystere infusum. Ius decoctæ cum radice sua contra omnia venena auxiliatur, si continuo a bibentibus reuomatur. Contra phalagiorum morsus remedio est. Lac euocat. Semen in vino potum, addito loti syluestris semine, vesicæ cruciatus lenit.

De Attriplice. CAP. CXXXII.

a Traphaxin aliqui Chrysolachanon vocant, Romani attriplicem, Aegyptij Ochi. Cognitum olus est. Duo eius genera, Syluestre & satium. Coctum est ut olus. Aluum molliat. Panos discutit, siue crudum siue coctum illinatur. Semen cum aqua mulsa potum, regium morbum sanat.

De Brassica. CAP. CXXXIII.

c Ramben Romani brassicâ vocant, Ea aluo est idonea, si modo leuiter feruescenda edatur. Nam percocta aluum fistit. Sed multo magis bis cocta, aut quæ in lixiuio coquitur. Stomachum autem male habet. Acrior est æstiuâ. In ægypto propter amaritudinem non estur. Cæcutientibus, & tremulis esse prodest. Summo cibo sumpta crapulam discutit, & vini noxam restinguit. Melior sto-

macho cyma, sed acrior, & ad ciendum vrinam validior. Ea condita stomacho inimica est. Aluum conturbat. Crudus succus cum nitro & iri deuoratus, aluum emollit. Cum vino quoq; epotus viperarum moribus auxiliatur. Cum fœnogræci farina, podagris & articulorum vitijs illinitur. Prodest & sordidis vlceribus, & vetustis, illitus. Caput purgat naribus infusus. Menses extrahit cum loliacea facina inditus. Folia per sese aut cum polenta trita, conferunt inflammationibus, tumoribusq;. Epinyctidas, ignem sacrum, leprasq; sanant. Carbunculos ex sale rumpunt. Fluentes capillos retinent. Cocta addito melle aduersus depascentia vlcera, gangrænasq; valent. Lienosisq;, ex aceto cruda profunt. Mansa deuorato succo, retusam vocem instaurant. Decoctū eius potu, aluum & menses ciet. Flos post conceptionem in pello subditus, partus spem adimit. Semen eius præsertim, quæ in ægypto nascitur, potum tineas repellit. In antidota cœliacorum additur. Faciei cutem lentiginefq; expurgat. Virentes cauliculi cum radice cremati, & adipe porci vetusto excepti, diuturnos laterum dolores mitigant.

De Sylvestri brassica, CAP. CXXXIII.

Sylvestris brassica, quam Romani rusticam appellant, maritimis præruptisq; locis, magna ex parte gignitur. Satiuæ similis, sed candidior, hispidiorq;, amara. Cuius cyma in lixiuio cocta, ori non insuauis. Folia illitu vulnera cōglutinant. Et inflammationes tumoresq; discutiunt.

Ee Brassica marina. CAP. CXXXV.

Arina brassica a satiuâ prorsus abhorret, q; folia ferat rotundæ Aristolochiæ, prælonga, tenuia. Singula a ramulis rubentibus exeunt, singulari vt hædera stillo. Habet lacteum succum, sed paucum, salso gustu, & aliquantum amaro, pingui compage. Hæba in rotum stomacho inimica, acris. Vehementissime aluū ciet, in cibo cocta. Coquitur propter acrimoniam cum pingui carne.

De Beta. CAP. CXXXVI.

Beta duorū generum est, e quibus nigra coquitur cū lenticula, vt vētrem sistat. Quod magis radice eius præstatur. Candida aluo utilis est. Vtraq; tamen propter nitrosum humorem quem habet in se, noxijs succi est. Vnde succus earum, cum mellena ribus inditus, caput purgat. Auriū doloribus auxiliatur. Decoctum radices & foliorum, surfures lētesq; deterget. Perniones fotu mitigat. Crudis folijs vitilignes nitro antea perfritas, alopeciarum inanitates, atq; depascentia vlcera, illini prodest. Eruptionibus papularum, igni sacro, ambustisq;, cocta medetur.

DE MEDICINALI MATERIA

De Portulaca sylvestri. CAP. CXXXVII.

ylvestris portulaca quam aliqui Aizoon sylvestre vocāt, alij
f Telephion, Romani illecebram, alij portulacam, Aphri
mœmoen, Daci lax, Aegyptij mochmutim, folijs pusillis,
ad satiuā accedētibus, hirsutis, latioribus. Nascitur in petrosis. Non
nunq̃ in hortis. Folia oleæ habet, minora multo, plura & tenera, rubē
tes cauliculos, ex vna radice multos, in terra sessiles, qui manducati
bonum succum pariunt, viscosi, & aliquantum salsi. Vis ei excalfacto
ria, acris, exulcerans. Discutit strumas cum axungia illita.

De Portulaca. CAP. CXXXVIII.

Ortulacæ vis adstringit. Capitis doloribus, inflammationi
p bus oculorum, cæterisq̃, cum polēta imponitur. Ardoribus
stomachi, sacro igni, vesicæ doloribus, auxilio est. Comman
ducata, dentium stupores sedat. Stomachi & intestinorum æstuat
nem, fluctionesq̃ mulcet. Renes & vesicā adiuuat, etiā si erosionē sen
tiant. Veneris impetus exoluit. Succus epotus simili effectu prodest,
in febribus valens. Contra teretes ventris tinea, cruentā excreatio
nē, dysenteria, hæmorrhoidas, & profluvia sanguinis, percocta efficac
est. Item contra sepius morsus. Ocularibus medicamentis vtilissime
commiscetur. Interaneis fluctione laborātibus, atq̃ vuluarum erosio
nibus, infunditur. Contra dolores, quos æstus excitauit, caput ex ro
saceo & oleo fouetur. Eruptiones papularum in capite, cum vino emē
dat. Vulneribus quæ ad syderationem spectant, ex polenta illinitur.

De Asparagis. CAP. CXXXIX.

Sparagus, quem aliqui Petreon, alij Myacantham, alij My
a on vocant, vulgo notus est. Huius cauliculi in cibo, vētrem
emolliunt. Vrinam cient. Radicis decoctū contra vrinæ dif
ficultatem, regiū morbum, renum vitia, & coxendicum cruciatus, in
potu proficit. Cum vino autem phalangiorum moribus auxiliatur.
Si decocti succus super dente contineatur, eius dolori medetur. Semen
ad eadem valet. Canes vt aiunt, si decoctum bibant, emoriūtur. Aspa
ragum etiam nasci prodiderunt, arietis cornibus cōtulis, atq̃ defossis.
Quod quantum equidem sentio, plane a veritate abhorret. Is tamen
Asparagus multis ramis fruticat, folijs fœniculi, numerosis, radice ro
tunda, grandi, tuber habēte. Huius teneri cauliculi triti in vino albo,
renum dolores sedant. Assus autem coctusve, vrinæ stillicidium, diffi
cultatemq̃, ac dysenterias, mitigat. Radix cū vino aut aceto cocta, lu
xatos artus mulcet. Cum ficis aut ciceribus sumpta, regiū morbum
sanat. Coxēdicis cruciatus stranguriāq̃ leuat. Alligata radix, aut hau
stum eius decoctum, conceptum adimit, & sterilitatem adfert.

48

CXL.

Adrianus Jundell p. pl. rari
nis in p. a. calambur. 18.

CXLI.

f

DE MEDICINALI MATERIA

sed minoribus, & odoratis. Quæ cruda cocta q̃ esu, calculos rumpunt, atq̃ excernunt. Vrinæ cient. Menses & partus extrahunt. Dysentericis in cibo auxiliantur. De Sio Crateuas tradit, hærbam esse fruticis specie, pauca folia ferentem, rotunda, maiora q̃ mentæ, nigra & ad erucam accedentia.

De Sifymbrio. CAP. CXLII.

f Ifymbriion alij serpyllum vocant, alij veneris coronam, Romani veneriam, aut eusteralem. In solo inculto nascitur, mentæ hortensis similitudine, odoratius, latiore folio. Inferitur coronis. Calfaciendi vim habet. Contra stillicidia vrinæ, calculosq̃, semen ex vino bibitur. Tormina & singultus sedat. Folia in capitis dolore, fronti aut temporibus illinuntur. Item cōtra vesparum apiumq̃ ictus. Vomitiones potu cohibet.

De Altero Sifymbrio. CAP. CXLIII.

a Lterum sifymbrij genus, quod aliqui cardaminam, alij Sion appellât. Ea hærbæ riguis gaudet, & eisdem in locis, quibus Sion, prouenit. Quæ ideo nōnullis cardamina nominatur, q̃ gustu cardamum, idest nasturcium repræsentet. Folia primum rotunda prodeunt. Adulta erucæ modo finduntur. Id ex calfacit. Vrinæ mouet. Crudū estur. Purgat lentigines, cutisq̃ vitia in facie, noctibus impositum, matutinisq̃ detractum.

De Crithmo. CAP. CXLIIII.

c Rithmum, seu potius vt aliqui Crithamon, fruticosa hærbula est, cubiti altitudinem petens. Nascitur in maritimis, & petrosis, folijs pinguibus, numerosis, albicantibus, veluti portulacæ, crassioribus, & lōgioribus, salso gustu. Flores candidi sunt. & semen ceu rorisinarini, odoratū, molle, rotūdum, quod siccātū rumpitur. Habet intus semē ruffum, radices digiti crassitudine, tres aut quatuor, grati odoris & iucundi. Radix, semen, & folia in cocta vino, potu vrinæ difficultati & regio morbo auxiliantur. Menses cient. Estur crudum coctumve in holere. Seruatur etiam in muria.

De Corōnopo. CAP. CXLV.

c Oronopus aliquibus Ammonos, alijs Astriō, Pœnis Atir fitte, Romanis Caciatrix, alijs Stilago, alijs Sanguinaria dicitur. Oblonga hærbula est per terram repēs, fissis folijs. Coquitur in holere. Radicem habet tenuem, adstringentem, quæ in cibo cœliacis facit. Prouenit in semitis, iuxta domicilia, & locis incultis.

De Cicerbita seu Soncho. CAP. CXLVI.

f Onchon asperum aliqui Cichorium vocant, Romani Cicerbitam asperam, Aphri gathonem. Huius duo genera. Sylue

strior magis spinis horret. Alter teneritate quadā mollescit, cibis ex-
petitus, anguloso caule, interdum rubicante, folijs in ambitu per inter-
ualla dissectis. Vtriusq; vis refrigerat. Modice adstringit. Vnde æstu-
anti stomacho & inflammationibus illiti profunt. Succus eorum sto-
machi rosiones sorbitione mitigat. Lac elicit. In vellere appositus, se-
dis ac vuluæ collectionibus opitulatur. Tam hærba quam radix illi-
ta vibratis a scorpione & tibus subuenit. Alter sonchus tenerior, arbor-
is instar, latis constans folijs. Eum qui ramos habet, folia distinguunt.
Sed ad eadem pollet.

De Intubo & seti.

CAP. CXLVII.

Atrium Serin alij Picrida appellant, Aegyptij Agon, Ro-
mani intubum. Duum generum est. Altera sylvestris, quæ pi-
cris & cichorion vocatur. Altera latioribus folijs constat.
Stomacho q̄ hortensia vtilior. Quæ iterū in duas species digeritur. Vna
folio latiore prodit, lactucarū simillima. Altera angustiore est folio, &
gustu amara. Vtraq; refrigerat & adstringit. Stomacho vtilissima. Al-
uum fistit cocta, si cū aceto adsumatur. Sylvestres stomacho meliores.
Quandoquidē æstuantē ipsum, & quē imbecillitas vexet, leniūt. Car-
diacis per se, aut cū polenta, vtiliter illinuntur. Podagris & oculorū
inflammationibus auxilio sunt. Hærba cum radice illita, percussis a
scorpione subuenit. Igni sacro cum polenta medetur. Succus cum ce-
russa & aceto valet ad illitus eorum quæ refrigerationem desyderant.

De Condrilla.

CAP. CXLVIII.

Ondrilla, quam aliqui cichorion, alij Serin appellant, cau-
lem, flores, & folia habet cichorio similia. Quæ ex causa non
nulli sylvestris intubi speciē esse pronunciarūt. Verū tenuior
tota est, in cuius ramulis, gummi mastices simillimū, tuberculo fabæ
inueniri solet. Quod cum myrrha tritum, & linteo appositum instar
oliuæ, sœminarum menses trahit. Tusa cum radicibus tota, adiecto
melle, diuiditur in pastillos, qui nitro ammissi vitilignes emaculant.
Gummi inordinatos pilos replicat. Quod item tenera radix efficit,
si intincta succo acus, pilis admoueatur. Contra viperas in vino pota
proficit. Succus decoctæ, in vino, aut per sese potus, aluum fistit. Ali-
ud habetur condrillæ genus, folium ferens oblongum, circumrosū,
humi sparsum, caulem succo madentem lacteo. Radice tenui, rotun-
da, leui, vegeta, flauescēte, succosa. Cuius & caulis & folia cōcoquens
di vim habent. Succus incommodos palpebrarum pilos reflectit. Na-
scitur in latis & cultis.

g. j.

DE MEDICINALI MATERIA

De Cucurbita. CAP. CXLIX.

Cucurbita esui apta. Cruda illitu tumores & abscessus mitigat. Ramenta eius infantibus contra capitis ardorem, quæ syriam fin vocant, in sincipite illinuntur. Oculorum inflammationes podagraeque refrigerant. Succus e ramentis tuis per se, aut cum rosaceo infusus, aurium doloribus auxiliatur. Aduisiones cutis illitu adiuvat. Totius feruescentis & expressæ succus, cum melle exiguo & nitro potus, alium leniter resoluit. Vinum in cucurbitam recentem excavatam infusum, si mistum sub diuo teneatur, potu aluum laeuigabit.

De Cucumere satiuo. CAP. CL.

Fatiuus cucumis aluo & stomacho perquam utilis habetur. Refrigerat, qui corruptionem non sentit. Vesicæ prodest. Olfactu reuocat, quos animus liquerit. Semine modice urinam mouet. Cum lacte aut passo vesicæ exulcerationibus subuenit. Illita cum vino folia morsus canum sanant, & epiphyridas cum melle.

De Pepone. CAP. CLI.

Peponis caro in cibis, urinam cit. Inflammationes oculorum illita sedat. Ramenta eius contra aduersionem infantium, quæ syriam vocant, sincipiti imponuntur. Fronti ad mota oculorum fluctationes auertunt. Succus cum semine, adiecta farina, siccatus in sole cogitur in smegmata, quæ faciem repurgant & nitorem afferunt. Radix sicca, & ex hydromelite pota drachmæ pondere, vomitionem mouet. Si quisque moderate secundam cenam vomere cupiat, geminis obolis sit contentus. Sanat quoque illira cum melle, vlcera concretæ in modum faui quæ caria vocantur.

De Lactucis. CAP. CLII.

Lactuca satiuæ, quibus natura refrigeratrix inest, stomacho gratæ habentur. Somnum conciliant. Aluum emolliunt. Lac euocant. Verum decoctæ magis alunt. Stomachicis illotas esse prodest. Epotum semen, assiduas libidinum imaginationes in somno, compescit. Et veneri refragatur. Frequetiores tamen in cibo, claritati oculorum officiant. Muria condiuntur. Cum in caule exierunt, vim quandam nanciscuntur, succo aut lacti sylvestris lactucæ similem.

De Lactuca sylvestri. CAP. CLIII.

Fylvestris lactuca, quam magis sanguinem Titani, Zoroastres Phereombion, Romani Lactucam sylvestrem appellant. Satiuæ similis est, sed longior caulis, & candidiora folia, graciliora, & asperiora. Amaro gustu est, & viribus aliquantum papaueris similis. Unde lacteum eius succum aliqui meconio permiscuerunt. Aquam per aluum elicit, potus in aceto mulso succus ad duos obolos. Argema caliginemque repurgat.

LIBER SECVNDVS

50

Contra adustiones efficaciter illinitur, cum lacte mulierum. In summa somnum allicit. Doloris leuamentum præstat. Menses trahit. Contra scorpionū & phalāgiorum ictus bibitur. Semē nō aliter q̄ satiuā, libidinum imaginationes in somno amolitur, ac venerē arcet. Succus ad eadem valet, sed viribus infirmior. Reponitur in fictili nouo laccius, antea, vt in alijs liquaminibus moris est, insolatum.

De Gingidio. CAP. CLIIII.

Ingidiū aliqui lepidion, Romani bifacutū, Aegyptij dorysa
g trū, Syri Adoriū, Aphri Tiriſta appellāt. In Syria & Cilicia plerūq̄ nascitur. Hærbula syluestri pastinacæ similis, tenuior, & amarior, radice parua, cādicāte, subamara. Olus hoc crudū, coctū, cōditūve estur magna stomachi vtilitate. Vrinā cit. Decoctū ex vino potū vesicæ prodest.

De Scādice. CAP. CLV.

Candix, quā Romani hærbā scanariā, aut aculā nomināt, syluestre olus est, amarū, subacre. Quod crudū coctūve mādatur. Stomacho & ventri vtile, Decoctū in potu, vesicæ, renibus & iocineri confert.

De Gallinaceo pede ceu caucalide. CAP. CLVI.

c Aucalis quam alij Caucū, alij syluestre daucun, alij myitin, Democritus Brion, Romani pedē gallinacē, aut pedē pulli, ægyptij sefelin vocant, cauliculo est dodrantali, aut maiore, hirsuto, folijs apio similibus, sceniculi modo per extrema multifidis, hispidisq̄, candida in cacumine umbella, suauiter olente. Crudum coctūve olus estur. Vrinā mouet.

De Eruca CAP. CLVII.

Vzomon Romani Erucam vocant, ægyptij Ethericē, pœni
e asuric. Cruda eruca venerē largiore cibo concitat. Semen eodem effectu prodest. Vrinā cit. Aluo perq̄ cōmodata. Semine ad condimēta vtuntur, quod vti in longū tēpus asseruetur, adiecto lacte aut aceto, digerunt in pastillos. Gignitur etiamnū syluestris eruca, maxime in iberia, quæ occidentē spectat. Cuius semine pro sinapi incolæ vtuntur. Vrinam vehementius pellit, multo satiuā acrior.

De Ocimo. CAP. CLVIII.

Cimū vulgo cognitū. Id copiosiore cibo oculorū aciē hebetat. Aluū mollit. Spiritum mouet. Vrinā pellit. Lac euocat. Aegre tamē cōficitur. Illitū cū polline polentæ, aceto & rosaceo, pulmonū inflammationibus auxilio est. Draconis marini et scorpionis ictibus per se prodest, & cū vino chio oculorū doloribus. Succus visus caliginē abstergit. Destillationes exiccat. Semē potū cōuenit insaniētibus, difficili vrinæ, inflatisq̄. Naribus haustū subinde mouet sternutamēta. Quod idē hærbā efficit. Sed oculos premi necessum
g. ij.

DE MEDICINALI MATERIA

est, cū sternutamentū vrget. Sūt qui in cibis abdicādū cēseāt. Quādoqui dē māducatū, & in sole positū, vermiculos gignat. Aphri autē adijciunt, si feriātur a scorpione, qui Ocymū ederit, nullo cōflictari dolore.

De Orobanche. CAP. CLIX.

Robanchen, alij Cynomorion appellāt, a similitudine canini genitalis, Cyprij tyrfinen, cōmuniter lycon. Cauliculus est sesquipedalis & iterdū maior, subruber, hirsutus, tener, folio pingui, flore luteo, aut cādicāte, radice digiti crassitudine, & cum ariditate flaccescit caulis, fistulosa. Hāc inter legumina nasci cōstat, & ea strangulare. Vnde Orobanche sibi cognomētum vsurpauit. Estur ut olus cruda, & in patinis asparagi modo decocta. Legumentis addita, coctionē accelerare creditur.

De Barbula hirci. CAP. CLX.

Arbula hirci quæ ab alijs come vocatur, breui est caule, folijs croci, radice lōga, dulci, supina, magno super caulē calyce, & cuius summo semen nigrū depēdet. Vnde nomē inditū est, Hærbæ sui apta est.

De Ornithogalo. CAP. CLXI.

Ornithogalū cauliculus est tener, cādicās, tenuis, sesquipedalis, tribus aut quattuor in cacumine mollibus agnatis, a quibus flores prodeunt, foris hærbacei, & cū hiantes se pandunt lactei visuntur. Inter quos disectum ut milio capitulū emicat. Coquitur cū pane ut melanthiū. Radix bulbosa, cruda & cocta manditur.

De Tuberibus. CAP. CLXII.

Vbera rotundæ radices sunt, sine caule, sine folijs, flauescētes. Vere fodiuntur. Cruda & cocta eduntur.

De Smilace. CAP. CLXIII.

Ortenfia smilax frutex, cuius semen a nonnullis lobia vocatur. Folia habet hederæ, molliora tamen, tenues caules, & capriolos vicinis fruticibus circumuolutos, qui tantum adoleſcunt, ut topiarum quoddam tabernaculū effingere videātur. Fructū fœnigræci profert longiorē, & corpulentū, in quo semina renū similia sed inæquali colore recludūtur, quæ quadā ex parte fuluescūt. Fructus cū semine in oleribus asparagi modo māditur. Vrinā ciet, & tumultuosa somnia facit.

De Medica. CAP. CLXIII.

Medica cum recenter prodijt, folijs & caule trifolio pratenſi similis est. Procedens vero folia contrahit, caules edens trifolij, in quibus semen lendis magnitudine dependet. Quod in cornicula incuruatur. Id ficcātum iucundi saporis gratia, conditamento salis ammiscetur. Viride semē quibus refrigeratione opus est illitu suffragatur. Hærbæ tota pro gramine vtuntur, qui pecora alunt.

LIBER SECVNDVS

De Aphaca.

CAP.

CLXV.

a Phaca in aruis nascitur, altior lenticula, tenuioribus folijs. Siliquas maiores fert, in quibus terna quaternave semina, le-
te minora, continetur. Quæ adstringendi vim habet. Quare
torrefacta, stomachi aluiq; fluxiones sistunt, si fresa lentis more deco-
quantur.

De Porro capitato.

CAP.

CLXVI.

c Apitatū porrū inflationē facit. Noxiū succū creat. Tumul-
tuosum somnū parit. Vrinā ciet. Aluo accommodatur. Exte-
nuat. Oculorū aciē hebetat. Menses pellit. Sed lædit exulce-
ratam vesicā reneq;. Cū ptisana vero coctū esu pectoris vitia extra-
hit. Coma eius in aqua maris & aceto cocta, in deflectionibus, ad præ-
clusiones vuluæ & duricias, utilis habetur. Porrū bis aqua mutata co-
ctū, aut frigida maceratū, dulcescit, & multo minus inflat. Semē acrius
est, & quādam astringentiā vim habet. Quare succus cum aceto, addito
thure aut manna, sanguinis profluvia sistit, maxime si naribus erum-
pat. Venerē stimulat. Contra omnia thoracis vitia tabēq;, pro delin-
gu efficax est. Arteriā esu purgat. Sed si assidue estur, visus obscurita-
tem inducit. Stomacho aduersatur. Succus ex melle potus, aut illitus,
cōtra bestiarū morsus auxilio est. Cū aceto & thuris polline, lacte aut
rosaceo, vtiliter auriū doloribus & sonitui instillatur. Varos tollunt
folia illita cū vua rhois, qua ad obsonia vtuntur. Epinythidi medetur.
Crustas ex sale illita rūpunt. Veteres sanguinis reiectiones cohibent,
si binis drachmis & æquali baccharum myrti pondere bibantur.

De Ampeloprasso.

CAP.

CLXVII.

a Mpeloprassum stomacho magis aduersatur. Et plus porro
excalfacit. Vrinam & menses vehemētius ciet. Id contra ser-
pentium morsus esse conuenit.

De Cepa.

CAP.

CLXVIII.

c Rommyon aliqui Polijos vocāt, magi calabotim, Roma-
ni Cepam. Cepa lōga acrior est q̄ rotūda. Itē flaua q̄ candi-
da, & licca q̄ viridis, & cruda q̄ cocta, aut condita. Omnes ta-
men mordent. Flatus gignūt. Appetentiam inuitant. Sitim mouēt. Et
extenuant. Fastidiū pariunt, & expurgāt. Aluo vtilis sunt. Ex detra-
ctis purgamētis in oleū coniectæ, hæmorrhoidas, reliquosq; excretio-
num exitus laxāt, subditæ pro balanis. Succus cū melle illitus oculo-
rū hebetudinibus, argemīs, nubeculis, & icipiētibus suffusionibus au-
xiliat. Anginæ eodē perungūtur. Suppressos menses pellit. Caput pur-
gat naribus infusus. Canis moribus cū aceto ruta & melle illiniūt. Cū
aceto autē perūctas in sole vitilignes sanat. Et cū pari spodio scabras
lippitudines sedat. Varos cū sale reprimūt. Contra calceamētōrū attri-

g. iij.

DE MEDICINALI MATERIA

tus. cū gallinaceo adipe vtilis est. Citæ aluo prodest. In auribus sonitū ac grauitatē emēdat. Ad purulētas aureis & eliciēdā earūdem aquā valet. Alopecię earū succo perfricantur, qui celerius q̄ alcyonium, pilos euocat. L argiore cibo cepa capitis dolores ciet. Coctaq̄ vehemētius vrinā pellit. Eos lethargicos efficit, qui valetudinibus aduersis, ea etiā cocta, plus æquo vescātur. Cum passis vuis & fico illita, tubercula concoquit, & celerrime rumpit.

De Allio.

CAP. CLXIX.

a Llium græci Scorodon, alij Geboscon, alij Elaphoboscon vocāt. Quoddam satiuū atq̄ hortensium habetur. Quod in ægypto, singulari vt porrū capite cōstat, dulce, in purpureū vergēs, paruū. Reliqua vero magna & cādida, ex pluribus coagmenrātur nucleis, quos aglithas græci nomināt. Aliud est syluestre quod opioscorodon id est anguinū vocāt. Vis alij acris est. Excalfacit. Mor det. Excernit. Aluū turbat. Inflationes facit. Stomachū exiccat. Sitim gignit. Flatū permouet. Acie oculorū esu hebetat. Eisdē effectus præbet anguinū, quod & elaphoscorodon dicitur. Latas ventris tineas in cibo sumptū abigit. Vrinās detrahit. Contra viperarū ictus, & priuatim hæmorrhoidū prodest, ita vt non aliud magis, si cum vino iugiter adsumatur, aut tritū in eodē ebibatur. Cōtra rabioforū morsus & illitu & cibo valet. Magnæ & allio vtilitates contra aquarū mutationes. Vocē clarificat. Veterē tussim crudū coctūve lenit. Potū autē cū origani decocto, pediculos & lendes enecat. Crematī cinis illitus sūgillationibus cū melle, & alopecijs cū nardino vngvine, medetur. Eruptiones papularū cū oleo & salesanat. Vitilignes, lichenas, lētignes, vlcera capitis manātia, lepras, & furfures, eximit. Cum thure et teda decoctū, dentiū dolorē leuat, si in ore cōtineatur. Cōtra venenatos muris aranei morsus, cū ficulneis frondibus & cumino illinitur. Feruefactæ comæ ius, fœminarū deflectionibus additū, menses & secūdos partus extrahit. Alliū eiusdē gratia suffitur. Factū ex eo & nigra oliua in tritū, esu cit vrinā. Laxat venarū spiracula. Hydropicis vtile.

De Scordoprasso.

CAP. CLXX.

f Cordoprassum magnitudine porrū æquat, qualitātū porri & alij particeps. Vnde promiscuas sibi vires ex utroq̄ vendicauit, effectus alij & porri præbēs, inefficacius tamē. Coctum porri modo dulcescit, & in olerum vicem transit.

De Sinapi.

CAP. CLXXI.

f Inapi hortensiu, aliqui napi, Romani Sinapi vocāt. Eligi debet maturū, valde ruffū, nō magnopere siccū, sed quod fractū interne virescat, & quoddā succo madeat, cæsum colore.

Siquidē recēs id genus ,adultūq; habetur. Ad calfaciendūit, extenuandū ,extrahendū , efficacē est. Ad eliciendā capitis puitā manditur. Cōtrapræduros tōfillarū tumores, ac veterē callosāq; arteriā scabrie ciem, succus ex aqua & melle, conuenienter gargarizatur. Sternutamenta ciet, tritum & naribus ad motum. Comitibus quoq; auxiliatur. Fœminas vuluæ strangulatu oppressas excitat. Lethargicis, derafo capite, illinitur cum ficis amistum, donec rubescat locus. Ad coxendicum cruciatus, lienes, & omne genus dolores confert, cū permutandæ valetudinis causa, ex alto vitia extrahenda sunt. Alopecij illitum medetur. Faciem purgat. Sugillata cū melle adipe aut carato rapit. Feræ impetigines, & lepræ, eo cum aceto perunguntur. Contra febrium circuitus aridum bibitur, aut potui polētæ modo inspargitur. Extrahētibus emplastris, scabiemq; extenuantibus, vtiliter ammisceri solet. Grauitati aurium & sonitui, cum fico impositum prodest. Succus ad hebetudines oculorum & genarum scabrias magna vtilitate illinitur. Expressus recenti semine succus in sole ficcatur.

De Nasturcio.

CAP. CLXXII.

Ardamon alijs Cynocardamon, alijs iberis, alijs Cardaminacacina, Aegyptijs Semeth, Romanis Nasturciū dicitur. Optimū cōstat esse Babilonicum. Omnium semen est acre. Excalfacit. Stomacho aduersatur. Aluum turbat. Tineas excutit. Lienē imminuit. Partus exanimat. Vrinā cit. Venerem stimulat. Sinapis & Erucae simile intelligitur. Lepras & impetigines absterget. Illitū cum melle lienem extenuat. Fauos expurgat. Pulmonū vitia extrahit, sorbitionibus incoctū. Serpentiū venenis potū resistit, atq; eas suffitu fugat. Capillorū defluuia cohibet. Carbūculos ad suppurationē perducit & rumpit. Coxendicibus cum polēta commode ex aceto illinitur. Tumores collectionesq; discutit. Emitter furunculos, illitum cum muria. Hærbæ ad omnia eadem effectus, licet minor.

De Thlaspe.

CAP. CLXXIII.

Thlaspi aliqui Thlaspidion, alijs Sinapi perficū, alijs Myiten, alijs syluestre sinapi, alijs Dasmophon, alijs Myopterō, alijs Bētron, Egyptij Sintēpsum. Romani Scādulatiū, alijs Capsellam, aut pedē gallinaceū vocant. Hærbula angustis folijs, digitali longitudine, in terram versis, suppinguibus, in cacumine diuisis, sesquipedali cauliculo, tenui, non sine adnascentibus ramis, fructu circa ipsum totū, ab extremo in latius se pandēte, semine nasturcij incluso, lenticulæ effigie, nisi quod infringitur. Vnde nomē accēpit. Flos albicat. Nasctur in semitis, & sepibus, fossilq;. Semen asperi gustus, excalfaciens. Bilem & pituitam vtrinq; extrahit, potum acetabuli mensura. Pro

g. iiii.

DE MEDICINALI MATERIA

dest ischiadicis infusum. Sanguinem potu educit. Internas suppurationes rumpit. Menses ciet. Sed partus enecat. Alterum Thlaspi tradit Crateuas, quod aliqui persiconapi vocant, latis folijs, radicibus magnis, vtile ischiadicorum infusioni.

De Arabide. CAP. CLXXXIII.

a Rabis hærba ad cubiti altitudinē assurgit, tenues spargēs ramos, et ex utroq; latere folia, ceu lepidij, sed molliora, et cãdidiora. In cacumine vero sabuci vmbellã gerit, cãdidos flores habentem. Hærba hæc cum ptisana coquitur, in cappadocia maxime. Semen aridũ pro pipere obsonijs ammiscetur.

De Irione. CAP. CLXXXV.

e Ryfimon aliqui chamæplion, Latini irionem vocāt, magi herculis alphita, Aegyptij erethmon. Iuxta vrbes, domicilia hortosq; nascitur, folijs erucæ sylvestris, cauliculis in lori modũ lentis, floribus luteis, siliquis in cacumine gracilibus, vt fœnograeco corniculatis, semine nasturcij, exiguo, vrentis gustus. Contra thoracis fluctiones efficax est, & si purulenta extussiuntur. Regio morbo & lumborum vitijs prodest. Cõtra venena in delinctu cum melle datur. Illinitur ex aqua aut melle vtiliter cæcis carcinomatibus, parotidibus, duricijs mammarum, & testium inflammationibus. In totum extenuat, & calfacit. Mitius multo ad clysteres fiet, si aqua madescat atq; torreatur, vel linteo illigatum, oblito adipe perassetur.

De Pipere. CAP. CLXXXVI.

p Iper in India nasci, breui arbore traditur. Quæ inter initia, prælongum fructum, veluti siliquam promit. Quod longũ piper est. Habet intus aliquid tenui milio simile, quod tandē in perfectum piper euadit. Id autē suis temporibus adultum, racemos emittit grana ferentes, quæ noscimus. Ea acerbæ candidum piper faciunt, aptum ocularibus remedijs, antidotis, & medicaminibus, quæ cõtra venenata parantur, theriaca vocāt. Longũ vero vehementius mordet. Et quoniam priusq; ematurescat decerptum est, subamarum relinquitur. Antidotis & theriacis medicaminibus expetitur. Nigrũ vero, vtpote quod tempestiua maturitate collectum sit, odoratum esse cõstat, candido suauius, acrius & ori gratius, necnon ad condimēta vtilius. Sed cãdidum, adhuc in acerbum vergens, prædictis infirmius est. Eligi oportet grauissimum, plenum, nigrum, sine multis rugis, recens, minime furfurosus. Inueniuntur etiãmnũ in genere nigri semina macie confecta, cassa & inania, quod vocant brasma, Indorum lingua, sic significante abortum. Vis omnium exalfacit. Vrinam ciet. Cõcoquit. Extrahit. Discutit. Absterget caliginem quæ oculis obuersatur.

Piper febrium rigoribus siue potu, siue illitu, subuenit. Serpentiū mor-
 fibus auxiliatur. Partus extrahit. Conceptum adimere creditur, statim
 ab initu suppositum. Tussi omnibusq; pectoris vitijs siue eclegmate,
 siue potu, succurrit. Anginæ eo & melle conuenienter perungūtur. Po-
 tum cum recentibus lauri folijs, tormina discutit. Cum vua passa man-
 ducatum pituitam a capite elicit. Valitudinem tuetur. Dolores finit.
 Appetentiam mouet. Concoctionem adiuuat, in embammata addi-
 tum. Strumas cum pice discutit. Vitilignes ex nitro emaculat. Fi-
 dili nouo, vt aiunt, motum torretur. Non est huius arboris radix gin-
 giber, vt aliqui existimauere, sicuti paulo post ostendemus. Namq; pi-
 peris radix costo similis est, gustum calfaciens, eiq; hygræ cognomen-
 tum est. Hæc lienem reprimat, cum aceto illita aut pota. Caput etiam
 purgat, manducata cum vua taminia quam staphidem agriam vo-
 cant.

*piper in vua passa manducatum
 pituita a capite elicitur.*

De Gingiberi.

CAP. CLXXVII.

Ingiberis sui generis plāta est, in troglodytica Arabia ma-
 gna ex parte nascens. Qua virente ad multa, perinde ad quæ
 nos ruta, vtuntur. Et primis potibus & edulij ammiscent.
 Huius radices cyperi modo paruæ sunt, candidæ, & odoratæ, atq;
 piper sapore imitantur. Eligi debent quæ teredines non nouerunt. A
 multis tamen ob id condiuntur, q; celeriter cariem sentiant. Fidili-
 bus in italiā asportātur. Gingiberis cibo cōueniens est. Et cū condi-
 mento assumitur. Excalfactoriam vim & excoquentem habet. Aluum
 leniter emollit. Stomacho vtile est. Efficax aduersus ea quæ oculis cali-
 ginem offundunt. In antidota addi solet. In totum piperi viribus nō
 dissimile.

De hydropipere.

CAP. CLXXVIII.

Hydropiper apud aquas nascitur, quæ stagnant, aut pigro la-
 psu repunt. Caulem ædit angulosum, prædurum, multis alis
 concauum, folia mentæ, maiora, molliora, candidioraq; gu-
 stu piperis, acri, citra tamen illam odoris gratiam. Fructum acrem in
 furculis paruis, prope folia racematim cohærentem. Folia cum semine
 illita tumores veteresq; duricias discutiūt. Sugillata delēt. Quæ postq;
 inaruerūt, tusa pro pipere in obsonijs ammiscentur. Radix parua, nula-
 lius in medicina momenti.

De Ptarmica.

CAP. CLXXIX.

Ptarmica frutex est, surculos habens paruos, multos, & rotū-
 dos, abrotono non dissimiles, & circa eos folia oleæ, lōga, &
 in cacumine capitulū vtī anthemidis, paruū, rotundū. Quod
 suo acri odore sternutamentum excitat. Vnde nomē accēpit. Folia cū

DE MEDICINALI MATERIA

floribus illita sugillationes rapiunt. Flores sternumenta efficacissime mouent. Nascitur in montibus & petrosis.

De Radicula seu lanaria hærba. CAP. CLXXX.

Truthium ab aliquibus Cerdon, ab alijs Catharsis, ab alijs f Struthocamelus, a quibusdã chamærrhyton, a magis Caly rhyton, a Latinis lanaria hærba aut radícula appellatur. Nota est hærba, qua purgãdis lanis vtuntur, qui eas eluunt. Huius radix est acris. Vrinam ciet. Prodest tussi, quam iecur excitauit, & orthopnœæ ex melle sumpta cochlearis mēsurā. Aluū soluit. Eadem cū panace & capparis radice, calculos frāgit, & cum vrina exturbat. Duriciem lienis absumit. Menses imposita trahit. Partus enecat. Cum polēta autem & aceto illita, lepras tollit. Tubercula discutit, cū farina hordeacea & vino decocta. Miscetur & malachmatis & colyrijs claritatis causa. Sternutamenta mouet. Per os purgat, trita cū melle & naribus infusa.

De Cyclamino. CAP. CLXXXI.

cyclaminus a quibusdã Cysanthemon, ab alijs Cysso-phyl-lon, ab alijs Chelonion, alijs ietyopheron, ab alijs Silene, a Zoroastre Triphalites, ab Osthane Aspho, a Magis Miaspho, Aegyptijs Thesce, a Romanis rapū terræ aut terræ vmbilicus vocatur. Folia habet hæderæ, purpurea, varia, in quibus susq; deq; albicāt maculæ, caule nudo, quaternos digitos æquāte, floribus in eo purpureis, rosarum effigie, radice nigra & aliquantum lata, vt rapum videri possit. Quæ cum hydromelite pota, pituitam aquamq; detrahit. Menses potu apposituue ciet. Tradunt, si prægnans radicem transgrediat, abortum fieri. Partū appensa accelerat. Contra venena præsertim leporis marini, ex vino bibitur. Illita cōtra serpentium iētus remedio est. Radix immista vino inebriat. Regium morbum discutit, tribus drachmis pota, cum passo aut diluto mulso. Sed oportet eum qui ebibit, multis vestibus contectum, loco calido, & perfrictionibus tuto, recumbere, quo facilius exudet. Eiecti autem sudores fellei colore inueniuntur. Succus eius ad purgandum caput, naribus infunditur. Ad deiicienda quoq; alui excrementa, in vellere sedi subijcitur. Illito vmbilico & imo ventre coxarum tenus, aluum emollit. Sed abortum efficit. Suffusionibus, & retusæ oculorum aciei, oblitus cum melle succus prodest. Medicamentis abortum inferentibus, ammiscetur. Succus cū aceto illitus, procidua sedem restituit. Exprimitur tusa radice succus, & ad mellis crassitudinem decoquitur. Radix cutem purgat. Eruptiones papularum reprimat. Vulneribus ex aceto aut melle medetur. Lienem absumit. Vitia cutis in facie, & alopecias emendat. Eius decocto

luxata, podagras, & capitis vlcuscula, pernionesq; foueri congruum est. Ipsaq; in oleo vetere feruefacta, illito oleo, vlcera ad cicatricē perducit. Cauata radix oleo expletur, & cinere feruenti imponitur, adiecto interdū tyrrhenicæ cæræ momēto, vt stigmētī crassitudinē vnguentum cōtrahat, cum primis vtile pernionibus. Radix scyllæ modo cōcisa reponitur. Narrant ad amatoria assumi contusam, & in pastillos diuisam. Nascitur in vmbrosis, maxime sub arboribus.

De Altera Ciclamino. CAP. CLXXXII.

St & altera Cyclaminus, quam Cissanthemon, aut Cisso-
e phyllon vocant, minoribus q̄ hederæ folijs, geniculatis caulibus, crassiq; circa vicinas arbores capriolorū modo se voluētibus, flore cādido, odorato, acinis hederæ mollibus, lenti gustus, aliquantulum acris, radice superuacua. Nascitur in asperis. Huius acini, drachmæ vnus pondere poti cum vini albi cyathis duobus triginta diebus, lienem per vrinam & aluum absumunt. Ad orthopnoeam bibitur. Reliquias a partu purgat.

De Dracunculo. CAP. CLXXXIII.

Raguntium magnū aliqui Aron, alij Isaron, alij Iaron, alij
d Geracicon, alij Biaron, alij Armiagrion, alij Cyperida vocant. In vmbrosis sepibus gignitur. Caulem habet rectum, læuem, dum cubitorum, baculi crassitudine, versicoloribus draconū maculis, purpureis tamen euidentibus. Folia rumicis, inflexa. Fructū summo caule facit, racemosum, coloris primum cineracei, mox per maturitatem in crocum & purpuram vergentis, radicem prægrandem, rotundam, candidam, cortice tenui vestitam. Colligitur, & dum maturus, rescit succus exprimitur, siccaturq; in vmbra. Radix quoq; messibus effoditur. Elotaq; particulatim cōciditur, & funiculo transfixa siccatur in vmbra. Cum diluta potione crudam coctamve, cum melle delingi prodest, contra orthopnoeas, rupta, cōuulsa, tussim, & destillationes. Pota cum vino venerem stimulat. Vlcerā quæ cacoethe vocantur, atq; phagedænica expurgat, Præsertim cum vite alba. Ex ea & melle collyria ad fistulas et partus euocādos cōponūtur. Ad vitilignes cū melle, efficaciter illinitur. Polipos & carcinomata absumit. Succus ad oculorum medicamenta, item contra nubeculas, caliginem, albuginesq; effectum præbet. Herbarū radicisq; odor, teneros cōceptus abortu vitiat. Item si triginta grana eius in posca bibantur. Sunt qui eius succum cum oleo, aurium doloribus infudere. Quinetiam folia, vtpote quæ adstringant, vulneribus recentibus imposuere, & cocta in vino pernionibus. Qui folia manibus affricuerit, aut radicē exemerit posse a vipera ferri, inficiantur.

DE MEDICINALI MATERIA

De Dracunculo paruo. CAP. CLXXXIII.

d Racūculus paruus folio cōstat hederaceo, magno, cādidi
notis insigni, caule recto, bicubitali, versicolore, maculis res
perso purpureis, ita vt anguē plane referat, baculi crassitudi
ne. Fructus sūmo caule racematim cohæret, colore primū felleo, & cū
ematuruit, croceo, gustu seruēs, mordaxq; radice rotunda, bulbosa, ra
phano nō absimili, tenui obducta cortice. Nascitur in sepibus vmbro
sis. Seminis succus cum oleo instillatus, aurium dolorem mitigat. Na
ribus etiā ex lana impositus, polipum absūmit. Carcinomata illitu fi
nit. Triginta eius grana, si in posca bibantur, abortus inferunt. Odo
rem aiunt posteaq; flaccidi flores emarcuerunt, conceptus adhuc tene
ros enecare. Radix excalfacit. Orthopnœis, ruptis, vulfis, tussi, destil
lationibus, auxiliatur. Humores pectoris excreatu faciles reddit, siue
cocta tostaq; cum melle, aut per sese edatur, siue farina eius ex melle de
lingatur. Vrinam pellit. Venerem excitat, cum vino pota. Phagæde
nas vlcera, & quæ cacoethe vocantur, trita cum melle & brionia al
ba, expurgat, & ad cicatricem perducit. Collyria ex ipsa ad fistulas &
eijciendos partus fieri solent. Qui radice suas manus perfricuerunt, a
vipera feriri negantur. Illita ex aceto vitilignes emaculat. Folia recen
tibus vulneribus, conceptorum linteolorum vice, cōuenienter im
ponuntur. Decoctam in vino pernionibus apposuisse prodest. Caseus fo
lijs inuolutus, a putredine defenditur. Succus radice ad nubeculas, al
bugines, & oculorum caligines cōuenit. Radix cruda coctave, ad sa
norū vsus, pro olere recipitur. In gymnetidibus isulis, quæ calarides
vocantur, coctam radicem cum melle multo, in cōuiuijs placentarum
loco offerunt. Radix messibus effoditur, lotaq; frustratim conciditur,
& lino traiecta siccatur in vmbra, & ita reconditur.

De Aro.

CAP. CLXXXV.

a Ron apud syros Lupha vocitatū, aliqui Alymon, alij Thy
mon, alij Dracontiam, Cyprij Collocassion dicunt. Folia
emitit dracunculi, sed longiora, & paucioribus distincta ma
culis, caulem suppurpureum, dodrantalem, pistilli specie, a quo croce
um semen exit. Radice dracūculi alba, quæ decocta estur, vtpote cum
minus acris fit. Folia ad esum condiuntur, & arida per se, decocta mā
duntur. Radix semen & folia, dracunculi vires habent. Priuatim ra
dix ex fimo bubulo podagris illinitur, & dracunculi more reponitur.
In totum ob mitiorem eius acrimoniam, in cibum expetitur.

De Arisaro.

CAP. CLXXXVI.

a Risarum exigua hærbula est, cuius radix oleæ magnitudinē
implet, longe maioris q̄ Aron acrimonix. Vnde illitu nō

LIBER SECVNDVS

55

mas fistit, Fiūt collyria ex ea ad fistulas. Illitu radicis, genitale animas
lis cuiuscunq; in perniciem agitur.

De Hastula regia. CAP. CLXXXVII.

Astulā regiā græci asphodelon, alij Nartheciō, Romani ala
h bucū vocāt, vulgo notū. Folijs est maioris porri, caule læuī,
ferēte in cacumine florē, quē Anthericon appellāt. Radices
subiacēt oblōgæ, rotūdæ, glādibus similes, gustu acres. Quæ excalsa
ciunt. Vrinæ & menses epotæ ciūt. Lateris doloribus, ruptis, conuul
sis & tussibus, drachmæ pōdere potæ ex vino medētur. Ea vero vom
itiones adiuuat, ludicri tali magnitudine commanducata. A serpente
demorsis datur aptissime. Verum trium drachmarum pondere, folijs
floribus & radice ex vino, morsus illinire oportet. Item vlcera sordida
& depascentia. Mammæ quoq; & testiculū inflāmationes, tubercu
cula, furunculōsq; decoctis in fæce vini bulbis. Recentibus oculorū
inflammationibus ex polenta auxiliatur. Radicis succus adiecto ve
tere vino dulci myrrha & croco decoquitur, sitq; perq; vtile oculis
medicamentum. Ad purulētās aureis per se, aut cū melle vino & myr
rha tritus, prodest. In contrariā aurē infusus, dentium dolorem miti
gat. Cinis e radice illitus, alopecias ad pilum reducit. Oleum in exca
uatis radicibus igni decoctum, illitu exulceratis pernionibus & ambu
stis igni, cōducit. Surditati, instillatus in aurem, auxiliatur. Candidā
vitiliginem lintheo antea perfrictam in sole, illita radix emendat. Semen
floreſq; in vino poti scolopendræ & scorpionum venenis, mirū
in modum resistunt. Aluum purgāt. Floret messibus albucum. Quare
æquinoctio verno antequam semen adoleuerit demetendum. Radicē
aiunt potam, veneris cupiditatem inhibere. Quod hærbarius Cratæ
uas asseuerat. Addiditq; sanare podagræ dolores, si drachmæ ponde
re bibatur.

De Bulbo vomitorio. CAP. CLXXXVIII.

Vlbus quem vomitorium vocant, folia habet lentiora mul
b to & lōgiora bulbo cibario, radicem similem, cortice magno.
Ea mansa, aut decoctum eius potum, vesicæ malis medetur.
Vomitiones mouet.

De Bulbo cibario. CAP. CLXXXIX.

Ibarius bulbus vulgo cognitus, a nobis estur. Stomacho &
c aluo utilis rufus, & ex aphrica delatus. Amarus vero
& scylinus, stomacho aptior est, & concoctionem adiuuat.
Bulbi omnes acrimoniam habent. Excalfaciunt. Venerem stimulant.
Linguam tonsillāsq; exasperant. Multum alimenti præbent. Carnes
creant. Inflationem pariunt. Luxatis, fractis, articulorū doloribus effi

DE MEDICINALI MATERIA

caciter illinūtur. Spicula extrahunt. Gangrānas & podagras ex melle aut per sese, hydropicorū tumores, & canū morsus cū melle & piperris polline illiti cohibent. Stomachi dolores mitigāt. Furfures & vlcera quæ in capite manant, cū tosto nitro abstergunt. Sugillata varosq; per se aut ex oui luteo, & lentigines cum melle & aceto, emēdant. Fractis auriculis vnguibusq; ex polēta medentur. Ijdem calidis cineribus torrefacti, tollūt ficus. Item cum cinere e mēnarum capitibus, impositi. Cremati vero & cum alcyonio misti, vitia cutis in facie, atraq; cicatrices, in sole illiti emaculant. Faciunt ad rupta, si cū aceto costi edantur. Sed copiosiore eorum cibo abstinendum. Quoniā neruos tentant. Costi cum polenta, & ex suillo adipe impositi, tumores ac tubercula velocissime ad suppurationem perducūt & rumpūt.

De Scilla.

CAP.

CXC.

Cilla vim acrem atq; feruentem habet. Assatam multo vtilior remesse constat. Polline aut luto oblita, in clybanū conijciatur, aut carbonibus obruitur, donec obducens farina sufficiens intosta fuerit. Qua exempta si non emollescat, altera farina aut luto circumlinitur, & eadem quæ prius fiunt. Nam quæ ita non assatur, inreraneis maxime noxia est. Torretur itē in olla, indito operculo, quæ in furnum demittatur. Sumi etiam solet medium, direptis viuo tenuis tunicis, quod frustatim confectum coquitur, mutata sæpius aqua, donec ipsa nec amaritudinem aut acrimoniam habeat, traictaq; lino frusta siccantur in vmbra, ita vt ne vlla quidem parte se contingāt. His scillæ segminibus ad oleū, vinū, aut acetum scillinū vtimur. Ad rimas pedum, interna pars crudæ scillæ in oleo feruefacta, aut cum resina liquefacta, imponitur. Decocta in aceto demorsis a vipera, cataplasma est. Ad singulas assæ parteis adiectis ostonis tosti salis, cochlear vnū aut alterum damus ieiunis, ad emolliendam aluum. In potu autem & odoratis medicaminibus, quibus vrinā ciere volumus, hydropicisq; & stomachicis, quibus innatat cibus, regio morbo, torminibus, in tussē vetere, suspiriosis & cruēta extussietibus, tres obolos in delinctu ex melle sumpsisse satis est. Coquitur cū melle, & estur eorūde gratia, maxime vt concoctionem adiuuet. Strigmēta per aluum extrahit. Cocta & simili sūpta modo, eosdē præbet effectus. Sed cauēdus scillæ vsus, his qui intestinū sentiūt vlcus. Ad pensiles verrucas & perniones, tosta efficaciter illinitur. Tritū semē & in carica aut melle deuorātū, aluū emollit. Scilla in limine ianuæ suspēsa, mali medicamēti noxiā arcet.

De Pancratio.

CAP.

CXCI.

Ancratiū quod aliqui scillam appellant, radice est magni bulbi, ruffo colore, aut suppurpureo, gustu amaro ac feruente.

*modus præparandi scillæ ad
vnam oleū & reserenda.*

Folij lilij, sed longioribus: Scillæ vires & præparationē habet. Eo-
demq; pondere in morbis efficaciter assumitur. Cui tamen mitior q̃
scillæ facultas inest. Radicis succus, cum erui farina digeritur in pastil-
los, qui hydropicis splenicisq; cum hydromelite, commodissime dantur.

De Cappari.

CAP.

CXCII.

Apparin aliqui Cynosbaton, alij Capriam, alij Corui ma-
lū, alij Ophioscorodon, alij Phyllostaphylon, quidā Thal-
liam aut Petream, alij Olophyton, alij ionitem, nonnulli Oli-
gochloron aut Acontion, aut Hippomanes, alij Trichomanes, Ma-
gi Potera, alij Pentheron, aut cor lupi, alij alochorodon, Romani in-
turim, Aphri Hærbieathon. Capparis aculeatus frutex est, qui in ter-
ra stratus magis in orbē euagatur. Spinæ ut rubus habet, in hami mo-
dum aduncas. Folia mali cotoneæ, rotunda, fructum oleæ similem, qui
cum dehiscens panditur, florem candidum promit, quo excusso, non
nihil glandis oblongæ figura inuenitur, quod apertum grana acinis pu-
nicorum similia ostendit. Radices lignosas spargit, grandes, numero-
sasq; Tenui solo, asperisq; locis, in insulis iuxta domicilia nascitur.
Caulis, & fructus, cibi gratia condiuntur. Aluum turbat. Stomacho
aduersatur. Sitim gignit. Cocta tamen stomacho q̃ cruda utilior est.
Fructus drachmis duabus in vino potus, quadraginta diebus, lienem
absumit. Et vrinam, cruentumq; excrementum emittit. Bibitur utilissi-
me in coxarum doloribus, & neruorū resolutione, item ruptis & cō-
uulsis. Menses ciet. Caput purgat. Dentium dolorem sedat, semen ex
aceto decoctum, colluto inde ore. Aridus radicis cortex ad eadem pro-
ficat. Ulcera omnia vetera, & sordida, & quæ occalluerunt, expurgat.
Lienosis cum farina hordei illinitur. Dente demorsa dolori eius auxi-
liatur. Cum aceto trita, vitilignes albas absterget. Radix foliaq; intri-
ta strumas, ac duricias discutiunt. Auriū vermiculos infusus succus ene-
cat. Aphrica, & Marmarica Capparis, vehemēter inflāt. Apula vo-
mitus facit. Libyca, & quæ rubro mari defertur, mirū in modū acris
est. Siquidem in ore pustulas excitat, gingiuasq; osse tenus exest, quare
in cibis non ab re damnatur.

De Lepidio.

CAP.

CXCIII.

Epidium aliqui gingidiū vocant. Hærbula vulgo nota. Mu-
ria cum lacte seruatur. Vis foliorum acris & exulcerans. Qua
propter ischiadicis illita, præsentissimum est auxilium, si cū
helenij radice quarta parte horæ illinatur. Lienosis simili modo pro-
dest. Lepras eximit. Radix appensa collo, dolore dentium liberare
existimatur.

DE MEDICINALI MATERIA

De Ranunculo. CAP. CXCIII.

Ranunculum aliqui sylvestre Apium vocāt. Complura eius genera. Vis tamen omnibus vna, acris, & vehementer exulcerans. Nam vnum coriandri folijs constat, latioribus, subalbidis, pinguibus, flore luteo, interdum purpureo, caule gracili, cubitum alto, radice alba, exigua, amaraq, multis capillamentis helebori modo fibrata. Nascitur in limitibus humidis. Alterum lanuginosius, longiori caule, pluribus foliorū incisuris, plerumq; in Sardonia proueniens, q̄acerrimum, quod sylvestre Apium appellant. Tertium minimum, odore graui, flore aureo. Quartū huic simile, flore lacteo. Folia, flores & cauliculi recentes, illitu exulcerant, & crustas non sine dolore gignunt. Quare vngues scabros extricant. Scabiem eximunt. Stigmata delent. Formicantibus verrucis, & pensilibus, alopecijsq; paulisper illinuntur. Tepente decocto perniones fouentur. Sicca radix tria q; sternutamenta ciet, naribus admota. Dentium dolorem appensa leuat, ipsos tamen frangit.

De Fremio. CAP. CXCV.

Fremium, græci Anemonem, alij Agriam, aut nigram vocāt, alij Anemonem phœnicam, alij Enemion, nonnulli Mecanion, alij Tragoceros, alij terræ parinem aut Barbylum. Oslanes Berilion, Itē Ornios cheranion, Pythagoras Attraxilida, Magi Cnicum agriam, Romani Orci tunicam. Duo fremij genera. Vnum sylvestre. Alterū in cultis nascens. Cuius multæ species. Vna phœniceum florem profert. Altera candicantem, aut lacteum, aut purpureum. Harum folia coriano similia, tenuioribus prope terrā diuisuris, caules lanuginosos, tenues, in quibus flores vt papaueris, & in medio capitula nigra, aut cærulea. Radix oleæ magnitudine, aut amplius paulo grandescit, fermeq; geniculis quibusdam cingitur. Sylvestri amplitudo maior, latioraq; folia, & duriora. Oblongius caput, flore puniceo, multis radicū capillamentis. Acrior est quæ nigra habet folia. Vis omnium acris. Ea de causa succus naribus infusus, purgat caput. Commanducata radix pituitam trahit. Decocta in passo & illita medetur oculorum inflammationibus. Cicatrices eorundem & hebetudines emendat. Sordida vlcera abstergit. Folia & caules, si cum ptisanâ decocti edantur, copiam lactis præbēt. Menstrua ciunt, vellere appositi. Illiti quoq; lepras eximunt. Sunt qui errore ducti, argemonem nominari eupatorium putent. Quoniam a sylvestri fremio, argemonen & papauer quod Rhœam appellant, de quo inter papaueris genera referemus, propter colorum cognationem in floribus, distinguere non possunt. Verum papaueris & argemonæ color, minus puniceus

ſpectatur, & vtraq; tardius floret. Quinetiam Argemone croceum ſuccum, guſtu admodum acrem, reddit. Rhœas vero candidiorem & acrem. Inſuper fremio & rhœadi capitula ſylueſtris papaueris ſimilia inſunt, ſed in fremio ſuperne craſſiuſculum, in rhœade anguſtius. Fremij genera nec ſuccum remittunt, nec caput habent, ſed quaſi aſparagi cacumen. In aruiſ illa ſæpius enaſcuntur.

De Argemone

CAP.

CXVI.

Argemone a Græciſ Oenone vocatur, ab alijs Anthemis,
 a alijs Homonœa, aliquibus ſloſ campeſtris, Romanis Con-
 cordialis, aut Pergalia, alijs Lyburnia, Gallis Corona. Syl-
 ueſtri papaueri ſimilis eſt. Folia habet fremij, diuiſa, florē puniceū, ca-
 put in cauliculo papaueris rhœadis, oblongius, & ſummiſ partibus
 latū, radicem rotundā. Succū croci colore acrē, dimittit, Argema &
 nubeculas expurgat. Folia illitu inflammationeſ compeſcunt. Ea, vt
 hærbarius Crateuſ author eſt, contuſa cum axungia ſtrumaſ diſcu-
 tit. Cribrata eiſ farina cum nitro & ſulphure ignem non experto. cō-
 tra vitiligineſ efficax eſt. Eaſq; ſicco linteo antea conſrictaſ in bal-
 neis ſanat. Facit & ad ſcabiem.

De Altera Argemone.

CAP.

CXC VII.

Alter a eſt Argemone, quam Artemonen aliqui, alijs Arſe-
 a lam, aut Sarcocollam vocāt, Romani Argemoniam. Ea for-
 alijs ſylueſtri papaueri ſimilis eſt. Recenſ trita interciſioneſ
 impoſitu ſanat. Oculorum inflammationeſ mitigat. Pota cum aqua
 dyſentericis auxiliatur. Vulnera conglutinat. Conuulſiſ, & vellicati-
 buſ, impoſita medetur. Inflammationibuſ vtiliſ. Contra ſerpentium
 morſuſ cum vino bibitur.

De Anagallide.

CAP.

CXC VIII.

Anagallis purpurea, quibuſdam Aeritiſ, aut Aegitiſ voca-
 a tur, alijs Sauritiſ, a Magiſ Oculi ſanguis, aut Chelidoni-
 on, Romanis Macia, Hetruſciſ Maſytipōſ, Gallis Sapanā,
 Daciſ Cerceraphron. Anagalliſ communis, a quibuſdā Corchoron,
 alijs Halicacabon, alijs Zeliaurus; Magiſ Nycteriſ, Aegyptiſ
 Mecij, Romanis Aneciaton, Aphriſ Aſſiriſcæ. Duo eiſ genera;
 quæ tantū flore diſtāt. Nā quæ cæruleo flore eſt, fœmina dicitur. Maſ
 quæ fœnico. Frutiſ ſunt parui in terra iacēteſ. Foliſ in quadrāgulo
 caule puſilliſ, ſubrotūdiſ, ad Helxinæ folia accedētibuſ, ſemine rotū-
 do. Vtraq; mitigādī vim habet. Inſlāmationē arcet. Ad aſtoſ corpori
 h. j.

DE MEDICINALI MATERIA

aculeos extrahit. Nomas cohibet. Succus caput gargarizatu purgat. Et naribus infusus, dolorem dentium lenit, si in aduersam narem iniiciatur. Argema cum melle attico emendat. Retusæ oculorum aciei auxiliatur. Contra viperarum morsus, iocineris et renum vitia, ex vino bibere prodest. Tradunt eam quæ cæruleum ædit florem, prociduum am sedem reprimere. Quæ vero phœniceum, illitu euocare.

De Hedera. CAP. CXCIX.

h Edera aliquibus Citharon, alijs Cissaron, alijs Chrysocarpos, alijs Poetica, alijs Corymbethra, alijs Cyssion, alijs Dionysia, alijs Ithytherion, alijs Persis, alijs Cemos, alijs Asplenos, Romanis Sylua mater, alijs Hedera, Gallis Suibites. Hedera differentias multas in specie sortitur, generalissimas autem treis. Nam quædam candida est. Altera nigra. Tertia Helix. Candida fructum fert candidum. Nigra nigrum, aut croci æmulum, quam vulgus Dionysiam vocat. Helix fructum non gignit. Sed tenues habet palmities, & folia parua, angulosa, & rubra. Hedera omnis acris est, & adstringens. Neros tentat. Flos trium digitorum carptu, facit ad dysentericos, in vino bis die potus. Ambustis cum cærato illinitur. Recensia folia ex aceto cocta, aut cruda cum pane detrita, lienes sanant. Foliorum & corymborum succus, cum irino vnguento, melle aut nitro, naribus infunditur. Et contra veteres capitis dolores, caput eo cum aceto & rosaceo perfundi vtile est. Purulentis auribus, aut dolentibus cum oleo medetur. Nigræ hederæ succus, aut epoti corymbi corpus infirmant. Mentemque turbant largius sumpti. Acini quinque triti, calfactique in punico cortice cum rosaceo, si instilletur a contraria aure, dolorem dentium mitigant. Denigrant capillum illiti corymbi. Folia in vino decocta illinuntur omnium vlcera generi, etiam si cacoethe sint. Vicia cutis in facie & ambusta sanant, uti antea diximus decocta. Mouent menses triti & subditi corymbi. Iidem poti post purgationes feminarum, drachmæ pondere concipiendi spem adimunt. Pediculus foliorum melle irrigatus, ac vuluæ inditus, menstrua & partus extrahit. Instillatus succus putrida tædiana narium, graueolentiamque emendat, & sanitati restituit. Lachryma hederæ psilothrû est. Illitu pediculos enecat. Succus in aceto potus, contra phalangia prodest.

De Chelidonia. CAP. CC.

c Helidoniam magnam nonnulli Pæoniam vocant, alij Crætam, alij Aubion, alij Glauciam, quidam Philomedion, alij Othonon, Romani Fabium, Galli Thonan. Aegyptij No-

thoth, Daci Crustana. Chelidonia maior, caule est cubitali aut altiore, surculoso. Folijs ranunculi, multis, mollioribus tamē, & colore cæsijs, flore violæ albæ, secundum singula folia prodeunte. In ea succus croci, mordax, acris, & aliquantulum subamarus, grauiter olens. Radix superne singularis in multa crocea capillamenta fibratur. Siliqua ceu corniculati papaueris, tenuis, lingua, in qua semē papauere maius recluditur. Succus in æreo vase, cum melle prunis decoctus, oculis claritatē adfert. Folijs, caule, radice, succus exprimitur incunte æstate, & ficcatus in vmbra digeritur in pastillos Radix cum aniso & vino albo pota medetur regio morbo, & vlceribus quæ serpunt. Imposita cū vino aut manducata, dentium dolorem sedat. Hoc nomen sibi videtur vendicasse, q̄ aduentu hirundinum exoriatur, & discessu emarcescat. Sunt qui narrant hirundines matres excæcatis pullis adherentes hærbam visū restituere.

De Chelidonia minore. CAP. CCI.

Helidonia minor, quam Tyrinon syluestre aliqui nuncupant, hærbula est stolonibus constans, sine caule, folijs hederæ, multo rotundioribus, & minoribus, teneris, & suppinguibus. Radices habet complures pusillas, in granorum tritici modum acervatim cōgestas. Quarū tres aut quattuor in longitudinē exeunt. Iuxta aquas nascitur. Vis ei acris & fremij modo summam cutem exulcerat. Psoras & scabros vngues eximit. Succus radicibus expressus ad purgandum caput, naribus infunditur. Decoctum eius cum melle gargarizatum vadide caput inanit. Et omnia pectoris vitia extrahit.

De Othonna. CAP. CCII.

Thōnam aliqui maioris Chelidoniæ succum esse aiunt. Alij succum floribus corniculati papaueris expressum. Alij permistos cæruleæ Anagalidis, Hyoscyami & papaueris succos, esse contendunt. Alij Troglodyticæ hærbe succum, quæ Othonna vocatur. Nasci q̄ eam in eo Arabiæ tractu qui ad Aegyptum spectat. Othonna similis Eruçæ, perforatis crebro folijs & veluti a tineaderosis, squallore obfita, paucis. Flore croci, latifolio. Quare quidā fremij speciem esse putauerunt. Extractus succus oculorum medicamentis adiicitur, vbi expurgare est opus. Mordet enim & abstergit omnē caliginem, quæ oculis offunditur. Tradunt humorem quēdam ex hærba emanare, qui elotus semotis calculis, in pastillos ad eadem digeritur. Aliqui tamē affirmant, lapidem esse Aegyptium, in Thebaide nascentem, exigua magnitudine, candido colore, gustu cum feruore quodam & adstrictione, mordaci.

h. ij.

DE MEDICINALI MATERIA

De Auricula muris. CAP. CCIII.

Myosota alij Myoton, alij Anthilion, alij Alfinen, nonnulli
m Myorthochon, alij Myrtosplenon, Latini muris auriculam
vocant, Aphri Labatholabat. Nomen ideo accepit quod muris
sculorum aures folijs imitetur. Lucos & sabulosa loca amat, ideo Alfine
dicta est. Ea Helxinæ similis, sed humilior, ac folijs minor. Vim refri-
geratoriam habet. Oculorum inflammationibus conuenienter ex po-
lenta illinitur. Succus eius aurium doloribus instillatur. In totum ea-
dem potest quæ Helxine.

De altera auricula muris. CAP. CCIIII.

Vris auricula quæ Myosotida vocant. Hæba est caulibus
m pluribus ab vna radice, aliquatenus rubentibus, concauis ab
imo. Folijs angustis, oblongis, dorso acuto, nigricantibus, per
interualla assidue geminatis, atque in mucronem desinentibus, & tenui-
bus cauliculis ex alarum sinu prodeuntibus, flore cæruleo. Radix digi-
tali crassitudine, multis capillamentis fibrata. In summa scolopendrio
similis, sed breuior, minor. Radix illita ægilopia sanat. Sunt qui He-
xinen, muris auriculam vocitent.

De Glasto satiuo. CAP. CCV.

Satis satiuæ aliquibus Augion, Magis Arusion, Romanis
i gluta aut glastum dicitur. Glastum quo insectores lanarum vtun-
tur, folium habet plantagini simile, verum pinguius nigriusque.
Cuius caulis duum cubitorum altitudinem excedit. Illita folia tumores
omneis discutiunt. Cruenta vulnera glutinant. Sanguinis profluvia fi-
stunt. Ignem sacrum, phagedænas, putrescentia vlcera & quæ serpunt
sanant.

De Syluestri glasto. CAP. CCVI.

Syluestre glastum satiuo simile est. Folia fert maiora, lactuca-
f ceis proxima, caules prætenues, multifidos, rubicantes. In
quorum cacumine folliculi dependent, quædam linguarum
effigiem referentes, in quibus semina. Flore tenui, luteo. Eadem quæ & su-
pradiçta præstat. Potu & illitu lienosis auxiliatur. Sed sciendum est,
ne tradita errorem pariant, satium glastum, luteum florem, tenuiores
multifidosque ramulos, proferre. In cacumine autem folliculos linguæ
speciem representantes in quibus semen continetur, melanthio simi-
le, caulemque supra binum cubitorum altitudinem attoli. Syluestre vero
nigriora ferre folia, caulem minorem sed crassorem. Florem purpu-
reum, aut cæruleum, fructum cruciformem, asperum, in quo semen, fo-
lijs exilibus quinquepartito diuisum.

LIBER TERTIVS

39

De Telephio.

CAP. CCVII.

Elephium aliqui sylvestre semperuiuum, alij portulacam syl-
uestrem appellant, Romani illecebram, Aegyptij Anoth,
Aphri Tirtopurin. Hæba portulacæ similis et caule et fo-
lijs habens geminas alas, singulis foliorum geniculis inhærentes, a
quibus rami seni septenive fruticât, a radice referti cæruleis folijs, cras-
sis, lentis, carnofis. Flore luteo, aut candido. Nascitur, in
cultis & maxime inter vites. Tempore verno folia
senis horis illita albam vitiliginem sanant.

Sed postea hordeacea farina illini de-
bet. Perunctam etiam in fo-
le vitiliginem tollunt.

Sed vbi inarue-
runt abster-
guntur

Pedacij Dioscoridis Anazarbei De me-
dicinali materia secun-
di Libri

F I N I S

h. iij.

DE MEDICINALI MATERIA
 PEDACII DIOSCORIDIS ANAZARBEI
 DE MEDICINALI MATERIA LI
 BER TERTIVS, IOANNE
 RVELLIO SVESSI
 ONENSI IN-
 TERPRE-
 TE.

Vperioribus charissime Ari commentarijs, tradi-
 dimus de aromatibus, vnguētis, oleis, arboribus,
 & prodeuntibus ex eis fructibus et lachrymis.
 S Item de animalibus, frumētis, oleicibus, & hær-
 acrimonia præditis. In hoc autem tertio de radici-
 bus, succis, feminibus, hær-
 bus quæ & vernacula
 consuetudine vsurpantur; quæq; pluribus scatent
 remedijs, differemus.

De Agårico. CAP. I

Garicū radix fertur laerpitio similis, sed facie sūma solutior
 a & fungosa tota. Duo eius genera. Fœmina rectis venarum
 discurlibus constat. Mas rotundus est & vndiq; compactior.
 Vtriq; gustus in initio dulcis, mox in amaritudinē transit Sarmaticæ
 in aquifolia prouenit. Sunt qui radicē esse plantæ affirmēt. Alij vt fun-
 gos nasci in arborum caudicibus, quadā putredine. Gignitur in Gal-
 latia Asiæ cōtermina, & Cilicia in cedris. Sed friabile & infirmū. Ad
 stringendū, calfaciendūq; naturā habet. Contra tormina, & cruditates,
 rupta, præcipitationesq; efficax. Datur duobus obolis in vino mul-
 so, febrim nō sentientibus. Febriculosis vero in aqua mulsa. Arquatis
 quoq; suspiriosis, iocineris renūq; vitio laborantibus, dysentericis.
 Itē si vrina ægre reddatur, si vuluæ strāgulatus vrgeat, si pallor mēbra
 decoloret, drachma vna dari solet. Si tabes infestat, ex passo. Si lien ne-
 gociū exhibet, ex aceto mulso. Si dissolutio stomachi est, ita vt cibi te-
 nax non sit, manditur, & sine vlla hūmoris sorbitione deuoratur. Simi-
 li modo accide ruētibus propinatur. Sanguinis reiectiones sistit,
 tribus obolis ex aqua sumptum. Facit ad coxendicum & articulorum
 dolores, & comitiales morbos, si cū aceto mulso, pari pondere assuma-
 tur. Mēses ciet. Fœminis, quas inflatio vuluæ vexat, vtiliter æquali
 modo datur. Rigores soluit datū ante febriū significationes. Aluū pur-
 gat drachma vna aut altera, si cū aqua mulsa bibatur. Venenorū ātido-
 tū est drachmæ instar, cū diluta potione sumptū. Si serpētes ictū vi-
 brarūt, morsūq; subfrixerūt, tribus obolis ex vino potū, mire auxilia-
 tur. In sūma iternis omnibus vitijs cōuenit, pro viribus et ætate datū

LIBER TERTIVS

60

nunc ex aqua, nunc ex vino, ijs ex aceto mulso, alijs ex aqua mulsa.

De Rapontico. CAP. II.

Ha aliqui Rheū, aliqui Rhiā, Latini Rapōticū vocāt. Pro-
 r uenit in ijs quæ supra bosporū sunt regionibus, ex quibus
 affertur. Radix nigra Centaurio magno similis, sed minor &
 ruffior, fungosa, aliquantū leuis, sine odore. Optimū habetur quod te-
 redines nō senfit, si gustatu cū remissa adstrictione lentescat, manduca-
 tumq; colorē reddat pallidū, aut ad crocū inclinantē. Id epotū facit ad
 inflationes, stomachi imbecillitatē, & omne genus dolores, ad cōuul-
 sa, lienosos, hepaticos, tormina, ad renū vesicæ & pectoris vitia, aduer-
 sus intēta præcordia, & vuluæ mala, coxendicum dolores, sanguinis
 excreationes, suspiria, singultus, dysenterias, & cæliacorū affectus, con-
 tra febriū circuitus, & venenatorū morsus. Datur in singulis valetudi-
 nibus eodē quo agaricū pōdere, & cū eisdē liquoribus. si febris careāt,
 in mulso, sin aliter ex aqua mulsa, si tabē experiūtur, ex passo, si lienis
 exercet, in aceto mulso. Si dissolutio est stomachi, id est cū cibi tenax
 non est, mādatur, & sine sorbitione vlla deuoratur. Liuetia lichenasq;
 tollit, cū aceto illitū. Inflammationes omnes veteres ex aqua oblitū di-
 ssipat. Summa eius vis adstringens cum aliquanto calore.

*Part Raponticū pōdere
 eodē q^o Agaricū*

De Gentiana. CAP. III.

Entianā aliqui cētauriā radicē, alij Aloē gallicā, alij Narcē,
 g alij Chironion, Dardani aloitin, Romani genus aut Cicēdi-
 am, alij Ciminalē vocāt. Huius inuētio prima assignatur Gē-
 tidi Illyriorū regi, a quo cognomētū habuit. Folijs proxime radicē,
 iuglādi plātaginive similibus, subrubris, a medio caule præserti iuxta
 cacumē paulū dissectis, caule cauo, & inani, digiti crassitudine, geni-
 culato, & ex iteruallis maioribus foliato, binū sæpe cubitorū. Semine
 in calycibus lato, leui paleaceo, satis ad sphōdilijs semē accedēte. Radi-
 ce longæ Aristolochiæ, crassa, amara. Nascitur in sublimibus mon-
 tium iugis, vmbrosis locis, aquosisq;. Vis radicis excafactoria, & ad-
 stringens. Contra morsus serpentū, duabus drachmis cū pipere ruta
 & vino pota, auxiliatur. Extracti succi drachma, laterū doloribus, &
 ex sublimi deuolutis, ruptis, & conuulsis, prodest. Hepaticis & stoma-
 chicis, pota cum aqua subuenit. Radix collyrij modo subdita, par-
 tus eijcit. Imposita vt lycium, vulneraria est, & vlcera cuniculati
 depascentiū medela. Succus præcipue eodē effectū prodest. Oculis in-
 flāmatione laborātibus illinitur. Pro meconio collyrijs acris imi-
 scetur. Radix vitiliginē absterget. Succus extrahēdi ratio hæc est. Con-
 tusa radix quinq; diebus aqua maceratur. Postea in eadem tantisper
 h. iij.

DE MEDICINALI MATERIA

decoquitur, dum extent radices. Et ubi refrixit aqua, lintheo excolatur. Mox discoquitur, dum mellis crassitudo fiat. Fictiliq; reconditur.

De Aristolochia rotunda. CAP. IIII.

Aristolochia rotunda nomen ex eo sibi adoptauit, q; existimetur optime puerperis opitulari. Tria eius genera traduntur.

Vna quæ fœmina vocatur, folijs hederaceis, præstati odore, cum acrimonia, mollibus, subrotundis, multis ab vna radice germinibus, prælongisq; palmitibus, flore candido tanquam pileolo, rubro, grauiter olente.

De Aristolochia longa. CAP. V.

Aristolochia longa, mascula appellatur, nonnullis dactylitis, alijs Melocarpus, alijs Teuxinon, Latine Aristolochia, longiore q; rotunda folio, tenuibus ramulis, dodrantalibus, flore purpureo, grauiter olente, qui marcescens in pyri similitudinem conformatur. Tuberibus radicum rotundis, vt rapum, Longæ vero radix digiti crassitudinem, & palmi longitudinem implet. Nonnunq; paulo grandius adolefcit. Ambæ colore intus buxæo, gustu amaro, & graui. Est etiamnum tertia lōga, quæ clematidis vocatur, ramulos habens tenues, refertos folijs subrotundis, minori semper uiuo similibus, flores rutæ, pleniores, radices longiores, tenues, crasso cortice odoratoq; vestitas, vnguētornū spissamentis conuenientes. Rotunda cæteris venenis resistit. Longa vero aduersus angues & venena, drachmæ pondere ex vino bibitur & illinitur. Pota cū pipere & myrrha menses, partus, & omnia vuluarum onera eiicit. Eadem efficit subdita in pello. Rotunda ad eadem pollet. Insuper singultibus, suspirijs, rigoribus, lieni, conuulsis, laterum doloribus, pota cum aqua singulariter auxiliatur. Aculeos & spicula extrahit. Ossium squammas illitu adimit. Vlcerum putrida exest, & sordida expurgat. Caua cum iri & melle explet. Gingiuas & dentes extergit. Clematidis ad eadē pollere creditur. Viribus tamen inferior est. Appellatur a quibusdam Ararisa & melecaprum, ephestios, lestitis, pyxionix, dardanion, iontitis, Galis theximion, Aegyptijs Sophoepe, Siculis Chamæmelon. Italis malum terræ. Dacis Absinthium rusticum. Nasçitur in montibus & calidis locis aut campestribus & petrosis. Ad grauem febrim efficax est. Si nidore subditis carbonibus febricitans suffiatur, febris leuabitur. Vulnere imposito sanat. Carcinomatis narium, cum cypiro & dracunculi semine & melle prodest. Rigoribus medetur, cocta in oleo aut adipe suillo, illitaq;.

LIBER TERTIVS

61

De Dulci radice. CAP.

VI.

g Lycyrrhisam aliqui Ponticā, alij Glyceraton, quidam Symphyton, alij Leonticam, alij Glycyphyton, aliqui Scythion, alij Adipson, alij Sylithram, alij Lybiestafon, alij Omænomæon, alij Peenthaomæon, Latini dulcē radicē appellauere. Plurima gignitur in Cappadocia & ponto. Fruticosa est, ramis binū cubitorum altitudine assurgentibus, folijs lentisci, densis, pinguibus, tam quæ gummosis, flore hyacinthi, fructu pilularum plātani magnitudinis, asperiore, qui filiquas lentium modo habet, ruffas & paruas; radicibus longis, vt gentianæ coloris buxei, subacerbis & dulcibus, quæ densantur in succū lytij exemplo. Is in arteriæ scabricia efficax habetur. Verum oportet vt liguæ subditus eliquescat. Aestuati stomacho, thoraci, ac iocineri conuenit. Sanat vesicæ scabiem & renum dolores cum passo potus. Idem eliquatus sitim sedat. Vulneribus illitus accōmodatur. Cōmanducatus stomacho prodest. Recētis radicis decoctū ad eadem conuenit. Eiusdem farina pterygijs commodissime inspargitur.

De Centaurio magno. CAP.

VII.

c Entaurium magnum aliqui Narcen vocant, alij Limnesion, alij Maronem, alij Pletroniam, alij Chironiam, alij Linnesion. Magi Herculis sanguinem, Romani fel terræ. Folia habet iuglandis, oblonga, viridi brassicarum colore, serrata in ambitu, caulē ceu rumicis, binum aut ternum cubitorum, multis ab radice adnatis, in quibus capita ceu Papauerum, in rotunditate oblonga, flos cæruleus, semē Cnico simile, floccis quibusdam inuolutū. Radix crassa, grauis, solida, tripedalis, succo prægnans, cum adstrictione aliqua & dulcedine acris, & rubescēs. Amat solum pingue & apriçū, ac syluas & colles. Copiosissima est in Lycia & Peloponneso, in Arcadia, Helide & Messenia, pluribusq; locis circa Pholoen, Lyciam & Smyrnam. Radix cōuenit ruptis, cōuulsis, pleuriticis, halitus difficultati, veteri tussi. Sanguinē expuentibus, drachmis duabus trita datur, si febris sit, in aqua, cæteris in vino. Itē ad tormina & vuluæ dolores. Ramēta eius in collyrij formā vuluæ subdita, mēses atq; partus extrahūt. Succus eadē præstat. Vulneribus prodest. Nam recens tusa, aut arida ante madefacta, ea glatinat & coniūgit. Carnes coalescūt, si tusa simul decoquatur. In Lycia succū exprimunt, quo pro lytio vtuntur. Panacia appellata est, quoniam omnia mitiget vitia, quæ inflammationem minantur, plurimisq; scateat remedijs. Pulsationes vulnerum, vrinæ stillicidia, calculosorum cruciatus, clystere immissa sedat. Legitur matutinis sole ad ortum spectante, hora diei pura cum omnia cōplentur.

DE MEDICINALI MATERIA

De Centaurio minore. CAP. VIII.

Entaurium minus aliqui Limneshion, alij Elleboriten, alij
 c Amaranton, Magi herculis sanguinem, Latini febrifugam,
 alij Auram, multi radicē, Daci Tulbellam appellant. Limne-
 shion aliqui vocauere, quoniam rigua amet loca. Hærbæ origani aut hy-
 perici similis, caule anguloso, palium excedente, flore lychnidis, e pu-
 niceo in purpuram vergente, folijs rutæ prælongis & paruis, fructu tri-
 tico simili, radice pusilla, læui, & superuacua, quæ gustanti amaritudi-
 nem adfert. Hærbæ recens tusa, suo illitu vulnera conglutinat. Vetera
 vlcera purgat & cicatrice obducit. Bilem crassosq; humores per aluū
 exigit, si decocta deuoretur. Ius decocti ischiadicis conuenientissime
 infunditur. Trahit enim sanguinem & dolorem leuat. Succus oculo-
 rum medicamentis perq; utilis. Siquidem cum melle caliginem oculo-
 rum expurgat. In vellere appositus, menses & partus extrahit. Epos-
 tus peculiariter neruorum vitijs succurrit. Legitur semine prægnans,
 & diebus quinque madefacta, decoquitur donec superemineat aqua.
 Mox ubi refrixit lintheo exprimitur. Et eiecta hærbæ, iterum deco-
 quitur, vsq; dum mellis crassitudinem habeat. Nonnulli eam recentē
 grauidamq; contundunt, atq; succum fistili non picato exprimunt, &
 in sole lignea rude assidue mouentes, inspissant. Quod si quid concre-
 tū faucibus vasis adhærescat, deradunt, reliquoq; humori permiscent.
 Noctu diligenter operiunt. Namq; ros nocturnus, liquores coalesce-
 re non finit. Quæ autem siccis radicibus aut hærbis liquamētā expri-
 muntur, decocta vt in Gentianæ mentione retulimus, præparantur.
 Sed quæ ex corticibus humidis, aut contusis hærbis factitantur, in so-
 le, vt ante dictum est, coguntur. Sic e Tapfia, sic e Mandragora, reli-
 quisq; similibus succus, sic ex acerbis vuis melligo elicitur. Lycium ta-
 men & absinthium, hypocistis & consimilia, decocta eo quo diximus
 modo coguntur.

De Chamæleone albo. CAP. IX.

Hamæleo albus quibusdā Chrysisceptron, alijs Ixia, Roma-
 c nis cardus varin⁹, Aegyptijs Ephear dicitur, alijs Ephtho-
 sechin. Ixiam ideo aliqui vocauere, q; quibusdā in locis vis-
 scum circa radicem inueniatur. Quo pro mastichæ vtuntur mulieres.
 Folia habet sylibo aut carduo similia, asperiora, acutiora, nigroq; cha-
 mæleone validiora. Caulem non promit. Verū ex medio spinas Echii
 ni marini, aut Cinnaræ modo, erigit. Flores purpureos veluti pappo-
 rum lanugines emittit. Semen Cnici simile, Radicē in latis collibus
 crassam, in montosis verograciliorem, in profundo albam, aliquatenus
 aromaticam, graui odore, dulcē. Quæ pota acetabuli mensura, latas

*Quoniam in Ixia et ex
 suis et ex radicibus ex p
 met*

interaneorum tineas pellit. Bibitur autem in vino austero cum Origani feruēfacti succo. Hydropicis commodissime drachma in vino datur. Etenim eos extenuat. Contra difficultatem urinae decoctum propinatur. Hausta in vino serpentium venenis resistit. Occidit canes & fues. Mures item necat subacta cum polenta aut aqua, & oleo madefacta.

De Chamæleon nigro. CAP. X.

c Chamæleo niger quem Pancarpon aliqui, alij Vlophonon, alij Ixiam, alij Cynomazon, alij Ocimoides, alij Cnidion coccon, alij Cynoxyllon, Latini Carduum nigrum aut vernilaginē, Aegyptij Sobel vocant, folijs scolymo similis esset, nisi minora, tenuioraq; ac rubro distincta viderentur. Caulem emittit dodrantalem, crassitudine digitali, subrubrum & in umbella flores spinosos, tenues, hyacinthi æmulos, versicolores, radice crassa, nigra, densa, interdum exesa, quæ dissecta flavescit, & commanducata mordet. Prouenit in cæpestribus siccis, & cliuosis tractibus, & maritimis. Radix tripartita addito attramenti sutorij exiguo, cedrino oleo, & axungia, scabiem abigit. Eadem cum sibi sulphur & bitumen asciuit, & cocta in aceto illinitur, impetigines absterget. Decoctum collutione dentium dolorem mitigat. Cū pari pipere & cæra oblita radix, dolenti denti auxiliatur. Radice concisa & in aceto decocta dentes fouentur. Eos quoq; frangit, si scriptorio stylo feruēs admoueatur. Vitia cutis in facie, vitiliginēq; cum sulphure emendat. Erodentibus medicamentis ammiscetur. Phagedænas, tetraq; vlcera illitu sanat. Quare Chamæleo vocetur, a varietate foliorum euenit. Mutant enim cum terra colorem, hic viridia, illic albicantia, aliubi cærulea, nonnullq; rubra inueniuntur.

De Crocodilio. CAP. XI.

c Rocodilion chamæleontis nigri figuram habet. Nascitur in syluosis, radice longa, læui, aliquantū lata, odore vt nasturcij acuto. Feruēfacta in aqua & pota radix, sanguinem copiosum per nareis pellit. Datur lienosis, eos euidenter adiuuans. Semen crotundum inest, duplex vt scutum, Quod suapte vi urinam ciet.

De Labro veneris seu dipsaco. CAP. XII.

d Ipsacum aliqui Crocodilion vocant, alij Chamæleonem, alij Onocandion, alij Veneris Lauacrum, Romani labrum veneris, alij carduum veneris, Aegyptij Sefeneor, alij Chir, alij Meleta, Daci Sciaram. Aculeatarum generis est. Caulem habet altū, spinis horridum, folia lactucæ, aculeata, prælonga, bullas intus & extra spinosas in dorsi medio, binis folijs geniculatim caulem amplectentibus, concauo alarum sinu, in quo imber aut ros asseruetur, vnde

DE MEDICINALI MATERIA

dipfaci quasi sitientis nomen traxit. In cacumine caulis, singula furculis capitula insunt, oblonga, echinata spinis, quæ arefacta cãdida spectantur, dissectaq; medullatenus, vermiculos ostendunt. Sanat rimas sedis fistulasq; si tusa & decocta in vino radix, vsq; dum sit crassitudo cæra, immitatur. Medicamentum ærea pixide recondendum. Aiunt for-
micationibus verrucisq; pensilibus remedio esse. Vermiculi capitulo-
rum in folliculo alligati, collo aut brachio appensi, produntur quarta-
nis febribus remedio esse.

De Spina alba. CAP. XIII.

Pina alba quam Agriocinnaram, alij Donacitin, alij Eryfi-
f sceptrum vocant, Romani Spinam albam, aut Regiam, alij
Cardum Ramptariũ. Nascitur in montibus & syluosis. Fo-
lia albi Chamæleonis, angustiora, & candidiora, aliquatũ hispida,
& aculeata, caulem supra bina cubita altum, digiti magni aut pollicis
crassitudine, albicantem, intus cauum. In cacumine capitulum inest spi-
nosum, echini marini æmulum, sed minus, & oblongum. Flores purpu-
rei, in quibus semen ceu Cnicum, sed rotundius. Huius radix pota, cœ-
liacis, stomachicis, & ijs qui cruenta extussiũt, efficax est. Vrinam cit.
Tumoribus illinitur. Decocto eius dentes in dolore collui prodest.
Epotum semen conuulsis infantibus, & a serpente demorsis auxilia-
tur. Gestatum pro amuleto serpentes abigere traditur.

De Spina arabica. CAP. XIII.

Rabica spinæ quæ Acanthis aliquibus dicitur, naturam al-
bae spinæ similem esse constat. Ipsa siquidem stringit. Ad
sanguinis reiectiones, mensium abundantiam, cæterasq; flu-
ationes radix etiamnum valet. Prouenit in asperis.

De Carduo. CAP. XV.

Arduus græce Scolymos, alias Pherusa, alias Pyracætha no-
minatur, in Aegypto Cnus. Folia Chamæleonis habet, aut
albæ spinæ, nigriora, & crassiora. Caulẽ longum ædit, folio-
sum, capite spinoso. Radice nigra & crassa, quæ illita graueolentiam
alarum totiusq; corporis emendat. Item si decocta in vino bibatur.
Copiosam autẽ vrinam sœtidamq; expellit. Hærbæ cum recens tene-
rescit, in olera asparagi modo transit.

De Poterio. CAP. XVI.

Oterium aliqui Phrynion, Iones Neurada, aliqui Acido-
ton vocat. Large fruticat, cortice obduetum tenui, spinis hor-
ridum, lanugine spissa, ramulis longis, mollibus, lentis, te-
nuibus, tragacanthæ proximis, folijs paruis, rotundis, flore exiguo,
cãdidi coloris. Seminis nulli vsus, sed gustu acuto & odorato. Nasci-

tur in aquosis & collibus. Radices demittit binum ternumve cubito-
rum neruofas, & firmas. Quæ proxime terram recisæ dant succum gū-
mi similem. Tufæ præcisus neruis & vulneribus glutinandis illinitur.
Decoctum quoq; eius neruorum affectibus prodest.

De Acanthio.

CAP.

XVII.

a Canthium albæ spinæ simile, folijs aculeatis per extrema-
tes, & lanugine araneosa obductis, quæ collecta & in vnum
aceruata bomicis effigiem præbent. Folia vel radices ad re-
media opisthotoni bibuntur.

De Acantha.

CAP.

XVIII.

a Cantham aut Hærpacantham, quidam Melamphyllon, Ro-
mani Pederotam, aliqui Topiariam, alij Mamolariā, qui-
dam Cræpulam vocāt. Nascitur in hortis, petrosis & riguis.
Folia habet multo laetucaceis latiora, & longiora, Erucae diuifura ni-
gricantia, pingua, læuia. Caulē binum cubitorum digitali crassitudi-
ne, læuem prope verticem ex interuallis circūdatū foliolis paniculas
oblōgas referētibus, hyacinthi similibus. E quibus flos prodit albus,
semen oblongum, luteum, caput thyrsi specie. Radicibus nititur lon-
gis, mucosis, rubris, & glutinosis. Quæ vltis igni & luxatis artubus
illita subueniunt. Potæ vrinam ciunt, sed aluū cohibent. Ruptis, cō-
uulsis, tabem sentientibus, mire profunt.

De Sylvestris spina.

CAP.

XIX.

c St & sylvestris spina carduo similis, aculeata, breuior q̄ quæ
in hortis satiq; proueniat, Cuius radix ad eadem ad quæ su-
perior pollet.

De Anonide.

CAP.

XX.

a Nonis quam aliqui Onotida appellant, ramos habet fruti-
cosos, dodrante maiores, frequentibus geniculis cinctos, ca-
uis alarum multis, capitibus rotundis, folijs lenticulæ, pusil-
lis ad rutæ aut pratensis lotifolia accedentibus, subhirsutis, odoratis,
non iniucunde olentibus. Muria conditur anteq̄ spinosa fiat. Cibus
gratissima. Rami acutioribus spinis & veluti durioribus aculeis hor-
rent. Radicem mittit candidam. Quæ excalfacit & extenuat. Huius
cortex ex vino potus vrinam ciet. Calculos cōminuit. Margines vl-
cerum erodit. Radix cum decoquitur in posca, dolorem dentium col-
lutione mitigat. Decoctū eius potu hæmorrhoidas sanare creditur.

De Leucacantha.

CAP.

XXI.

l Eucacanthā quidā Polygonaton, alij Phyllon, alij Ischia-
da vocant, Romani Spinam albam. Radice cyperi valida
& amara. Quæ manducata dolorem dētium sedat. Veteri la-

DE MEDICINALI MATERIA

terum dolori, atq; ischiadicis prodest, decocto cyathis tribus ex vino potio. Eadem ruptis & cōuullis medetur. Radicis epotus succus eodem præbet effectus.

De Tragacantha. CAP. XXII.

t Ragacanthæ radix lata & lignosa summo cespite nititur, surculos humiles, robustos, latissime fundens, in quibus minuta folia nonnunq̃ tenuia exoriuntur, Quæ sub se spinas albas, reas & firmas oculunt. Est etiamnū Tragacantha lachryma quæ, vulnerata radice manans, concreuit. Præstat pellucens, gracilis, syncera & subdulcis. Cutis spiracula vt gūmi obstruit. Huius increbuit vsus ad oculorum medicamenta, ad tussim, exasperatas fauces, retusas voces, cæterasq; destillationes, cū melle in delinctu. Subdita quoq; liguæ liquefcit. In passo madefacta drachmæ pondere bibitur, contra renum dolorem, & vesicæ rosiones, mixto cornu cerui vsto & eloto, aut scissi aluminis momento.

De Eryngio. CAP. XXIII.

e Rynghon aliqui Eryngen, alij Caryon, alij Gorginion, alij hernion, alij origanū, chlounion, alij Myracāthon, alij Moly, Aegyptij Crobyson, Magi Siserton, Romani capitulū martis, Daci Sicupnoex. Hispani Centumcapita, Aphri Cherdam, alij Oriam Chloem, alij Chida appellant. Aculeatarum generis est. Cuius folia in principio, sale condita, in cibos recipiuntur. Lata autē sunt & extremo ambitu aspera, gustu aromatica, quæ cum adolefcunt per multas caulium prominentias spinose inhorrescunt. In quorum smmitatibus globosa capitula, durarum acutissimarumq; spinarum ambitu stellatim circumuallantur, quorū colos alias viridis, alias albus, interdum cæruleus inuenitur Radix oblonga, lata, foris nigra, interne candida, pollicis crassitudine, odorata. Nascitur in asperis & campestribus. Vin habet calfactoriam. Pota mēses & vrinas pellit. Tormina inflationesq; discutit. Contra iocinerum vitia, serpentū morsus, & hausta venena, cum vino prodest. Bibitur aduersus plurima, cum seminis pastinacæ drachma vna. Appensa illitave tubercula discutere proditur. Pota cum hydromelite radix, opisthotonicis & comitialibus medetur.

De Aloe. CAP. XXIIII.

a Loe aliquibus Amphibion, alijs Herminion, alijs Eryngion, alijs Tragoceros, Romanis Aloa, Barbaris Aloe dicitur. Cuius folium scyllæ similitudinem habet, crassum, pingue, latum, rotundum, retrorsus pandum. Folia vtrinq; gerit, ex obliquis spinosa, rariuscule striata, breuia. Caulis emittitur non dissimilis

antherico. Flos albus. Fructus hastulæ regiæ cognatus. Graui tota est odore, & gustu amarissima. Radice vna ceu palo in terram depacta. Plurima præpinguisq; in India gignitur, ex qua coactus succus adferatur. Nascitur etiam in Asia & Arabia, in insulis quibusdam & maritimis vt in Andro, minime succo extrahendo idonea, sed ad glutinanda vulnera sane q̃vtilis, si detrita illinatur. Duo succigenera. Quoddā harenosum, quod fidens crassamentum purissimæ esse videtur. Alterum ad iocineris imaginem vergit. Eligi debet syncæra, quæ nihil doli sensat, nitida, calculorum expers, rufi coloris, friabilis ac iocineris modo coacta, facile liquecēs, eximiæ amaritudinis. Improbatur nigra & fractu cōtumax. Gummi eam adulterant, quod depræhēditur gustu, amaritudine, & valido odore. Eoq; argumento q̃ digitis friata non ad minima vsq; frustra resoluitur. Nec desunt qui Acaciam immisceant. Natura eius est spissare exiccare, somnum allicere & corpora densare, aluū resolvere. Stomachum repurgat binum cochlearium mensura, in aqua frigida aut lacte pota. Sanguinis reiectiones sistit. Regium morbum purgat, tribus obolis ex aqua, aut drachmæ pondere in potu. Deuorata cum resina, aut cum aqua vel melle cocto sumpta, aluū soluit. Purgationis perfectæ causa tribus drachmis sumitur. Alijs purgatorijs medicaminibus ammixta, præstat vt minus stomachum infestent. Sicca glutinandis vulneribus inspargitur. Vlcera ad cicatricem perducit, cohibetq;. Eadē peculiariter exulceratis genitalibus medetur. Disrupta infantibus iūgit. Cōdylomata rimasq; sedis ex passo sanat. Hæmorrhoidum abundantiam & sanguinis eruptiones sistit. Pterigia ad cicatricem ducit. Liuores & insignita, ex melle tollit. Priuatim scabris lippitudines, pruriginēq; angulorum, permulcet. Dolorem capitis sedat temporibus & fronti illita, ex aceto & rosaceo. Capillum fluentem continet, cum vino. Tonillis, gingiuis, & omnibus oris vlcere ribus, cum melle & vino proficit. Oculorum medicamentis torretur, in munda & candenti testa, pennaq; subinde versatur, vt possit æqualiter torreri. Lauatur vt quod sit harenosissimū, tanq̃ inutile subsidat, & leue ac pinguisimum assumatur.

De Absinthio.

CAP.

XXV.

Bsinthiū aliqui Bathy picron, Aegyptij Somi. Romani absinthiū. Herba vulgo cognita. Præstātius in ponto & Capadocia. In monte Tauro nascitur. Vim habet calfaciendi & adstringendi. Bilem expurgat, quæ & stomacho & ventri inhæsit. Vrinam cit. Crapulam præsumptum arcet. Ad inflationes ventris, & stomachi dolores prodest, cum fefeli & nardo gallico potum. Fastidia discutit. Arquatos sanat madefacti dilutū, aut decocti ius, cotidie

DE MEDICINALI MATERIA

tribus cyathis haustum. Menfes cit potum, aut cū melle appositum. Contra fungorum strangulationes cōuenienter ex aceto bibitur. Ad uersatur ixiæ venenis cū vino. Itē cicutæ, & muris aranei morfibus, & draconi marino. Anginæ eo cum melle & nitro perunguntur, & epinyctides ex aqua. Ad sugillata & oculorū caligines ex melle illinitur. Item auribus si manat sanies. Dentium auriumq; dolores decoctū vaporis suffitu compescit. Decoctum in passo dolentibus oculis oblinitur. Item præcordijs & iocineri, tritum cū cærato cyprino. Stomacho quoq; longa valetudine laborāti cū rosaceo. Cum ficis autem, aceto & erui farina, aquæ inter cutē lienosisq; subuenit. Vinum ex eo fit, quod absinthiten vocāt, præsertim in Propontide & Thracia, quo ad antedicta vtuntur, cum febris carent. Alioquin in æstate propinant & acceptam huic vino incolumitatem referunt. In parsum arcis Absinthium, vestes ab erodentiū iniuria vindicat. Culices eo & oleo perunctis abigit, & a corpore arcet. Atramentum librarium dilutius temperatum, literas a murium erosione tuetur. Existimatur liquamentum eisdem præstare effectus. Attamen potionibus improbat, quoniam stomachum male habet, & capitis ciet dolorem. Sunt qui cocta Amurca liquamentum adulterant.

*Absinthium parum in stomacho
causam morbi.*

De Marino Absinthio. CAP. XXVI.

Bsinthium marinū quod aliqui Seriphum, Latini Centoniscum vocant, copiosissimum in Tauro mōte, iuxta Cappadociā & in Taphysiri Aegypti gignitur. Quo Asiatici pro Oliuæ ramo vtūtur. Hæra est tenuis, Abrotoni parui similitudine, referta minutulis seminibus, subamara, stomacho inimica. Ea grauius ter olet, & cum quadam calfactione adstringit. Id per sese aut cū Oryza coctum interaneorum animalia, teretesq; tineas, adiecto melle enecat. Aluū laeuigat. Cum edulio autem vel lenticula decoctum eadem præstare potest. Pecora maxime pinguescunt hoc pabulo. Tertium genus absinthio assignatur, quo Galatia alpibus finitima scatet. Id patrio nomine Santonicum vocant, regionis in qua nascitur cognomento, absinthio non dissimile, verum subamarum est, non adeo seminis fecundum. Eadem quæ Seriphium potest.

De Abrotono. CAP. XXVII.

Brotonum alij Abutonon, alij Absinthium, alij Heraclion, alij Cholopæon, alij Absinthiomenon, alij Theliphthoricon, alij Procampylon, Magi Neura phœnicos, alij Cynanchiten, Romani Absinthium ponticū, nonnulli Thelythamnum, alij Glycyn ancona vocant. Duorum est generum. Fœmina quadam arboris specie fruticans candicat, circum ramulos folijs seriphi modo mi-

Absinthium pomum

nutin incis. Floribus referta est, comantibus in summo fulgore auri corymbis. Quod per æstatem prodijt, suauiter olet, cū grauitate quadam & amaro gustu. Id genus Siculum esse constat. Alterum mas vocatur, sarmentosum, tenui semine vti Absinthium. Plurimum in Capadocia gignitur & Galatia Asiatica, atq; in Syria Hierapoli. Crūdū semen, tritū & feruescēt ex aqua, in potu auxiliatur, orthopnoicis, conuulsis, ruptis, coxendicibus, vrinæ angustijs, mensibus suppressis, aut remorantibus. In vino potum exitialium venenorum antidotum est. Rigoribus ex oleo illinitur. Serpētes & substratu & nidore fugat. Contra idus eorum cum vino potum prodest. Priuatim efficax contra scorpionum & phalangiorum venena. Oculorum inflammationibus commodè illinitur, cum cotoneo cocto aut pane. Tritum cum farina hordeacea, decoctumq; tubercula discutit. Irini compositionibus ammiscetur.

Absinth. Sicul. laetum.
coctum. int.

De Hyssopo.

CAP. XXVIII.

h yssopum aliqui Later vocāt, alij Cassialam, Aegyptij Pelsalem. Herba nulli non cognita. Duū generū est, montanū & hortense. Optimum est Ciliciū. Vim habet extenuādi & calfaciendi. Decoctum cū ficis, aqua, melle, & ruta, potūq; peripneumonici, diurnæ tussi, suspiriosis, destillationibus & orthopnoicis auxiliatur. Tineas enecat. Idem facit si cum melle delingatur. Crassum humorem per aluum extrahit, decoctum ex aceto mulso epotum. Ad subducendam aluum cum ficis viridibus detritis mādatur. Vehementius addita Iri, Cardamomo, aut Irione deiicit. Colorē in corpore fouet. Lienī, & aquæ inter cutem, cum fico nitroq; inflammationibus quoq; ex vino illinitur. Cum feruente aqua impositum sugillata discutit. Cū decocto ficorum optime anginis gargarizatur. Decoctum cum aceto dentium dolorem in collutione sedat. Inflationes auricularum vaporis suffitu discutit.

De Stichade.

CAP. XXIX.

f Tichas quam aliqui Syncliopa, alij Alcibiadem, alij Pancration, nonnulli Styphoniam, Aegyptij Suphlo, Magi Pythionis oculum, Romani Sciolebinam vocitant, iuxta Galliā in insulis eiusdem nominis, e regione Massilia gignitur, vnde cognomentū accepit. Herba tenui semine, coma Thymi, longiore folio, subamara gustu, & aliquantum acris. Cuius decoctum Hyssopi modo ad pectoris vitia efficax est. Antidotis miscetur. Viscera omnia & vniuersum animantis habitum extenuat.

i. j.

DE MEDICINALI MATERIA

De Origano.

CAP.

XXX.

Riganum Heracleoticum, quod & Cornelion vocant, foliū
o habet hyssopo non dissimile, vmbellamq; non in rotæ specie
orbiculatam, sed veluti multifidam, semine in summis virgis
haudquaquam denso. Excalfacit. Vnde decoctum cum vino potum
demorsis a serpente conuenit. Si cicutam aut meconion hauserunt, ex
passo, si gipsum aut ephemeron, ex aceto mulso propinatur. Ruptis,
conuulsis, hydropicis cum fico esui datur. Aridum acetabuli mensura
potum in aqua multa, atros humores per aluum extrahit. Menses ciet,
& tussi cum melle linctum medetur. Ad pruriginem, psoras, regiumq;
morbū decocti ius in balneis prodest. Succus virentis tōfillas, vuā,
& oris vlcera sanat. Et per nares ex oleo irino infusum trahit. Auriū
dolores cum lacte mulcet. Cōficitur ex eo & cepis & rhois frutice quo
ad obsonia vtuntur, vomitorium medicamentum, his omnibus in cu-
preo vase per tricenos dies insolatis, dū caniculæ sydus flagrat. Hære-
bæ autem substratu serpentes fugantur.

De Onitide.

CAP.

XXXI.

Væ Onitis appellatur, cādidior est folio, nō dissimilis hyss-
q opo. Semen veluti coniunctos corymbos habet. Vis ei Ori-
gani Heraclei, sed multo inefficacior.

De Syluestri Origano.

CAP.

XXXII.

Syluestre Origanum aliqui Panaces heraclion, alij Cunylam
f vocant, ex quibus est Nicāder Colophonius. Folijs est Ori-
gani, ramis tenuibus palmum altis in quibus vmbellæ anethi
insunt. Flores candidi. Radix tenuis, superuacua. Peculiariter percus-
sis a serpente, folia & flores ex vino poti, auxliantur.

De Tragorigano.

CAP.

XXXIII.

Tragoriganū tenuis frutex est, syluestri Serpyllo aut Origa-
no similis, folio & ramulis. Quibusdam in locis virentius
inuenitur, & latioribus folijs, satis glutinosum. Alterū exili-
bus surculis, ac tenuibus folijs, quod aliqui prassium vocauerunt. Opti-
mum est Ciliciū, & Cretense, & Smyrneum, & in Chio Cooq; proue-
niens. Omnia excalfaciunt. Vrinam cient. Aluo accommodatur. De-
cocto potu bilem deijciunt. Lienosis ex aceto bibere prodest. Contra
pota ixiæ venena in vino bibuntur. Menses trahunt. Peripneumoni-
cis, tussientibus, ex melle in eclegmate dantur. Grata ac mitis eorū po-
tio est. Quare cibum fastidientibus, & stomacho acide ruḡanti, imbe-
cilloq; traditur. Item si a maritima iactatione nausea & æstus præcor-
diorum excitetur. Tumores vero cum polenta discutiunt.

De Pulegio. CAP. XXXIII.

g Lichona Græci aut blechra, alij Arscāthra, Latini Pulegium vocant, Galli Aluolum, Aphri Apoleiū, Quidam Galisopsim. Hæba vulgaris notitiæ. Extenuat, calfacit, decoquit. Menstrua, secundas, ac partus eiicit. Pulmonis vitia ex melle & aloepotum extrahit. Cōuulsis auxiliatur. Nauseas stomachiq; intercisiones, ex posca permulcet. Atram bilem per aluū exigit. Bibitur in vino vtilissime contra serpentium morsus. Defectos animo recreat, cum aceto naribus obiectum. Gingiuas arefacti cinere corroborat. Illitum cum polenta inflammationes omneis sedat. Podagris per se subuenit, impositum vsq; dum rubescat locus. Cum cærato varos extinguit. Lienosis cum sale vtiliter illinitur. Decoctum eius ablutas pruriges mitigat. Conuersas vuluas corrigit. Cōtra inflationes duriciasq; vuluæ, in deflectiones cōueniēter adiicitur. Vocant aliqui Blechra, quoniam dum floret gustatum a pecoribus, balatum concitat.

De Didamo. CAP. XXXV.

d Idamum, aliquibus sylvestre Pulegium vocatur, alijs Embastron, alijs Belouacos, alijs Artemedeion, alijs Cretica, quibusdam Ephemeron, nonnullis Eldia, aliquibus Belotoscos, aut Dorcidion, aut Helbunion, Romanis Vstilago rustica. Cretensis hæba est, acris, læuis, Pulegio similis, sed maioribus folijs, quæ tomento quodam spissaq; lanugine pubescunt. Florem nullum aut semen profert. Præstat omnia quæ satium Pulegiū, sed efficacius multo. Nō potum modo sed appositum quoq; aut suffitum, defunctos partus eiicit. Prodent in Creta capras sagittis percussas, huius hæbæ passu, eas excutere. Purgandi vim habet succus illitus, aut cum polenta tritus. Hæba impados pedibus reliquove corpori aculeos, illitu refugit. Ad lienis dolorem efficax habetur. Siquidem ipsum imminuit. Metunt semen æstate & autumno. Radix eius gustu calfacit. Partus accelerat. Succus cum vino potus, contra serpentium morsus præsidio est. Tāta hæbæ facultas est, vt olfacta abigat bestias, quæ venenato ictu sæuiunt, appensaq; exanimet. Vulneribus ferro illatis, & venenatis moribus, infusus succus præsentaneo est remedio, si etiam ab insillatione statim in potu assumatur.

De Pseudodidamo. CAP. XXXVI.

q Vod pseudodidamum vocant, multis in terris nascitur ante dido simile, sed minus q̄ illud acre. Eisdem effectus præbet, Sed inefficacius multo.

i. ij.

DE MEDICINALI MATERIA

De Cretensi Dictamo. CAP. XXXVII.

d Efertur a Creta alterū Dictami genus, folijs Sifymbrij, ramis maioribus. In quibus flores sylvestris Origani, nigri, molles. Odor foliorū iter Sifymbriū & saluiā iucūdisissimus. Efficax ad eadē, sed vehementius nares ferit. Miscetur emplastris & medicaminibus quæ aduersus serpētium iniurias cōfingūtur, theriaca vocant.

De Saluia. CAP. XXXVIII.

e Lelisphacō alij Elaphoboscon, aliqui Phaçon, alij Ciosmin, alij Phagnon, Aegyptij Becion, Romani Saluiā vocāt. Frutex est ramosus, lōgus, virgas habēs quadrangulas, & canas. Folia mali coronei effigie, sed longiora, asperiora, crassiora, & quæ sensim attritā quasi vestīū scabriciē referant, hirsuta, subalbida, perq̃ iucūdo odore, sed graui. Semen summis in caulibus sylvestri Ormino simile gerit. In asperis nascitur. Menses cit & vrinas decoctū foliorū ramorūq̃ potū. Partus extrahit. Pastinacæ marinæ idibus auxiliatur. Capillos denigrat. Vulnerū sanguinem cohibet. Tetra vlcera purgat. Testiū pruritus sedant rami foliaq̃, si decocto eorum foueantur.

De Menta. CAP. XXXIX.

h Edyosmon fatiū alij Minthā, alij Calaminthan, Latini Mētam vocant, alij Nepetā, Aegyptij Tis, alij Perxo, alij Macetho. Cognita hærba est. Calfaciendi, adstringēdi atq̃ exiccandi vim habet. Sistit sanguinē potō ex aceto succo. Tineas in ventre teretes enecat. Venerē stimulat. Singultus, vomitiones, cholerasq̃ sedant, terni ramuli cū acidi granati succo poti. Suppurationes discutit, si cum polēta illinatur. Imposita fronti capitis dolores mulcet. Māmas si tendantur, aut lacte turgeant, compescit. Cū sale canū moribus illinitur. Auriū doloribus cū aqua mulsa subuenit. Vuluæ ante coitū admota, conceptioni resistit. Linguae scabriciē cōfricta læuigat. Coire lac densariq̃ in caseū nō patitur, si folia potionibus lactis immergātur. In sūma stomacho vtilis est. Et in condimētis peculiare gratiā habet.

De Mentastro. CAP. XL.

f ylvestrem Mentam Latini Mentastrum vocant, hirsutiore folio, & prorsus maiore q̃ Sifymbrij, grauiori odore. Quare minus ad sanorum vsus expetitur.

De Calamintha. CAP. XLI.

e Calaminthæ generibus, quædam montibus familiaris, folia Ocimi habens, incana, surculos aridos, & caules angulosos, purpureum florem. Altera Pulegio similis est, sed maior. Quam sylvestre Pulegium ideo appellarunt, q̃ odore ipsum æmuletur. Nepetam Latini vocitant. Tertia Mentastro cognata est, folijs

oblongioribus, caule & ramis maioribus q̄ superioris, sed viribus inefficacior. Omnium folia gustu feruentia & acria. Radix superuacua. Nascitur in cāpestribus, asperis, & aquosis. Potu aut illitu de morbis a serpente opitulatur. Decoctum potu menses & vrinas expellit. Ruptis cōuulsis, orthopnææ, torminibus, cholera, rigoribusq̄ auxiliatur. Regium morbum expurgat. Præsumpta in vino venenis resistit. Tineas cæteraq̄ interaneorū animalia, cū sale & melle pota, enecat. Necsecus cocta crudave si teratur. Elephāticos esitata adiuuat, si postea serū lactis ebibatur. Folia detrita si in vellere subijciuntur, menses extrahunt, & partus enecant. Accensa aut substrata serpētes fugāt. Nigris cicatricibus candorem reddunt, in vino cocta & illita. Sugillata tollunt. Calamintha ischiadicis imponitur vt concretum humorem euocet summam cutem exurens. Vermes necat succus auribus instillatus.

De Thymo.

CAP.

XLII.

Hymon quidā Cephaloton, alij Epithymum, alij Thyrsion, Latini Thymum, Aegyptij Stephanen, Daci Mosulam. Thymum ab omnibus cognoscitur, surculosus frutex, exilibus folijs & angustis circūdatus, capitulis in cacumine flore purpureo refertis. Gracili solo & petroso prouenit. Vim habet hanc, vt cū sale & aceto potum, pituitā per aluū detrahat. Decocti ius prodest orthopnoicis, & anhelatoribus. Tineas ventris exigit. Menses, partus, & secundas pellit. Vrinas ciet. Cū melle in eclegmate faciles facit excreationes. Recētes tumores discutit cū aceto illitū. Concretum sanguinem dissoluit. Verrucas thymi colorem reddentes, pensilesq̄ tollit. Ischiadicis cum vino & polenta impositum subuenit. Hebetibus oculis in cibo prodest. Perq̄ vtile pro condimento, dumtaxat ad vsus eorum, qui recte valent.

De Satureia.

CAP.

XLIII.

Atureia nota est. Gignitur in asperis locis & tenui solo, Thymo similis, minor tamen & tenerior. Desert spicam florū plenam, diuq̄ permanentem. Eadē potest quæ Thymum, si modo consimili sumptitetur. Aptus sanis vsus. Est etiamnum quædam satiuia, syluestri prorsus minor, quæ propter mitiorem acrimoniā commodius in cibos recepta est.

De Serpyllo.

CAP.

XLIIII.

Erpyllum aliqui zygin syluestre, alij Polion vocāt, Aegyptij Meruopyū, Latini Serpyllū. Duorū generū est. Hortensiuū odore Sampfucū imitatur, atq̄ in coronas addi solet. Cui a serpēdo nomē inditū est, quoniā si qua eius particula terrā attingat,

i. iij.

alij polion

DE MEDICINALI MATERIA

inibi radices demittet. Folia & ramulos Origani habet, sed candidiores. In maceris multo procarius assurgit. Sylvestre zygis appellatum non serpit, sed in altitudinem increfcit, ramulos ædēs tenues, furculosos, folijs reſertos lōgioribus q̄ Rutæ, & durioribus, angustis. Flores iucunde olent, gustanti acres. Radicis nullus vsus. Nascitur in petris fatuo efficacius, atq; magis exalfaciēs, & ad medendi vsū aptius. Menses trahit. Vrinā potu ciet. Torminibus, ruptis, vulſis & iocineſis inflammationibus, auxiliatur. Et aduersus serpentes potu illitue. Capitis dolores mulcet coctum adiecto rosaceo, & madefactū in aceto. Maxime vero Phreniticis & lethargicis conuenit. Cruentos vomitus sedat, succus drachmis quatuor ex aceto potus.

De Sampſuco.

CAP.

XLV.

Ampſucum aliqui nomināt Amaracū, alij Triphyllon, alij Agathides, alij Cnecion, alij Acapnon, Pythagoras Thrāben, Aegyptij Sopho, Armenij Myuron, Magi Ichrei asinum, aut Hecigonon Ifidis, Romani Maioranā. In Cypro & Cyziceno laudatissimū. Secundū sibi locū vendicauit Aegyptiū. Amaracum gens Sicula & Cyzicena appellat. Hæra est ramosa, per terrā repens, folijs eius calaminthæ quæ tenui folio cōstat, letophyllos appellatur, hirsutis & rotundis. Suauissimū odorem spirat, ideo coronis inferitur. Vis eius exalfaciens. Succus decocti potus conuenit incipiētibz hydropicis, & ijs quos urinae difficultas aut tormina excruciant. Illita ex melle arida folia, sugillata tollunt. Menses subdita in pello trahunt. Cōtra scorpionis ictū ex aceto & sale illinuntur. Luxa-
tis tumoribusq; cærato excepta imponuntur. Aduersus oculorum inflammationes, tumoresq; cum polline polentæ illini prodest. Acopis malagmatisq; calfaciendi gratia commiscetur.

De Sertula campana.

CAP.

XLVI.

Ertula cāpana laudatissima in Attica & Cyzico & Carthagine nata. Cuius color vicinus est croco, boni odoris. Nascitur & in campania circa Nola, colore in luteum languescēte, odore infirmo. Vim habet adstrictoriam. Inflammationē omnē emollit, præsertim quæ in oculis, vulua, sede aut testibus erūpat, si ex passo cocta illinatur. Interdum autē addito oui luteo affato, aut fœno græci farina, lini semine, aut polline, aut capitulis papaueris, intybo-
ve. Recentes meliceridas per se cū aqua, & vlcera manātia in capite, illita cum creta chia, vino, aut galla sanat. Stomachi dolores & cruda & cocta cū aliquo ex antedictis leuat. Doloribus aurium mitigandis cruda ex passo instillatur. In aceto aut rosaceo madefacta, capitis dolorem lenit.

LIBER TERTIVS

68

De Maro.

CAP.

XLVII.

Arum aliqui Origanida, aut Hysobrion vocant. Hæba co-
m gnita vulgo, surculosa, flore Origani, folijs multo cādidioribus,
flore odoratiore. Vim habet hysymbrio cōsimilem. Sub-
stringit enim & modice calfacit. Qua de causa illitu serpentia vlcera fi-
st. Et in calidas illitiones additur. Iuxta Magnesiā & Traleis copio-
sissima gignitur.

De Ocimaistro.

CAP.

XLVIII.

Cinos aut Aconos a Græcis dicitur ab alijs sylvestre basi-
a licum. Latinis Ocimaistrū tenui siccoq; ramulo hæba, Ocy-
mo similis, odorata. Sed hirsutior. Qua coronæ faciuntur. A
nonnullis olitoribus colitur. Menses & aluū pota fistit. Illita panos
ignemq; sacrum sanat.

De Baccharē.

CAP.

XLIX.

Acccharis hæba fruticosa, quæ in coronas additur. Cuius fo-
lia aspera sunt, media violæ & verbasci magnitudine. Cau-
b lis angulosus, cubiti altitudinem petens, adnatis appendici-
bus aliquantulum asperis, flore purpureo subalbicāte, odorato. Radi-
cibus veratro nigro similibus, quibus odor inest Cinnamomo proxi-
mus. Asperum squallidumq; solum amat. Radix in aqua decocta ru-
ptis, vulsis, præcipitatis, spirandi difficultati, salutaris. Item diurnæ
tussi & vrinæ difficili. Menses pellit. Contra serpentium morsus uti-
lissime datur in vino. Recens radix apposita partum extrahit. Puerpe-
ris eius decoctum in deflectionibus prodest. In diapsmata vtiliter in-
feritur, iucundi odoris gratia. Folia vtpote quæ adstringant, capitis
doloribus illitu prosunt. Oculorum inflammationibus, mammis tu-
mentibus a partu, ægilopijs incipientibus, ignibusq; sacris auxiliatur.
Odor somnum gignit.

De Ruta

CAP.

L.

Vta duplex, montana quam aliqui Rhyten montanam vo-
cant, et hortensis quam Aegyptij Epnubum, Syri Armala,
r alij Befasa, Aphri Churma. Mōtana sylvestrisq; acrior est &
in cibis dānata. Satiua vero quæ sub arbore ficus nascitur, magis in
cibos admittitur. Vtraq; vrit, calfacit, exulcerat. Vrinā ciet. Mēstrua
pellit. Aluum fistit potu cibove. Letalium medicamentorū antidotū
est, si semē ex vino acetabuli mēsurā ebibatur. Folia per se præsumpta,
aut cū nuce iuglāde aridisq; ficis, inefficaces venenorū vires reddunt.
Contra serpentes simili modo sumere conuenit. Genituram cibo po-
tue extinguit. Cum anetho sicco decocta, tormina sedat. Facit ad pe-
storis laterumq; dolores, difficultatem spirandi, tusses, pulmonis infla-
mationem, coxendicum articularumq; cruciatus, & rigores febrium
i .iiij.

DE MEDICINALI MATERIA

circuitu repetentes, pota vt antedictum est. Item ad inflationes coli, vuluæ, redig; intestini, decocta & imposita. Fœminas vuluæ strangu-
latu liberat, si a genitali sede tenus cum melle subijciatur. Feruēfacta
ex oleo & pota vëtris tineas excutit. Articularijs doloribus ex melle,
aquæ inter cutem cum ficis illinitur. Eisdem in potu auxiliatur, deco-
cta in vino ad dimidias parteis, & oblita. Cruda cōditaq; cibo, visus
aciem excitat. Dolores oculorum cum polenta lenit. Doloribus capi-
tis cum rosaceo & aceto illita auxiliatur. Profluentem naribus sangui-
nem sistit, trita & indita. Testiū inflammationibus cum laureis folijs
imposita, & eruptionibus papularum cum myrto & cærato prodest.
Cum pipere autem & nitro affricta, albæ vitiligini medetur. Cū eisdē
illita fornicationes tollit, & verrucas quæ thymi florem repræsentāt.
Contra impetigines cum alumine & melle vtilissime imponitur. Suc-
cus in mali punici calyce calfactus, aurium dolori efficaciter infundit-
tur. Hebetudinem oculi qui sensere, ruta cum fœniculi succo ac melle
peruncti iuantur. Ignem sacrum, vlcera quæ serpunt, aut in capite ma-
nant, cum aceto rosaceo & cerusa per sanat. Mansa Alliorū Ceparūq;
acrimoniam domat. Montana si copiosius estur interficit. Dum florē
promit & ad murias colligitur cutē inflat & rubore quodā inficit, cū
pruritu ac vehemēti inflāmatione. Oportet itaq; eā vnctis antea ma-
nibus & facie colligere. Tradunt succum gallinaceis pullis insparsum
feles arcere. Adijciunt eā quæ in Macedonia circa Olcimum amnem
prodeat, comedentes interimere. Mōtosus autem is locus, viperis sca-
tet. Semen eius potum cōtra intestina vitia efficax est. In antidota cō-
mode additur. Contra incontinentiam vrinæ tostum semen septenis
diebus potui datur. Radix huius montanum Moly vocatur. Sylue-
stris ruta satiuæ similis est. Prodest comitialibus & coxendicum do-
loribus. Menstrua mouet. Partus enecat. Actior est viribus q̄ hortē-
sis & validior. Syluestris vtpote noxia, cibis abdicatur.

De Syluestri Ruta. CAP. LI.

Vt am syluestrem aliqui appellant Hypericon, alij Andro-
sæmon, alij Coron, alij Chamæpityn, Romani Hedera-
lem, aut Centonalem, Aphri Churma semmaced. Odor sea-
minis resinofus est. Ideo chamæpitys aliquibus nominatur. Frutex
est furculosus, rubescēs. Folia rutæ figura, flores lutei, qui digitis triti
sanguineo succo manant. Vnde Androsæmon vocitarunt. Ramuli
subhirsuti. Siliquæ teretes hordei effigie, in quibus semen nigrum refi-
nam olens. Gignitur in cultis & asperis. Vrinam ciet. Menses apposi-
tu trahit. Pota cum vino quartana liberat. Folia cum semine ambustis
illitu medētur. Et diebus quadraginta epota ischiadicis sanant. Vocāt

etiamnum hoc modo sylvestrem Rutam, quod in Cappadocia & Galatia Asiae finitima Moly dicitur. Frutex est qui ab una radice multos emittit cauliculos. Folijs multo quam alterius Rutae longioribus, tenerioribusque, odore graui, flore candido, capitulis in cacumine paulo maioribus quam sativae Rutae, quae tribus maxime partibus constant. In quibus triangulum semen, subruustum, gustu amarum recluditur. Cuius est usus. Semen autumnno maturescit. Quod cum melle, vino, croco & feniculi succo, ac gallinaceo felle, teritur contra retusam oculorum aciem. Sunt qui eam Armalam vocent, Syri Befassan. Qui Cappadociam incolunt, Moly, quoniam quamdam cum Moly seruet similitudinem. Radice nigra, flore candido. In collibus & lato solo provenit.

De Moly.

CAP.

LII.

Oly aliqui sylvestre Leucoion appellant. Folia habet graminis, latiora, humi sparsa, Florem albae violae similem, sed minorem, lactei coloris. Caulem candidum quaternum cubitorum. In cuius cacumine inest aliquid quod Allij speciem referat. Radix parva, bulbosa, quae mirum in modum valet ad aperiendas vulvas, si trita cum irino unguento in pello subijciatur.

De Panace.

CAP.

LIII.

Anax nonnullis Heracleum dicitur. Ex quo Opopanax colligi solet. Plurima ex parte in Beotia & in Phocide Archadia nascitur. Ibique compendij causa studiose colitur. Folijs est asperis, in terra iacentibus, haerbaei coloris, ad ficulnea accedentibus, in ambitu quinquepartito diuisis. Caule ut ferulae altissimo, qui lanugine quadam incanescit. Folijs etiam minutioribus obsitus. Muscarijs ceu Anethi in cacumine. flore luteo, & semine odorato feruenteque. Radices habet multas ab origine una candidas, graue olentes, crassae corticis & amari. Nascitur in Cyrene Libyae, & Macedonia. Excipitur succus incisa radice, recenti caulium pullulatu. Ea candidum succum emittit, qui siccatus in summa cute croceum colorem contrahit. Effluentem autem succum excipiunt, folijs excavato solo stratis, quae siccata tolluntur. Simili modo caule messibus inciso, profluentem succum eximunt. Meliores ex radicibus albae, rigidae, & siccae, ingustabiles, aromaticae, feruentes gustu. Fructus ex media ferula cibo idoneus est. Sed ex agnatis stolonibus, ab usu cibario abhorret. Maxime in hoc succi genere probatur, quam amarissimus, interne albus, aut subfaluus foris ad croci colorem inclinans, laevis, pinguis, friabilis, statim in aqua eliquescent, graui odore. Niger improbatur ac mollis. Adulteratur ammoniaco aut cera. Sed syncari experimentum est, si digitis in aqua friatus resoluatur, & laetescat. Excalfacit, mollit, extenuat. Febrium rigoribus,

DE MEDICINALI MATERIA

vulvis, ruptis, laterum dolori, torminibus, stillicidio vrinæ conuenit. Contra veficæ scabiem ex aqua mulsæ aut vino bibitur. Menfes trahit. Fœtum enecat. Inflationes quæ vuluam male habent, duriciasq; ex melle impositus discutit. Ischiadicis illinitur. Ac opis & capitis medicaminibus ammiscetur. Carbunculos rumpit. Podagricis cum vua passa illitus subuenit. Doloꝛe dentium liberat, cauis inditus. Oculorum aciem excitat. Ex eo & pice optimum fit emplastrum contra bestiarum morsus, quæ in rabiem efferantur. Ramēta radiciſ vuluæ ad mota, partus extrahūt. Ad vetera vlcera efficacis est. Nudata ossa, corpore operit, si trita cum melle illinatur. Semen cum absinthio sumptū menses pellit. Cum Aristolochia prodest, aduersus animalia quæ venenum ei aculantur. Contra vuluæ strangulatus in vino bibitur.

De Panace Asclepij. CAP. LIIII.

Panax Asclepij caulem a solo emittit tenuem, cubitalem, geniculatum, maioribus q̄ fœniculi folijs, hirsutioribus, odoratis, aureo flore, acris, odorato, ex muscarijs depēdente. Radix parua est & tenuis. Auxiliarem vim habent flores & semina, contra vlcera, phagedænas & tubercula, si trita cum melle imponantur. Aduersus serpentes ex vino bibuntur, & cum oleo illinuntur. Aliqui panaces syluestre origanum vocant, alij Cunilam de qua in origani mentione diximus.

De Panace Chironio. CAP. LV.

Panaces, chironium in Pelio monte maxime prouenit. Foliū eius Amaraco simile. Flos aureus. Radix parua quæ non alte demittitur, gustu acris. Pota radix serpentium veneno resistit. Illita coma eadem præstat.

De Ligustico. CAP. LVI.

Ligusticum quod alij Panaciam, alij Panaces vocant, plurimum in Liguria nascitur, in monte Apennino alpibus cōtermino. Vnde nomen traxit. Panaces incolæ non ab re appellant, Quoniam & radice & caule heracleotico panaci simile fit, & viribus eisdem præditū. Gignitur in altissimis asperisq; montibus, ac vmbrosis, maxime iuxta riuos. Cauliculum fert anethi, geniculatum, tenuem, & in circuitu folia Sertulæ campanæ, molliora, odorata, prope verticem graciliora, & lōge magis diuisa. In cacumine muscarium, in quo semen dependet nigrum, durum, & oblōgum, fœniculo proximū, gustanti acre & Aroma olens. Radix cādida, heracleotici panacis similis, odorata. Radicis seminisq; vis excalectoris, concoquens. Prodest ad intestinos dolores, tumores, cōcoctiones. Item ad inflationes, præsertim quibus stomachus turgeat. Et contra serpentium ictus. Vri

nas & menses potu trahit. Eosdem præstat effectus apposita radix. Semen cum radice oxyporis & medicamentis decoquentibus ammiscetur. Stomacho perq̃ utile. Quare pro pipere vtuntur eo indigenæ ad obsonia. Adulteratur semine quodā simili. Quod facile gustu discernitur. Amarum enim est. Alij semen Fœniculi aut Sefelis ammiscentes Ligusticum dolo vitiant.

De Pastinaca.

CAP.

LVII.

Astinacam sylvestrem, aliqui Cerasconiam, vocant, Latini
p rusticam pastinacam, aliqui Carotam, Aegyptij Babubyr-
ron, Aphri Sichā. Folia Gingidij habet, latiora, subamara,
caulem rectum, scabrum. Umbellam similem Anethi, in qua flores in-
sunt candidi, & in medio purpureum quiddam, ferme croceum. Radix
digiti crassitudine, dodrantalis, odorata, quæ cocta manditur. Semen
potum vel impositum menstrua mouet. Ijs conuenit in potione, quos
vrinæ difficultas torquet, aut lateralis dolor excruciat, aut si aqua cu-
tem subijt. Serpentium moribus istibusq̃ prodest. Præsumentes eam
nullā affici iniuria a serpentibus traduntur. Conceptus adiuuat. Ra-
dix vrinam pellit. Venerem stimulat. Partus apposita eiicit. Folia tri-
ta & cum melle imposita phagedænas vlcera purgant. Satiua ad ea-
dem pollet, inefficacior tamen, & cibo aptior.

De Sefeli.

CAP.

LVIII.

Sefeli massiliense quod nonnulli Sphagnon vocant, folia Fœ-
f niculi habet, crassiora, caulē vegetiorem. Umbellam Anethi,
in qua semen oblongum, angulosum, degustanti acre. Radix
longa est, iucundi odoris. Semen & radix excalfaciendi vim habent.
Potu stranguriæ & orthopnœæ medentur. Suffocationibus mulierū
comitialibusq̃ profunt. Menses & partus trahunt. Ad omnia inter-
na mala pollent. Tussim veterem sanant. Semen cum vino potum con-
coquit & tormina discutit. Epialis febribus vtile. Contra perfrictio-
nes in itineribus, cum pipere & vino bibitur. Capris ceterisq̃ pecudi-
bus datur in potu, quo facilius suos fœtus enitantur.

De Aethiopico Sefeli.

CAP.

LIX.

Ethiopicū Sefeli quod Aegyptij Cyonū phricen vocāt, fo-
a lia habet Hederæ, minora & ad Periclymeni modū oblōga.
Frutex nigricat, palmitibus in bina cubita extēsis, ramis ses-
quipedalibus, capitulo Anethi. Semine in Tritici morē denso, nigro,
amaro, massiliensi odoratiore & acriore, multum suauis.

De Peloponnesi Sefeli.

CAP.

LX.

p Eloponnense folia habet Cicutæ, latiora, & crassiora. Caulē
supra massiliensis magnitudinem, ferulaceum, & latum in ca-

DE MEDICINALI MATERIA

cumine capitulum, in quo semen latius, odoratum, & carnosum pendet. Eisdem viribus præditum est. Nascitur in asperis, riguis & collibus. Inuenitur etiamnum in Ida monte.

De Cretico Sefeli. CAP. LXI.

Ordylum quod aliqui Creticum Sefeli vocant iuxta Ciliciam in Ameno monte nascitur, hærbula furculosa, semine duplici, rotundo, scutulorum effigie, odorato, subacri. Contra vrinæ difficultatem bibitur. Potu cit menses. Succo seminis caulisque viridis, ternis obolis ex passo decem diebus hausto, renes sanantur. Efficax est radix ad ciendas pectoris excreationes in delinctu cum melle.

De Sifone. CAP. LXII.

Ison exiguum semen est in Syria natum, Apio simile nigrum, feruens, oblongum. Contra lienis vitia bibitur. Vrinæ difficultatē potu emendat. Remoratos menses citat. Quo in conadimētis cum Cucurbita & aceto indigenæ vtuntur. In cacumine granula multa gerit.

De Aniso. CAP. LXIII.

Anisum semen paruum est in Syria natum, Apio simile est, magnum, feruens, oblongum. Contra lienē & vrinam quæ ægre redditur, bibere prodest. Retardatos menses pellit. Id incolæ ad condimenta usurpare solent, & cum Cucurbita in aceto decocta assumunt. Anisum in summa excalfacit, exiccat. Oris halitum iucundiores facit. Doloris leuamētum præstat. Vrinam ciēt. Aquam quæ subijt cutē dissipat. Potum sitim cohibet. Animalium venenis aduersatur. Valet ad inflationes aluumque. Alba foeminarum profluvia sistit. Lac ad mammas elicit. Venerem stimulat. Dolores capitis leuat suffitum naribus. Cum rosaceo tritum, instillatumque fractis auribus medetur. Melius semper recens, plenum, non fursurosum, odore præstans. Inter prima laudatum est Creticum. Proximum Aegyptium.

De Caro. CAP. LXIII.

Arum semen est vulgaris notitiæ. Excalfacit. Vrinam concitat. Stomacho vtile. Os commendat. Cōcoctionē adiuuat. Mistum antidotis & oxyporis Anisi vicem præbet. Radix cocta Pastinacæ modo manditur.

De Anetho. CAP. LXV.

Nethum quod estur, aliqui Polygida vocant, alij Anicetum, Magi Cyncephali geniturā, aut capillos, alij Mercurij semen, Latini Anethum, Aphri Sicciriam, Aegyptij Adracum. Daci Pulpum. Aridi anethi comæ seminisque decoctum, potu lac euocat. Inflationes & tormina sedat. Aluum vomitionesque sistit. Vrinæ

nas ciet. Singultus lenit. Oculorum aciem hebetat. Genituram restin-
guit assidue potum. Fœminis vuluæ malo opportunis ad defeffiones
vtile. Condylomata illitus eius cinis tollit.

De Cumino satiuo. CAP. LXVI.

Vminum satiuum ori gratū est. Sed multo magis Aethiopi-
c cum, quod Hippocrates regium appellauit. Secundum locū
tenet Aegyptium. Reliqua sequuntur. Prouenit in Galatia,
in Asia, Cilicia, & Theretia, & plerisq; alijs tractibus. Excalfacit, ad-
stringit, exiccat. Ad tormina inflationesq; conuenit, coctum & cū oleo
inditum, aut cum hordeacea farina illitum. Orthopnoicis datur in po-
sca. Demoris a serpente in vino. Testium collectionibus auxiliatur,
impositum cum vua passa, aut lolij farina cæratove. Mensium abun-
dantiam inhibet. Contritum autem in aceto & naribus obiectum, san-
guinis profluvia sistit. Colorem bibentium aut perunctorum mutat in
pallorem.

De Syluestri Cumino. CAP. LXVII.

Syluestre Cuminū siue syluaticum, plurimum efficaciusq; in
f Lycia & Galatiæ Asia, atq; Carthagine Hispaniæ gigni-
tur. Frutice paruo, dodrantali caule, ac tenui, quaternis aut
quinis folijs tenuibus, velutiferratis, & Gingidij diuisura. In cacumina
ne capitula quina aut fena habet, mollia, rotunda, in quibus est semen
acerosum, gustu satiuo acriore. Nascitur in collibus. Bibitur semen ex
aqua aduersus tormina inflationesq;. Item contra venenatas bestias
ex vino. Singultus ex aceto sedat. Stomacho vtile quē humor vexat.
Sugillata tollit, si manducatum cum melle & vua passa illinatur. Te-
stium inflammationibus, adiectis eisdem medetur. Est & aliud sylue-
stris Cumini genus, satiuo nō dissimile, quod a singulis floribus pen-
silia promit cornicula, in quibus semen est Melathio simile, Quod po-
tum omnium serpentium moribus præsidio est. Calculosis & ijs qui
vrinæ stillicidio vexantur, aut concretum sanguinem cum lotio red-
dunt auxiliatur. Sed Apij semen seruefactum postea bibendum est.

De Ammio. CAP. LXVIII.

Mmi Latini Ammium Alexādrinū, nonnulli Aethiopicū,
a quidam regium Cuminum appellant. Pleriq; diuersarum na-
turarū esse Aethiopicum Cuminum & Ammiū existimant.
Vulgo notū est, semen exile, multo minus Cumino, Origanum resis-
piens. Eligendum est purum, minime furfurosum. Vis ei excalfactoria,
feruens & exiccans. Facit ad tormina, vrinæ difficultatem, serpentium
ictus cum vino potum. Menstrua ciet. Miscetur derodentibus can-
tharidum medicamentis, quæ Ecdoria vocant, vt inde exortis vrinæ

DE MEDICINALI MATERIA

difficultatibus resistat. Sugillata cum melle tollit. Colorem potu aut illitu mutat in pallorem. Suffitum cum vua passa aut resina vuluas purgat.

De Coriano.

CAP.

LXIX.

Orium aut Corianum Aegyptij Ochion vocant. Vulgaris est notitia. Vim refrigeratorem habens. Quare illitum cum pane aut polëta, ignibus sacris, & vlceribus quæ serpunt medetur. Epinyctidas cum melle vel vua passa, testium inflammationes, carbunculosq; sanat. Cum faba fresa strumas & tubercula discutit. Tineas interaneorum expellit, semen cum passo potum. Genituram adauget. Largius tamen sumptum, mentem non sine periculo mouet. Quare continuo & copiosiore vsu abstinendum. Succus cum cerusa, spumave argenti, necnon aceto & rosaceo illitus, ardentes summæ cutis inflammationes emendat.

De Hieracia.

CAP.

LXX.

Hieracia magna, alijs Sonchites, Romanis Lampuca, Pœnis Sithileas, caulem emittit asperum, subrubrum, spinosum, cauum, folia, ex interuallis rariuscule diuisa, similia Soncho per ambitum, luteos flores in oblongis capitulis. Vim refrigerandi habet & modice substringendi. Vnde illita, stomacho æstuanti, inflammationibusq; prodest. Succus erosionem sorbitione mitigat. Hærbæ cum radice illita, vibratis a scorpione ictibus auxiliatur.

De Hieracia parua.

CAP.

LXXI.

Hieracia parua, quam aliqui Sonchiten, alij Entimon agrion, Romani Intybum syluestre vocant, folia ex interuallis habet diuisa in ambitu. Cauliculos teneros, virentes, in quibus lutei flores orbem circinantes emicant. Vim suam ad eadem ad quæ superior impendit.

De Apio

CAP.

LXXII.

Atium Apium ad eadem quæ Corianum conuenit. Inflammationibus oculorum cum pane aut polëta illinitur. Aestuantem stomachum mulcet. Mammæ duriciam reprimit. Vrinam ciet, siue crudum siue coctum edatur. Decoctum eius radicisq; potu, venenorum noxæ resistit, quum vomitiones excitet. Aluum cohibet. Semen vehementius vrinam pellit. Contra serpentium venena, aut epotam argenti spumam auxiliatur. Inflationes discutit. Ammisceatur medicamentis quæ dolorum leuameta præstant, Theriacis quoq; ac tussis remedijs.

De Eleofelino.

CAP.

LXXIII.

Eleofelinum quod a quibusdam Pedinon, ab alijs Hydrofelinon agrion, Romanis Apium rusticum appellatur. In

LIBER TERTIVS

78

humidis nascitur. Satiuo grandius & ad eadem efficax.

De Oreoselino.

CAP.

LXXIIII.

Reoselinon quod aliqui Petroselinon sylvestre appellant, o Aegyptij Anonim, caule est palmum alto, ab radice tenui ex-
eunte. Ramis & capitulis cicuta, multo tamen tenuioribus, semine cumini, oblongo, acri, & odorato, tenui. Nascitur in petrosis & montibus. Vrinam ciet semine ac radice in vino potis. Menfes trahit. Antidotis necnon medicamentis vrinam cientibus, & excalfactio-
rijs, inseritur. Nec hallucinari nos oportet existimantes oreoselinum esse, quod in saxis provenit. Aliud enim est Petroselinum.

De Petroselino.

CAP.

LXXV.

Etroselinum in Macedonia provenit, in prae-ruptis locis. Se-
mine Ammij, odoratiore, sapore acri, aroma olente. Vrinam p cit ac menstrua. Contra stomachi & coli inflationes & tor-
mina prodest. Laterum, renum, & vesicae doloribus in potu subuenit. Ammiscetur antidotis vrinam cientibus.

De Olusatro.

CAP.

LXXVI.

Ipposelinum aliqui Grielon, alij Agrioselinum, Latini Olu-
h satrum appellat, aliqui Smyrnion, quavis aliud sit, quod pro-
prie Smyrnion dicitur, vt paulo post referemus. Est autem maius, & satiuo apio candidius. Caule alto, cauo, molli, habente velu-
ti lineas. Folijs latioribus, in puniceum vergentibus, coma Rorisma-
rini. Dependentibus in cacumine corymbis, anteq̃ deflorescat. Ea semi-
ne turget nigro, oblongo, acri, solido, aromatico. Radix demittitur te-
nuis, odorata, candida, quae os commendat. In vmbrosis & palustri-
bus enascitur. Olerum generis vt Apium. Radix cruda coctave estur. Folia cum caulibus decocta maduntur, & per se aut cum piscibus praeparantur, crudaq̃ muria condiuntur. Vim hanc habet vt poto semi-
ne ex mulso vino menfes ciet. Rigentes calfacit potu aut illitu. Vri-
nae stillicidio auxiliatur. Radix eisdem praestat effectus.

De Smyrnio.

CAP.

LXXVII.

Myrnion quod in Cilicia Petroselinum vocant, passim in
f Amano monte gignitur. Caulem habet apij, & stolones mul-
tos, folia latiora, pingua, ad terram infracta, robusta, odore medicato, cum quadam acrimonia iucunda, colore in luteum langue-
scente. Capitibus caulium orbiculatis vt anethi. Semine brassicae, ro-
tundo, nigro, acri, myrrhae sapore. Ita vt alterum alterius loco cedat. Radix quoq̃ odorata, gustu acri. Fauces mordet, succosa, mollis. Cor-
tex eius foris niger, itus viridis aut subalbidus. Nascitur in saxosis et collibus, atq̃ squallidis, & limitibus terrenis. Vis radices, haerbae & se

DE MEDICINALI MATERIA

minis excalfacere. Folijs muria maceratis ad obsonia vtuntur. Aliud
fistunt. Radicem contra serpentium ictus bibere conuenit. Tusses &
orthopnoeas mitigat. Vrinæ difficultati medetur. Recentes tumores,
collectiones, duriciasq; discutit. Illita vulnera ad cicatricem perducit.
Partus abortu vitiat, si feruēfacta subiiciatur. Semen, lienis renum &
vesicæ vitijs prodest. Menses & secundas pellit. Cōmode datur ischi-
adicis in vino. Inflationes stomachi lenit. Sudores ciet & ruētus.
Semen peculiariter datur hydropicis in potu, & contra febrium cito
cuitus.

De Elaphobosco. CAP. LXXVIII.

g Ræci elaphoboscon, aliqui Elalphicon, alij Nephron, alij
Ophigenion, nonnulli Ophioctonon aliqui Herpyxen, alij
Limen vocant, Romani cerui ocellum, Aegyptij Chemin,
Aphri Aschancam. Fœniculaceus caulis est, aut Rorimarino similis,
geniculatus, folijs duum digitorum latitudine, vt Terebinthi prælon-
gis, aliquantum asperis, circumfractis. Adnata multa caulis habet fe-
rentia umbellas Anethi similes, & semina eiusdem, florem subluteum.
Radice ternum digitorum longitudinis, & crassitudinis vnus, candi-
da, dulcis, esui apta. Caulis tener pro olerē manditur. Contra serpen-
tium ictus, datur semen in vino. Fama autem est hoc pabulo, ceruas ser-
pentium moribus resistere.

De Fœniculo. CAP. LXXIX.

f Oniculus si hærba edatur aut semen cum ptisana bibatur,
inammās laetē replet. Comæ decoctum in renum doloribus
subditum proficit, quippe quod vrinam excitet. Contra ser-
pentium ictus in vino conuenienter bibitur. Menses ciet. In febribus
nauseam & stomachi feruorem, ex aqua frigida potum sedat. Contritæ
radices & cum melle illitæ, moribus canum medentur. Succus caule
& folijs exprimitur, & in sole siccatus in medicamenta adiicitur, quæ
ad excitandam oculorum aciem commodē temperantur. Extrahitur
etiā semine viridi ramulisq; & radicibus prima germinatione incisīs.
In Iberia succum reddit gummi similem. Caulē medium dum hær-
ba floret rustici demerunt, igniq; admouēt, quo facilius vi caloris exu-
dans, gummi remittat. Quod efficacius succo est ad medicamenta ocu-
lorum.

De Erratico fœniculo. CAP. LXXX.

g Ræci hippomarathrum, aliqui Marathin, alij Marathrum
agrion, Aegyptij Sampsoth, Magi Thymarnolion, Latini
fœniculum erraticum, aliqui Mion, Galli Sistrameor, Sylue-
stre est fœniculum, magnum. Fert autem semen Canchry simile. Cuius

radix iucunde olet, potaq; stranguriæ medetur. Menfes imposita ciet. Ventrem sistit, radice aut semine potio. Contra serpentium morsus auxiliatur. Calculos comminuit. Regiū morbum expurgat. Lactis abundantiam facit. Decoctum foliorum haustum, fœminas a partu purgat. Traditur aliud Hippomarathri genus longo exili & angusto folio, semine coriandri, rotundo, acri, & odorato. Excalfaciendi naturam habet, & viribus fœniculo respondet. Ad omnia infirmius.

De Dauco.

CAP. LXXXI.

Aucum aliqui Dircaum vocant. Creticum, folijs fœniculo simile, minoribus & tenuioribus, caule dodrantali, vmbella coriandri, flore albo, semine acri, candido, hirsuto, suauissimi odoris in mandendo. Radix digitali crassitudine & palmi longitudine adolescit. In saxosis nascitur, & locis sole illustratis. Aliud eius genus syluestri Apio simile, acre, odoratum, aroma olēs, feruētis gustus. Probatissimum Creticum. Tertium assignatur genus folijs coriandri, floribus albis, capite & semine anethi, muscario pastinacæ, semine oblongo ceu cumini, acri. Omnium semen excalfacit potum. Vrinam menses & partus extrahit. Torminibus liberat. Veterem tussim mitigat. Phalangiorum morsibus potum in vino auxiliatur, Tumores illitu discutit. Seminis dumtaxat in alijs generibus inualuit vsus. In Cretico etiam radice. Quæ maxime cōtra venenatorum iniuriam in vino bibitur.

De Delphinio.

CAP. LXXXII.

Elphiniū Græcis Diachysis, alijs Diachytos, alijs Paralyfis alijs Camarus, alijs Hyacinthus, alijs Delphinias, alijs Neariadion, aut Sotandron, aut Cronion, Romanis Bucinus minor vocitatur. Surculos emittit a radice vna sesquipedales, aut maiores, a quibus folia exeunt parua, tenuia, diuisa, prælonga, quæ Delphiniorum effigiem repræsentant. Vnde tractum nomen est. Flos violæ albæ nō dissimilis, purpureus, & semen in filiquis, milio proximū. Quo non aliud vtilius bibi potest, ab scorpione percussis. Aiunt enim obiecta hæc, scorpiones resolui atq; ignauos torpescere. Semota vero ea, sese recolligere. Prouenit in asperis & apricis.

De Altero Delphinio. CAP. LXXXIII.

Alterum est Delphiniū quod Romani Bucinum vocant, superioris simile, sed folijs & ramis longe gracilius. Viribus eisdem pollet, sed non ita efficacibus.

De Pyrethro.

CAP. LXXXIII.

Pyrethrum aliqui Dorycnion, alij Pyrinon, alij Pyroton aut Pyrothron, alij Arnon pyriten, Magi Pyriten, Romani

K. j.

DE MEDICINALI MATERIA

Saliuarem vocant. Folia caulemq; emittit vt Daucum syluestre & fœniculum, vmbellamq; Anethi circinatæ rotunditatis. Radix longa est pollicis crassitudine, gustu feruidissimo. Pituitam elicit. Ideo in dolore dentium decocta in aceto, colluto inde ore, auxiliatur. Mansa pituitam extrahit. Sudores ciet, peruncto ex oleo corpore. Diuturnis rigoribus efficax. Contra perfridiones membrorum, resolutio nescq; eximie conducit.

De Rosmarino.

CAP. LXXXV.

Vo Rosmarini genera. Alterum fructiferum, aliquibus zeada aut Campsanema appellatum. Cuius semen Canchrys vocatur. Folia fœniculi habet, crassiora & latiora, in rotæ speciem humi sparsa, iucunde olentia, caulem cubiti altitudine, aut maiorem, multis cōcauum alis. In cacumine vmbellam in qua semen copiosum, candidum, sphondylo simile, rotūdum, angulosum, refinaceum. Quod in mandendo linguam exurit. Radix thus redolet, candida, prægrandis. Est & alterum omnino confimile, semen ferens latum, nigrum vti sphondylion odoratū, minime exurens, radice foris nigra, intus alba. Verum id quod sterile dicitur illorū plane similitudinē refert. Sed neq; caulem neq; florem neq; semen promit. Nascitur in saxosis & asperis. Trita omnium hærba communiter hæmorrhoidum profluvia sistit. Sedis inflammationes & condylomata mitigat. Concoquit strumas & abcessus, qui ad maturationem ægre perducuntur. Siccæ radices cū melle vlcera purgant. Torminibus medentur cum vino potæ. Et contra serpentium morsus conueniunt. Menses & vrinas cient. Veteres tumores illitu discutiunt. Tam radice q̄ hærba succus adiecto melle illitus, oculorum aciem exacuit. Potum semen adeadem pollet. Si comitial malum sentiatur, aut vetus pectoris vitium, auxilio est. Regio morbo laborantibus cum vino & pipere datur. Sudores mouet cum oleo perunctum. Ruptis & conuulsis prodest. Podagris cum loliacea farina & aceto tritum illinitur. Purgat vitilignes, addito aceto q̄ acerrimo. Semine in potionibus vtendum, eius quidem quod Canchryn non ferat. Quippe illud sua acrimonia arteriam exasperat. Rosmarinum cum erica nasci, folijs laetucæ syluestris, asperioribus, candidioribusq; radice breui. Theophrastus author est. Potumq; idipsum alterutra parte purgare.

De Canchry.

CAP. LXXXVI.

Anchrys vim habet excalfaciendi & vehemēter exiccandi. Quare abstergētibus medicamentis inseritur. Cōtra oculorū fluctiones capiti illinitur, ita vt tertio die soluat.

De Rosmarino coronario. CAP. LXXXVII.

Osmarinū quo coronarij vtūtur, ramos mittit tenues, & circa eos folia minuta, densa, lōga, exilia, subter incana, superne virentia, graui odore. Excalfactoria vi præditum est. Regiū sanat morbum, si decoctum in aqua ante exercitationes bibatur, & vbi laborans exercitationi se crediderit, in balnea descendat, & merum potet. Acopis gleucinoq; vnguento ammisceri solet.

De Sphondylīo. CAP. LXXXVIII.

Phondylium aliqui Arangen vocant, alij Phalāgion, alij Astereion, nonnulli Nesyryn aut Sphōdylin, quidam Chorodanon, aut Oenanthen, Romani hārbam rutinalē, Aegyptij Apsaphear, Magi Osirin. Folia Platani & Panacis habet. Caulēs fœniculaceos, cubitali altitudine, aut amplius assurgentes, in quorum cacumine semē duplex Sefeli simile, sed latius, candidius & magis paleaceum, grauis odoris. Flores eius albi aut pallentes. Radice Raphani candida. Nascitur in palustribus & aquosis. Potum semen pituitam per aluum extrahit. Medetur iocineris vitijs, regio morbo, comitialibus, orthopnoicis, vuluarum strangulationi. Vternosos suffitu reuocat. Cum oleo cōmode infunditur capitibus phreniticorū, & lethargicorum, Item capitis doloribus. Cum ruta illitum serpentia vīcera cohibet. Datur radix contra regium morbum, & iocineris vitia. Circumrasa eadem callos fistularum derodit. Recentis floris succus exulceratis auribus, purulentisq; accommodatur. Qui cæterorum succorum more exprimi, dein recondi solet.

De Ferula. CAP. LXXXIX

Viridi Ferula medulla pota vtilis est ad cruentas excreationes, cœliacosq;. Contra viperarum morsus in vino datur. Erumpentem naribus sanguinem indita fistit. Semen porum torminosi auxiliatur. Sudores ciet vnto ex oleo corpore. Caules si edantur, capitis dolores faciunt. Muria condiuntur. Ferula itaq; caulem profert ternum sæpe cubitorum, folia fœniculi, longe asperiora, & latiora. Qua ab imo caule vulnerata, Sagapenum efficitur.

De Peucedano. CAP. XC.

Eucedanum aliqui Agrion vocant, alij Agriophyllon. Magi bonum dæmonem, Romani Satariam. Caulem emittit tenuem, gracilentum. Fœniculo similem. Comam habet.
K. ij.

DE MEDICINALI MATERIA

bet statim ab terra foliosam spissamq̃. Flore luteo, radice nigra, crassa, firma, graui odore, succosa. Gignitur in montibus opacis. Tenuis radix cultello conciditur, profluensq̃ e plaga succus ymbrae mandatur. In sole siquidem confestim euanescit. Colligitur capite prius & naribus rosaceo perfusis, ne capitis dolor premat, et vertigo sentiat. Assa-
ta radix vtilior fit: Tam lac quam succus radice & caulibus extra-
hi solet, sicuti e Mandragora. Verum inefficacior lacte succus ha-
betur, et velocius expirat. Interdum etiam concreta inuenitur lachry-
ma, thuris similitudine, caulibus radicibusq̃ adhærens. Præfertur suc-
cus e Sardonia & Samothrace, colore ruffo, odore graui, feruens gu-
stu. Ex oleo et rosaceo illitum potest lethargicis, phreniticis, vertigi-
nosis, comitialibus, & longis capitis doloribus, resolutis, ischiadicis,
conuulsis. Omnibus in vniuersum vitij nervorum, ex oleo & aceto
illitū prodest. Eius olfactu respirant vuluæ strangulatus, & veteri nosi
reuocantur. Incensum serpentes abigit. Aurium doloribus conuenien-
ter ex rosaceo instillatur. Cauernis dētium inditum, mitigat dolorem.
Cōtra tussim efficacissime ex ouo assumitur. Suspirijs, torminibus, &
inflationibus subuenit. Ventrem leniter emollit. Lienem absomit. Dif-
ficiles partus mire adiuuat. Facit ad vesicæ cruciatus, & renum disten-
siones potum. Vuluam aperit. Radix ad eadem vtilis est. Sed ineffica-
cior. Eius decoctum bibitur. Farina eius sordida vlcera purgat, & ve-
tera cicatrice obducit. Squamas ossium extrahit. In carata & calfa-
cientia malagmata additur. Eligi debet recens, esu difficile, firmū, odo-
ris plenum. Succus ad potiones amaris nucibus aut ruta aut pane cal-
lido aut anetho resoluitur.

De Gith seu Melanthio. CAP. XCII.

Iht ex Græcis aliqui Melanthiū, alij Mecona agrion mela-
na, Romani Papauer nigrum appellant. Exiguus frutex est
sæpe binos palmos excedens. Folijs vt Senetionis minutis,
sed multo tenuioribus. Capitulo in cacumine tenui, ceu papaueris ob-
longo, intercurfantibus intus membranis. Quibus semen includitur
nigrum, acre, odoratum, quod panibus inspargitur. Capitis dolori-
bus illitum fronti, subuenit. Discutit recentes oculorum suffusiones,
tritum ex Irino, & infusum naribus. Tollit lepras, lentigines, duricias,
tumoresq̃ vetustos cum aceto illitum. Circumscarificatos clauos excu-
tit cum vetere vino impositum. Dentium doloribus decoctum cum
aceto & teda prodest. Teretes ventris tineas expellit, peruncto ex
aqua vmbilico. Destillatione laborantes adiuuat, tritum in linteo
& olfactum. Vrinam & menstrua ciet, multis diebus sumptum.

Et lac extrahit. Difficultatem spirandi cum vino potum leuat. Phalangiorum moribus ex aqua drachmæ pondere haustum auxiliatur. Incenso serpentes fugantur. Tradunt largius epotum enecare.

De Laserpitio & Lasere. CAP. XCIII.

1 Aserpitium in Syria, Armenia, Media, & Libya nascitur, caule ferulaceo, quem Maspelum vocant. Folijs apio similibus, lato semine. Radix excalfacit. In cibis ægre concoquitur. Vesicæ noxia. Sugillatis illita cum oleo, & strumis, ac tuberculis cum cærato, medetur. Ischiadicis conuenit cum Irino aut cyprino cærato. Excrefcentibus circa sedem tollendis, illinitur cum putamine mali punici & aceto decocta. Venenis pota resistit. Os cõmendat, cibis aut sali permista. Laser e radice atq; caule scarificatis colligitur. Præfertur autem rufum, translucēs, myrrhæ æmulum, non porraceū, odore valens, suauis gustu. Quod dilutum facile albescit. Syrenaicum si quis degustarit, humorem toto corpore ciet, blādissimo odore, adeo vt ne os quidem gustanti nisi paululū spiret. Medicum & Syriacum minus viribus valent, & grauiorem reddunt odorem. Laser omne anteq̃ siccescat adulteratur sagapeno, aut fabæ lomēto. Quod maleficiū depræhenditur gustu, odore, visu, & madefactione. Caulē aliqui Silphion, radicem Magudarin, & folia Maspelon vocauere. Efficacissimum Laser, mox folia, postremo caulis. Acrē vim habet. Inflationes facit. Perundas cum aceto pipere & vino alopecias sanat. Oculorū aciem exacuit. Incipientes suffusiones, illitum cum melle dissipat. Cavernis dentium in dolore inditur, aut cum thure in linteo circumligatur, aut cū hyssopo ficis coctis in posca, os colluitur. Ijs prodest quos bestia in rabiem efferata momorderit, vulneribus immissum. Valet aduersus venena telorum, & animalia omnia, quæ virus eiaculantur, potum aut illitum. Scorpionum plagis oleo dilutum circumlinitur. Gangrænæ præcoercitis immittitur. Et cum ruta, nitro, & melle, vel per se carbunculis. Clauos callosq; prius circumrasos vellit. Cærato aut aridorum ficuum carne præmollitū, recentes Lychenas ex aceto sanat. Et excrefcentia in carne polyposq; si aliquot diebus cum attramento sutorio aut erugine illinatur. Extuberantia cum forfice extrahit. Veteribus faucium scabricijs opitulatur. Grauem subitoq; irrauescentem vocem, dilutum aqua sorbitione confestim expedit. Vuā illitum cum melle reprimit. Anginis ex aqua mulsā vtilissime gargariatur. Vescentes eo latiore colore mangonizat. Tussi commode in sorbili ouo datur, & pleuriticis in sorbitionibus. In fellis suffusione, & aqua inter cutem cum aridis ficis. Rigores discutit cum vino

K. iij.

DE MEDICINALI MATERIA

pipere & thure potum. Neruorum contractionibus opisthotonicisq;
datur oboli pondere deuorandum. Hærentes gulæ hirudines, gargarizatum cum aceto decutit. Ad lac intus coagulatum bibitur. Comitibus ex aceto mulso proficit. Menses ciet cum pipere & myrrha potū. Cæliacos adiuuat in acino vuæ sumptum. Cum lixiuio autem potui datum repente conuulsis ruptisq; prodest. Ad potiones resoluitur, nucibus amaris, aut ruta & calido pane. Foliorum succo ad eadem proficitur, sed multo inefficacius. Cum aceto mulso manditur, ad expediendam arteriam, maxime cum vox retunditur. Eo cum lactucis vtuntur, exitq; in vicē cruce. Fertur & altera Magudaris in Lybia nasci. Radix Laserpitio similis, sed minus crassa, acris & fungosa. Ex qua non profluit succus. Eiusdem cum lasere facultatis.

De Sagapenio. CAP. XCIIII.

Agapenium ferulaceæ herbæ succus est, quæ in Media nascitur. Optimum est translucens, fuluo forinsecus colore, & intus albo, nescio quid inter laser & galbanum redolens, gustu acri. Prodest laterum & pectoris doloribus, tussibus vetustis, conuulsis & ruptis. Crassam pulmonis pituitam expurgat. Datur comitialibus, opisthotonicis, lienosis. Item cōtra neruorum resolutionem, perfrictiones, & febrium circuitus in potu. In vnguenta probe admittitur. Menses pellit. Sed fœtum exanimat, cū hydromelite potum. Prodest ex vino haustum serpentium ictibus. Olfactum ex aceto vuluarū strangulatus excitat. Oculorum cicatrices, offusam caliginem, hebetudines, suffusionesq; detergit. Resoluitur succi modo, ruta, aqua, & amaribus nucibus, aut melle, aut calido pane.

De Euphorbio. CAP. XCV.

Euphorbia Libyca arbor est ferulæ speciē habens, quæ in monte Atlante iuxta Mauritaniā inuenitur. Ea acerrimo succo turget. Cuius eximiū feruorē expauescētes incolæ, ouillos vêtres elutos, arbori circūligant, & eminus caulē contis incidūt. Confectumq; e plaga perinde atq; vase quodā, in vêticulos copiosus lactis humor effluit, præter id quod sparsi in humū, vulnus eiacularur. Duo succi genera. Vnū Orobī magnitudine, sarcocolæ modo emicat. Alterū in vêticulis cōcrescit atq; vitreū spectatur. Eligendū est translucēs & acre. Euphorbiū adulterat sarcocollæ & glutini mstione. Sed difficile quidē experimētū. Quippe cū leui gustu, os accēsū diu detineat, adeo vt quicquid ori obijciatur plane Euphorbium respiciat. Eius inuentio tēpore Iubæ regis Libyæ cognita extitit. Succus illitu suffusiones discutit. Potus tota die exurit. Quare melli collyrijsq; pro acrimonia

niæ ratione ammisceri debet. Coxarum doloribus prodest in odorifera potione haustus. Squammas ossium eadem die eximit. Verum eo vtentes necesse est, linamentis aut cæratīs communire corpus, quo ossa conuestiuntur. Aliqui memoriæ prodiderunt, percussos a serpente nihil molesti passuros, si incisa osse tenus capitis cute, intritus succus infundatur, vulnusq; postea consuatur.

De Galbano.

CAP.

XCVI.

Albanum succus est nascentis in Syria ferulæ, quod nonnulli Metopium vocant. Maxime laudatur cartilaginofum, merum, thuris effigiem præbens, minimè lignosum, retinens nõ nihil adiecti seminis aut ferulæ, graui odore, neq; humidum neq; aridum. Adulteratur faba fresa & ammoniaco. Galbanū exalfacit, vrit, extrahit, discutit. Menses ac partus trahit, appositū vel suffitu. Lentiginēs aceto & nitro perūctas tollit. Deuoratur ad tussim veterem, difficultatem spirandi, suspiria, rupta, conuulsa. Aduersatur toxicis potū cum aceto & myrrha. Simili modo sumptum mortuos partus extrahit. Imponitur lateris doloribus & furunculis. Comitiales & vuluæ strangulatus & vertiginosos olfactu suscitāt. Si vratur fugat nidore serpentes, & perunctos feriri non patitur. Serpētes cum oleo & sphondylo circumpositum necat. Dentium dolorem oblitum aut cauernis inditum mitigat. Vrinæ difficili prodesse existimatur. Resoluitur ad portiones amaris nucibus, aqua aut ruta, aut calido pane, mulsæve. Alias meconio, ære vsto, aut felle liquido. Si purgare galbanū voles, in feruentem aquam demittito. Namq; cum liquefactum fuerit, eius fordes fluitabunt. Quas hoc modo facile separabis. Mundo linteo alligatum in fistili aut ærea pixide ita pendeat, vt imum vasis ne tangat. Opertoq; vase in feruidam aquam demittito. Sic enim syncarū, veluti per colum eliquescet, & lignosum in linteo remanebit.

De Ammoniaco.

CAP.

XCVII.

Ammoniācū hærbā est, ex qua Ammoniācū fit suffimen quod a tymiama vocāt, aliqui Agazyllon, alij Criotheum, alij Heluistrum, Romani guttam appellāt. Ferulæ succus est, quam iuxta Cyrenen Aphrica gignit. Cuius fruticē cum radice Agasyllim vocant. Probatum bene coloratum, ligni & calculorum expers, thuris similitudine, minutis glebis, dēsum, syncarum, nulla sorde spurcatum, castoreum odore imitans, gustu amarum. Hoc genus trauisma idest friaturam appellant. Quod vero terram & calculos collegit, Phryama quod significat misturam. Gignitur in Aphrica iuxta Ammonis oraculum, succum stillante ferulacea arbore. Mollit, extrahit, calfacit. Tubercula duriciaq; discutit. Potum aluum soluit. Partus extrahit

K. iiii.

DE MEDICINALI MATERIA

Lienem consumit, drachmæ pondere haustum. Articulorum coxendicumq; doloribus liberat. Auxilio est anhelatoribus, orthopnoicis, comitialibus. Item quibus humor in pectore coit, si cum melle delingatur, aut cum ptisanæ succo sorbeatur. Cruentam vrinam pellit. Albugines oculorum absterget. Genarum scabriciam absomit. Tritū autem cum aceto & impositum, iocineris lienisq; duricias sedat. Discutit tofos, qui in artubus cōcalluerunt, cum melle aut cum pice illitum. Lassitudines & coxendicum dolores eo perungi vtile est, cum nitro & cyprino oleo vice acopi.

De Sarcocolla. CAP. XCVIII.

f Arcocolla lachryma est arboris in Perside nascentis, pollinithuris similis, ruffa, gustu amara. Vulnere glutinat. Oculorum fluxiones inhibet. Emplastris inferitur. Adulteratur ammiste gummi.

De Glaucio. CAP. XCIX.

g Laucium succus est herbæ quæ in Hierapoli Syriæ nascitur, folijs sere corniculati papaueris, pinguioribus tamen, in terram sparsis, odoris tetri, gustus amari. Tota croceo succo madet. Folia in olla fictili semisfrigidis clibanis calciant indigenæ, vsq; dum flaccescant. Deinde contusis succum exprimunt. Cuius est vsus ad oculorum medicamenta. Vt pote cum inter initia refrigeret.

De Glutino. CAP. C.

g Lutinum quod Xylocollan, alij Taurocollan vocant, præstantissimum Rhodiaceum, quod ex bubulis corijs conficitur. Id candidum est & translucens. Nigrū vero minus probatur. Resolutum in aceto, impetigines leprasq; cutis delet. Ambustis igni ex aqua calida impositum, pustulas erumpere non patitur. Vulneribus prodest melle aut aceto madefactum.

De Glutino piscium. CAP. CI.

g Luten piscium, venter est piscis cetacei. Præstat candicans, natione ponticū, subasperum, carens squammis, & quod celerissime liquefit. Vtile emplastris, capitis & leprarum medicaminibus, & tetanothris, quæ cutem faciei erugant & extendunt.

De Visco. CAP. CII.

v Iscum optimum est recens, intus porraceum, extra fuluum, quod asperinihil, aut surfurosi concœperit. Fit acinis in robore nascentibus, buxæ fruticis folio. Contusum acinum lauant, & postea in aqua decoquunt. Sunt qui commanducando ipsum efficiant. Gignitur quoq; in malo, pyro, & plerisq; alijs arboribus. Quæmetiam inuenitur in quorundam fruticum radicibus. Emollit,

discutit, extrahit. Parotidas, tubercula, cæteraſq; collectiones, ad maſturationem perducit. Cum refina autem & cæra pari, epinytidas in ſplenio ſanat. Vetera vlcera ſuppurationeſq; quas cacoethe vocāt, ex thure mollit. Lienē cū calce, Gagete, aut Aſio lapide, inpoſitum abſumit. Cum ſandaraca, aut auripigmento illitum vngues extrahit. Miſtum cum calce & vini ſæce, ſuam vim intendit.

De Aparinæ. CAP. CIII.

Parinen aliqui Ampelocarpon, alij Omphalocarpon, nonnulli Philanthropon vocant, ramaſam hærbam & quadrangulam, ex interuallis orbiculato foliorum ambitu, vt in rubia. Flos albus, ſemen durum, rotundum, cōcauum, album, vmbilici figura, aſperitate veſtium tenaci. Ea paſtores coli vice vtuntur, ad eximendos e lacte pilos. Seminis caulium ac foliorum ſuccus, potu contra viperarum phalangiorumq; morſus auxiliatur. Inſuſu aurium doli medetur. Hærbæ cum axungia trita ſtrumas diſcutit.

De Alyſſo. CAP. CIIII.

Lyſſon aliqui Aſpidion, alij Aplophyllon, alij Accyſton, alij Adefeton nuncupant. Fruticoſa hærbula eſt, vnicaulis, rotundis folijs, fructu duplicium ſcutorum effigie, in quo eſt ſemen, quadam tenuis latum. In mōtib; & aſperis locis emicat. Eius decoctum ſingultus ſine febris, potu diſcutit. Idem efficit ſi quis eā aut teneat, aut odoretur. Cum melle trita, vitia cutis in facie, & lentigines emendat. Contuſa in edulio, rabiei canis mederi putatur. Domibus appenſa ſalutaris eſſe creditur. Et hominibus atq; animalibus ſaſcini, amuletum. Purpureo linteo circumligata pecorum morbos abigit.

De Aſclepiade. CAP. CV.

Sclepiadem aliqui Ciſſion, alij Ciſſophyllon, nomināt. Ramos emittit longos, folia hederæ, radices numeroſas, tenues, odoratas. Floris virus graue. Semen ſecuridacæ. Naſcitur in montibus. Radices ex vino potæ torminibus auxiliantur, & contra ſerpentium iſtus. Folia aduerſus vuluæ mammaramq; vlcera, quæ cacoethe vocant, illinuntur.

De Atraſtylide. CAP. CVI.

Tractylis quam aliqui Amyron vocant, alij Cnicon ſylueſtrem, alij Aſpidion, Magi Aphedron, Aegyptij Chenon, Romani Præſepium, aliqui ſuſum agreſtem, alij Colum ruſticam, ſpina eſt Cnico ſimilis, folia multo longiora ferens, in ſummis virgis, magna parte nuda, aſpera. Qua fœminæ pro ſuſis vtuntur. Capitula in cacumine ſpinis horrent. Flos luteus. Quibuſdam in locis purpureus inuenitur. Radix tenuis ſuperuacua. Coma, ſemen &

DE MEDICINALI MATERIA

folia cum pipere & vino teruntur vtilissime contra scorpionum ictus. Percussos tradunt quamdiu ea teneatur hærba, nullum experiri dolorem, ipsumq; deposita, statim recrudescere.

De Polycnemo. CAP. CVII.

Olycnemon quidam Clinopedion, alij Polygonaton, alij
p Iouis colum, alij Echeonymon vocât. Frutex est surculosus, folijs Origani, caule Pulegij, geniculis multis intercepto, sine umbella, tenui tamē in cacumine corymbo, boni odoris & acris. Vulneribus agglutinandis recens aut aridum cum aqua, efficaciter illinitur. Sed quinto die solui debet. Ad vrinæ stillicidia ruptaq; cum vino bibitur. Edocuit experientia contritos in vino albo ramulos, ijs qui affectibus laborant, quæ violentiæ vocantur, magno esse præsidio.

De Clinopodio. CAP. CVIII.

C Linopodion aliqui Cleonicon, alij Ocimoides, alij zopyron vocant, fruticem folijs serpyllo similem, surculosum, dum palmorum altitudine. Nascitur in petrosis. Flores marubij, ex intervallis speciē lectipedum præbent. Bibitur hærba & succi eius decoctum, ad conuulsa, rupta, strangurias, serpentium ictus. Menses & partus pellit. Et peniles verrucas quas Acrochordonas vocât, eijsit aliquot diebus potum. Aluum fistit decoctum ad tertias, potumq; si febrim sentiunt ex aqua. Alioquin ex vino.

De Leontopedalo. CAP. CIX.

I Leontopedalon aliquibus Leontopodion, alijs Leuceoron, alijs Leontiō, alijs Doris aut Dorideris, alijs Lychnis agria alijs Pardale, alijs Horybethron, alijs Rhapeion, Romanis Patabelclon, aut semen leoninum dicitur. Caulem emittit dodrantalē, aut altio rem, plurimis alis concavum, & in cacumine semina duo aut tria, in filiquis ciceris modo. Flores fremio similes, punicei coloris. Folia brassicæ, sed papaveris diuisura. Radicibus nigris rapæ similibus, torosis. Nascitur in aruis & segetibus. Radix auxiliatur serpentium ictibus ex vino pota. Nec alia res celerius dolorem finit. Miscetur ischiadicorum clysteribus.

De Teucrio. CAP. CX.

f Eucrion siue vt alijs placet Teucris, Hærba est virgæ refrens effigiem, Trifaginis similitudine, tenui folio, non multū a ciceris alieno. Hæc in Cilicia iuxta Gētiadem Scissademq; vbertim prouenit. Recens cum posca, aut arida feruesactæ ius, potu licentem potenter absument. Lienosis cum aceto & ficis illinitur. Item serpentium moribus ex aceto solo, siue ficis,

LIBER TERTIVS

78

De Trifagine. CAP. CXI.

Hamædrys Græcis, alijs Chamædrops. Latinis Trifago dicitur. Sunt qui eam Teucrion appellauere, propter eam quæ cum Teucro seruat similitudinem. Nascitur in Petrofis & asperis. Frutex dodrantalis, folia habens exigua, amara, effigie & diuisura quærcus. Flore pene purpureo. Carpitur semine prægnans. Recens in aqua decocta, potu tussibus, indurato lienî, vrinæ difficultati, incipientibus hydropicis, auxiliatur. Cit menses. Partus extrahit. Lienem ex aceto pota consumit. Aduersus serpentium venena ex vino, potu illituq; efficacissima. Trita digeritur in pastillos ad supradicta. Purgat vetera vlcera cum melle. Cum oleo illita caliginē oculorum discutit. Natura eius est calfacere.

De Leucade. CAP. CXII.

Eucas montana, latioribus q̃ vrbana folijs, semine acriore, amariore, ori ingrato. Efficacior tamē q̃ satiua habet. Vtraq; ex vino contra animalium venena, præcipue marinorum, opitulatur.

De Lychnide. CAP. CXIII.

Lychnis coronaria quam aliqui Athanaton vocant, alijs Acylion, alijs Ballariō, alijs Geranopodion, quidā Corymbiō, aliqui Taurion, alijs Sceptrū aut Maloion, Aegyptij Semon, Magi Sanguinē Apocathemenes, Romani Genuculare aut Balariam, Flore est albæ violæ simili, quo corollæ fastitantur. Cōtra scorpionū ictus semen in vino potum auxiliatur.

De Syluestri Lychnide. CAP. CXIIII.

Lychnis sylvestris, Tragonoton, alias Atocion, alias Hieracopodion, aut Lampas vocatur. Aegyptijs Semura, Magis Apocathemenes Taurus, Romanis Agreste intubum. Omnia vrbanae similis. Bilem per aluū detrahit, semine duabus drachmis poto. Ictus a Scorpione subuenit. Aiunt huius hærbae appositu, scorpiones torpescere & inertes prorsus reddi.

De Lilio. CAP. CXV.

Ræci Crinon basilicon vocāt, alijs Crinanthemon, alijs Calliarion, Magi Martis sanguinem. Osthanes auram Crocodili, Aegyptij Simphæphon, quidam Tialon, Latini Liliū, aliqui Rosam iconis. Syri Safa. Aphri Abiblabon. Lilia coronamentis se dedūt, Lyria a quibusdam vocata. E quibus vnguentum temperatur, quod aliqui Lirinū, alijs Sufinū appellant. Nervos & priuatim vuluæ duricias emolliens. Folia hærbae illita contra serpentium ictus auxiliatur. Feruēfacta ambustis proficiunt. Aceto cōdita vulne

DE MEDICINALI MATERIA

ribus opitulatur. Succus adiecto melle aut aceto, in æreo vase coquitur, conuenienti medicamento vetustati vlcerum, & ad recentia vulnera. Inassata radix & ex rosaceo trita igni ambusta sanat. Vuluam emollit. Menfes ciet. Vlcerata cicatrice obducit. Cum melle detrita nervis præcisis luxatisq; medetur. Vitiliginis, surfures, & lepras emendat. Vlceraq; in capite manantia expurgat. Abstergit faciem & erugat. Teritur in aceto cum Hyoscyami folijs & farina tritici, mulcēdis testium inflammationibus. Semen potū moribus serpētium aduersatur. Ignibus sacris semen & folia cum vino illinuntur. Tradunt & rubra esse Lilia. In Syria autem & Pisidia Pamphiliæ efficacissima, vnguentis nascuntur.

De Ballote seu Marrubio nigro. CAP. CXVI.

Alloten nomine alio nigrum Marrubiū, aut magnū vocant, aliqui Nophthan, alij Notianoscemin, alij Nosprasson, alij Nothera, alij Nochelin aut Nosteli, alij Nophrim, alij Gnoturim, Romani Vlcerariam aut Marrubium nigrum, alij Cāthurinū, Aegyptij Asphon, Magi Ifionis sanguinem. Caules ædit quadrangulos, nigros, subhirsutos. complures ex vna radice. Folijs maioribus q̄ Marrubij, hispidis, intercedente spatio, subrotundis, graue olentibus, apiastro proximis. Vnde aliqui Apiastrum eam vocauerunt. Caulibus albis orbiculato florū ambitu, qui rotæ speciē præbeat. Vis eius efficax aduersus canis morsus, folijs ex sale illitis. Feruenti cinere flaccescunt folia, vt condylomata reprimant. Purgant & sordida vlceracum melle.

De Apiastro. CAP. CXVII.

Elisophyllon Græci, alij Melithæum, alij Melithænā, alij Meliphyllon, alij Erythran, Latini Apiastrum aut Citraginem, Galli Merisimorion vocant. Id sibi nomen vsurpauit, quoniā apes ipsa hærba delectantur. Cauliculi & folia Ballotæ, de qua paulo ante diximus similia essent, nisi minora tenuioraq; nec ita hirsuta spectarentur. Citreum malum olent. Folia cum vino pota aut illita profunt contra ictus Phalangiorum scorpionumq;. Item aduersus canis morsum. Decocto eorūdem gratia, foueri prodest. Defessionibus foeminarum ad ciundos menses conuenit. Dentes eodem in dolore conluuntur. Dysentericis infunditur. Fungorum strangulationibus folia addito nitro, potu auxiliantur. Torminibus & orthopnoicis delinctu. Illita cum sale strumas discutiunt. Vlcerata purgant. Articularios dolores illita sedant.

LIBER TERTIVS

79

De Marrubio. CAP. CXVIII.

Raffion e Græcis aliqui vocāt, alij Eupatorium, alij Phyl-
 p lophares, alij Tripedilon, alij Camelopodion, Aegyptij
 Asteropen, Magi tauri sanguinem, aliqui Aphedron, Latini
 Marrubium, aliqui Labeoniam, Aphri Atierberziam. Frutex est ab
 radice ramosus, candicans, subhirsutus, quadrangularibus ramis. Fo-
 lium pollicem æquat, subrotundum, hispidum, rugosum, gustu amaro.
 Semen in caulibus, et ex interuallis flores verticillato ambitu, asperi.
 Nascitur propter ædificia, & ruderata loca. Huius folia sicca, cum se-
 mine decocta in aqua, aut viridium succus datur cum melle suspiriosis,
 tussientibus, & ad tabitudinem redactis. Crassam e pectore pituitam,
 cum sicca Iri eijcit. Mulieribus a partu nō purgatis datur, vt mēstrua
 & secūdas extrahat. Item in difficili partu, & his qui venena hauserūt,
 aut a serpentibus demorfi sunt. Vescam renescq; lædit. Folia cum melle
 illinuntur sordidis vlceribus purgandis. Pterygia nomasq; sistūt. La-
 terum dolores mitigant. Succus folijs contusis expressus, & sole co-
 ctus ad eadem pollet. Cum vino & melle illitus, oculorum claritatem
 adiuuat. Naribus regium morbum expurgat. Aurium doloribus cō-
 uenienter instillatur, per se aut cum rosaceo.

Empowering glands not

De Stachye. CAP. CXIX.

Tachys frutex est, Marrubio similis, sed longior. Folia ferēs
 f numerosa, hirsuta, rara, prædura, cana, odoris iucūdi, & com-
 plures virgas ab radice exeuntes, Marrubio cādidiore. Na-
 scitur in mōtibus & asperis. Vim habet excalfactoriam & acrem. Fo-
 liorum decoctum potu pellit mēstrua & secūdas.

De Phyllitide. CAP. CXX.

Hyllitis quam aliqui Phyllin, alij Acaulon, alij Sylvestre la-
 p pathum vocitant, folia promit Rumici similia, longiora, &
 p viridiora, sena aut septena, quæ parte anteriore læuia cernun-
 tur, a tergo autem penfiles quasi vermiculos ostendunt. In vmbrosis,
 & opacis hortorum ambulationibus emicat, gustu acerbo. Neq; caulē
 neq; semen profert. Folia in vino pota serpentium moribus aduersan-
 tur. Quadrupedibus per os infusa auxilio sunt. Et si dysenteria aut re-
 soluta alius exercet, potui dantur.

De Phalangio. CAP. CXXI.

Halangium a quibusdam Phalāgition vocatur, ab alijs Leu-
 p cacantha. Ramuli sunt ei duo, pluresve, in diuersa tendentes,
 p flos candidus, Lilio similis, multas incisuras habens. Semine
 nigro, lato ad lenticulæ dimidiatæ figuram, multo tenuiore. Radice
 parua, tenui, hærbacei coloris, dū a terra eruitur. Prouenit in collibus

DE MEDICINALI MATERIA

Huius folio semine flore cum vino pote, auxiliatur contra scorpionū phalangiorumq; ictus. Tormina quoq; discutit.

De Trifolio. CAP. CXXI.

Ræci Triphyllon, alij Oxyphyllon, alij Menyantes, alij
g Asphaltion, alij Cnicion vocant, Romani Trifolium, aut
acutum aut odoratum. Frutex supra cubiti altitudinem at-
tollitur, virgas habens tenues, iunceas & nigras, e quibus ramulares
enascuntur appēdiculæ, quæ in terna singulis germinationibus exeunt
folia, Loto arbori similia. Ijs recēter enatis rutæ odor inest. Vbi autē
adoleuerunt, bitumen olent. Florem ædit purpureum, semen quadamtes-
nus latum, subhirsutum, ex altera extremitate exertum veluti cornicu-
lum gerens. Radix tenuis, longa, valida. Semen & folia in aqua pota
pleuriticis, vrinæ difficultati, comitialibus, & ijs qui aquæ inter cutē
principia sentiunt, sceminis quoq; vuluæ vitio oportunis, auxiliantur.
Menses cit, ternæ dragmæ e semine dari debent, e folijs vero qua-
ternæ. Cōtra serpentium ictus trita folia & ex aceto mulso pota, præ-
sidio sunt. Tradunt aliqui totius fruticis, radicis, foliorumq; decoctū
fotu dolores eorum finire, quos serpētes percusserint. Qua autem aqua
huiusmodi, sanatus quis fuerit, si ea quispiā alius foueatur, qui vlcus
habuerit, perinde afficitur vt a serpente demorsus. Quidam terna folia
aut semina in tertianis, cum vino potui dedere, & in quartanis quater-
na, vt quæ febrium circuitus discuterent. Radix antidotis inseritur.

De Polio. CAP. CXXII.

Olium montanum, aliqui Theuthrion, alij Feuxaspidion, alij
p Achamenin, alij Ebenitin, alij Melosmon, nōnulli Belion,
quidam Leontocharon vocant. Duo genera eius. Montanum cui
Teuthrion nomen est, & cuius est vsus. Tenuis frutex est, candi-
dus, neq; palmo altior, semine refertus. Capitulo in cacumine quandā
corymborum speciem præ se ferente, paruo, canis hominis simili, gra-
uiter olente, non sine quadam suauitate. Alterum fruticosius non vsq;
adeo valens odore, & viribus infirmius. Potum feruefacti ius auxilia-
tur serpētium ictibus. Hydropicis, morbo regio, & lienosis ex aceto.
Stomachum male habet. Caput doloribus afficit. Aluum & menses
ciēt. Substratum suffitum v e serpentes abigit. Illitum vulnera conglu-
tinat.

De Scordio. CAP. CXXIII.

Cordium aliqui Scorbion, alij Pleuritin, alij Dysofmon, alij
f syluestrem Calaminthen, quidam Chamædryn, alij Mithri-
danion, Magi Podotis sanguinem, Aegyptij Apho, Roma-
ni Trifaginem palustrem appellant. In mōtib; & palustribus nasci-

tur, folijs Trifaginis, maioribus, nō sic in ambitu diuifis, aliquātū Al-
lia redolentibus, gultu amaris & adstringentibus. Quadrangulis cau-
libus, subrubro flore. Hæba vim excafactoriam habet. Vrinam cit.
Coſta recens aridavecum vino, aduerſus venenatos ſerpentium mor-
ſus bibitur. Ad ſtomachi quoq; roſiones, dysenteriam, & vrinæ diffi-
cultatem, binis drachmis cum hydromelite. Graſſamen purulētum pe-
ſtore expellit. Facit aridæ farina ad veterem tuſſim, rupta, conuulſa, ſi
cum ualuſturcio melle & refina miſceatur in eclegmate. Inflammata mo-
dice præcordia cærato excepta, recreat. Cum aceto acri aut aqua, poda-
gris conuenienter illinitur. Menſes impoſita mouet. Vulnera conglu-
tinat. Vetera vlcera purgat, & ex melle ad cicatricem perducit. Sicca
excreſcentias in carne cohibet. Succus ad eadem vitia bibitur. Inter
prima efficax Ponticum natione, Creticumq;.

De Tuſſilagine, CAP. CXXIIII

Echion Græci, quidam Richion, alij Petrinam vocant, alij
b Peganon, alij Pirhion, alij Pagonaton, alij Chamæleucen,
alij Procheton, alij Arcophyton, alij Chamægiron, Aegy-
ptij Saarthan, Latini Tuſſilaginem, quidam Pharphariam aut Puſtu-
laginem, Beſſi Aſa. Folia ei ſunt maiuſcula q̄ hederæ, ſex aut ſeptem a
radice, ſubalbida a terra, ſuperne virentia, in plures angulos exeuntia.
Caulis palmū altus, ſlos luteus. In vere, flore & caule cōfeſtim exui-
tur. Inde nonnulli his vacare exiſtimauerunt. Radix tenuis eſt & ſu-
peruacua. Naſcitur in amoenis & riguis. Folia ex melle trita igni ſa-
cro & omnibus inſlāmationibus illitu medetur. A ridæ ſumus per in-
fundibulū hianti ore raptus, hos ſanat qui ſicca tuſſi atq; orthopnœa
infeſtantur. Peſtoris vomicas rumpit. Eundem effectum præbet ſuffi-
ta radix. Decoſta in hydromelite & pota emortuos partus eiſcit.

De Artemiſia, CAP. CXXV.

Artemiſia ramoſa Græcis quibuſdā Monoclonos, alijs Toxi-
a refia, alijs Epheſia, alijs anactorios, alijs Sozuſa, alijs Lyco-
phryx. Magis hominis ſanguis, alijs Cryſanthemon Roma-
niſ hæba regia, aut Arthemifiſia, alijs Rapiū, aut Tertana, Gallis Po-
na, Dacis Zuofte dicitur. Magna ex parte in maritimis naſcitur, Ab-
ſinthij modo fruticofa, maioribus & pinguioribus folijs, ramisq;. Te-
nuior autem flore eſt paruo, tenui, candido, graue olente. Aeflate flo-
ret. Sūt qui in mediterrâneis Vnicaulis nomine appellēt, tenuē hæbu-
lā, ſimplici caule & minuto, floribus ſcatente, ſtauo colore. Hæc iucū-
diorem q̄ præcedens eſſat odorem. Vtraq; excalfacit, extenuat. Ferue-
factæ conuenienter in muliebres deſeſſus adiſciuntur, ad detrahendos
mēſes, partus, ſecundasq;. Item ad præcluſiones vuluæ, & eiufdem in-

DE MEDICINALI MATERIA

flammationes. Calculos comminuunt. Remoratam vrinā cient. Men-
ses pellunt pubi illitæ. Succus vuluæ inditus ex myrrha eadem quæ
infessio trahit. Coma tribus drachmis eorumdem educendorum gra-
tia bibitur.

De Artemisia tenuiore. CAP. CXXVI.

Ltera tenuioribus folijs, in sepibus & cultis, iuxta aquarum
ductus, nascitur. Cuius flores & folia cōtrita, Samplici odo-
rem reddūt. Si quis stomacho laboret, hærbam cum amygda-
lino oleo bene contundat, in malagmatis lentorem, & stomacho im-
ponat, sanitati restituetur. Qui nervorum dolore cruciantur, si succum
ex rosaceo illinant, sanantur.

De Ambrosia. CAP. CXXVII.

Ambrosia quam Romani caprum syluaticum vocant, quidā
Botryn, alij Apium rusticū, Aegyptij Merseon. Tenuis fru-
tex est ramosus, triumphare palmorum, folijs rutæ, circa inum
caulem exiguis. Cauliculi seminibus, perinde quasi racemulis grauidi,
nunq̃ florem pariunt. Odore vinoso, suauī. Radice tenui, sesquipedali.
Coronātur ea Cappadoces. Vis eius reprimere ac repellere. Et illitu
adstringere humores qui in aliquam partem incumbunt.

De Botrye. CAP. CXXVIII.

Otrys fruticosa hærba est, lutea tota, & in multas alas spar-
sa. Semē circa ramulos prouenit. Folia Cichorio similia. To-
ta suauem odorē spirat. Quare vestimētis interponitur. Inue-
nitur in torrentium ripis. Pota orthopnœas mulcet. Hanc cappado-
ces Ambrosiam vocant, alij Artemisiam.

De Geranio. CAP. CXXIX.

Eranion aliqui Peloniten, alij Trica, alij Geranogerōta, Ro-
mani Vchinastrum, Aphri Lescen appellāt. Folijs Fremij, di-
uisuris longioribus, radice rotunda, dulci. Quæ drachmæ pō-
dere in vino pota, vuluæ inflationes discutit.

De Altero Geranio. CAP. CXXX.

Eranion alterū, aliqui Myrrhin, alij Oxyphyllon, alij Car-
damomum, alij Origanum vocāt, Magi Hierobryncas, La-
tinigruinam, aut pulmoniam, aut cicotriam. Caulibus minu-
tis & pilosis sesquipedalibus. Folijs maluæ. In summis alijs sursum
spectantia gruum capitula insunt, cum suis rostris, aut canini dentes.
Nullius in medicina vsus.

De Gnaphalio. CAP. CXXXI.

Naphalion, alij Hires, alij Ampetocon, alij Anaxiton, alij
Anaphalin, Aegyptij Semcon, Galli Gelafonen, Latini cen-

LIBER TERTIVS

81

tūculū vocant, quidā tucularē, alij Albinū. Cuius folijs mollibus mi-
nutisq; pro tomēto vtūtur. Bibūtur efficaciter folia in vino austerō ad
dysenterīā.

De Typha.

CAP.

CXXXII.

typha foliū ædit cyperidi simile, caulē albū, læuē, æquabilē, flo-
rē in cacumine ambiētē, densū, qui in pappos soluitur, quod
lanuginem aliqui nominant. Huius hærbae flos, suillo adipe
eloto exceptus, ābustis medetur. Gignitur in palustribus & aquis sta-
gnātibus.

De Circaea.

CAP.

CXXXIII.

Ircæa quā & dircaea aliqui vocant, folijs est hortensis solani
c Agnatis crebris, flore nigro, pusillo, copioso. Semine millij,
nascente in quibusdam corniculis. Dodrātali radice, triplici
ferme aut quadruplici, candida, odorata, excalfaciēte. Nascitur in apri-
cis, saxis & vëto perflatis. Radicis tusæ triēs, in sextarijs tribus vinē
dulcis, per diem & noctem maceratur, potuq; triduo vuluas expurgat.
Semen forbitionibus datum, lacte, mammas nutricum explet.

De Oenanthē.

CAP.

CXXXIII.

O Enanthē quam aliqui Cerascomion, alij Leucanthion voca-
tant. Folia habet pastinacæ, florem candidum, caulem cras-
sum, palmi altitudine. Semē atriplicis. Radicem magnam, in
multa rotunda capitula extuberantem. Nascitur in petris. Caulis eius
& folia; cum melle & vino pota secūdas eiiciunt. Radix e vino vrinæ
stillicidio conuenit.

De Conyza magna.

CAP.

CXXXV.

Conyza magna aliquibus cynozematitis, alijs Danais, alijs
c Tanachion, aliquibus Phycos, alijs Ichis, alijs Dinofmos,
Magis Brepheotonos, quibusdā anubias, nōnullis hedemi-
as, Aegyptijs Ceti, Romanis militaris aut deliarium, aut febrifuga,
alijs fraginosa nuncupatur.

De Conyza parua.

CAP.

CXXXVI.

c Onyza duo genera. Quæ parua vocatur, odore præstantior
est. Maior vero frutice altior, & folijs latioribus, graui odo-
re. Vtriusq; folia oliuæ similia, hirsuta, pingua. In maiore cau-
lis binum cubitorum altitudine attollitur. In minore pedem æquat.
flos squallidus, lutei aut fului coloris. Qui in pappū abit. Radices su-
peruacua. Suffitu substratuq; frutex animalia fugat. Culices abigit,
& pulices necat. Folia cōuenienter illinuntur serpentium plagis, & tu-
berculis, ac vulneribus. Flos cum vino ad menses partusq; eiiciendos
bibitur. Item contra vrinæ stillicidia, arquatum morbum, & tormina.
Comitiales potus ex aceto adiuuat. Decoctum in defensionibus me-
detur vuluæ malis. Impositus succus abortum facit. Ex oleo efficaciter
rigoribus oblinitur. Capitis dolores tenuis illita sanat.

l. j.

DE MEDICINALI MATERIA

De altera Conyza. CAP. CXXXVII.

Stet tertiū Conyza genus, quod aliqui paruā, alij Paniō, alij Libanotidē. Magi cronō vocāt. Caule crassiore, ac molliore. Folijs q̄ paruæ maiusculis, minime pinguis, & maiore minor, multo grauioris odoris & iniucundioris. Sed inefficacior. Prouenit locis nō riguis. De Lilio syluestri. CAP. CXXXVIII.

8 Raci Hemerocallen, alij Hemerocatalacton, alij Crinō agri on, alij Crināthemon, alij Porphyranthes, alij Bulbum hæmation, alij Anticantharon, Romani bulbum, aut Liliū syluestre, aut marinū, Aphri Abiblabon vocant. Folium & caulem habet Liliij, porraceo colore. Flores in caule per singulos exortus, terni aut quaterni erumpunt, Liliij diuisura, quoties dehiscere cœperunt. Colore perq̄ pallido. Radix magna est atq; bulbosa. Quæ pota aut cū melle & lana in pello apposita, aquam educit & sanguinem. Folia tria mammarum inflammationes a partu contractas, oculorumq; collectiones mitigant. Radix & folia igni ambustis vtilissime illinūtur.

De Viola alba. CAP. CXXXIX.

1 Eucoion ex Græcis aliqui Basilion vocant, Latini violam albam, aliqui augustiam, nōnulli violam autūnalem, aut passarinam. Vulgaris est notitiæ, sed in floribus differentia quædam. Namq; aut cærulei, aut albi, aut purpurei, aut lutei inueniuntur. Lutea vero præcipui in medicina vsus. Huius aridi flores feruefacti in deflectionibus, valent contra vuluæ inflammationes. Et mēstrua expellunt. Sanant oris vlcera cum melle. Cum cærato rimas sedis. Semen duum drachmarum pondere ex vino potum, aut cum melle inditum, menses, secundas & partus extrahit. Radices cum aceto illitæ lienem reprimunt Et podagricos iuuant.

De Cratægono. CAP. CXL.

c Rataëgonum, siue vt alijs placet Cratænon, folijs tritico simile est, multis calamis ex vna radice emicantibus, multorumq; geniculorum. Semine milij. Nascitur in opacis & fructuosis, summopere acre. Traditum est a quibusdam, quod si bibat ieiuno ore, ter in die post mēses purgatos, tribus obolis in cyathis aquæ duobus mulier, ante conceptum quadraginta diebus, & vir modo con simili, totidē diebus ante coitum hauriat, virilis sexus partū futurū.

De Phyllo. CAP. CXLI.

p Hyllon aliqui Elæophyllō vocāt. Nascit in saxis, sed quod Thelygnō vocāt, est veluti muscus, folio oliuæ, magis hærbacei coloris, Caule tenui ac breui. Radice minuta. Flore candido. Semine papaueris simili, maiore. Sed arthenogonon cætera huic si

LIBER TERTIVS

52

mile, solo fructu distat. Habet enim vuas deflorētibus oleis non dissimiles. Arrhenogonon potu, masculi sexus facere partus, vt thelygonō fœminei proditur. Horū Crateuas author est. Sed huiusmodi historia tenus, mihi produxisse videtur.

De Testiculo Canis. CAP. CXLII.

Testiculus Canis quem græci Orchin, aut Cynosorchin vocant, folijs circa caulē mollis olæ similibus, in terra stratis, longioribus, angustis, læuibus. Caule dodrantali, floribus purpureis, radice bulbosa, oblonga, oliuæ modo angusta, duplici ordine, superiore quæ plenior est, inferiore, quæ mollior ac rugosior. Eduntur radices coctæ, vt bulbi. Ex quibus si maiore edāt viri, mares generari dicuntur. Si minore fœminæ, alterū sexū. Addūt, in Thessalia molle mulieres in lacte caprino bibere, ad stimulandos coitus. Arida vero ad inhibendos. Et alterū alterius potu resolui. Nascitur in petrosis & sabuletis.

De altero Testiculo. CAP. CXLIII.

Testiculus qui alio nomine Serapias, Andrea authore vocatur, quoniam radix inter pauca utilis sit, folijs est porri, latioribus, oblongis, pinguibus, ex alarum sinu inflexis. Caule palmeo, floribus pene purpureis. Radice testiculis simili. Quæ illi tumores discutit. Vlcera purgat, & serpere eadem non patitur. Abolet fistulas. Et illi inflammationes lenit. Aridæ radices nomas inhibent. Sanantq; oris putredines, & vlcera cacoethe. Aluū sistunt e vino potæ. De hac, eadem quæ de testiculo Canis, produntur.

De Satyrio. CAP. CXLIII.

Athyrium aliqui Trifolium vocant, quoniam tria fert folia, ad terram infracta, Rumici aut Lilio similia, minora tamen ac rubra. Caulem cubitalem, nudū. Florem Lilij effigie, candidum, radicem bulbosam, mali magnitudine, fuluam, intus vt ouum candidam, gustanti dulcem, & ori non ingratam. Quam in vino nigro austero bibere conuenit, contra opisthotonum. Vtendum ea dum concumbendi incessit cupiditas. Siquidem ea, promores ad venerem fieri affirmant.

De Satyrio Erythronio. CAP. CXLV.

Athyriū Erythronion, aliqui Erythraicon, alij Melion aqueum, alij Entaticon, alij Priapicon, aut Satyriscon, aliqui Satyri testiculum appellant, Latini molorticulum veneris. Semine lini, maiore, duro, læui, splendēte. Quod fertur, non secus atq; Scincus libidinem excitare. Cortice radicis gracili, ruffo. Intus autem album includitur, sapore dulci non ingrato ori. In mōrosis & apricis enascitur. Venerem vt produnt, si omnino manu teneatur radix, stimulat. Eoq; magis si bibatur in vino.

l.ij.

DE MEDICINALI MATERIA

De Hormino. CAP. CXLVI.

Orminum satium a Latinis Geminalis, a Dacis Hormia
h dicitur. Folij est Marrubio similis, caule semicubitali, qua-
drangulo, circa quem eminentiæ filiquis similes prodeunt,
quæ ad radicem spectant, in quibus diuersum semen recluditur. Siqui-
dē in syluestri rotundum, fuscumq; inuenitur. In altero nigrum, & ob-
longum, cuius est vsus. Ad venerem stimulandam, cum vino bibi vo-
lunt. Purgat cum melle argema albuginesq;. Illitum ex aqua tumores
discutit. Eo etiam extrahuntur aculei, ex corpore. Idem effectus est illi-
tæ hærbæ. Syluestre magis viribus pollet. Quare vnguentis præfer-
tum gleucino permiscetur.

De Securidaca. CAP. CXLVII.

Edysaron vnguentarij pelecium id est Securidacam vocat.
h Fruticosa est, folijs ciceris. Semen rufū in filiquis fert, corni-
culorum modo aduncis, quod ancipitem securim æmulatur.
Vnde nomē accepit. Amarum gustu. Stomacho vtile in potu. Addi-
tur in antidotis. Cum melle ante coitus subditum, concipiendi spem
adimit. Nascitur in segetibus & hordeis.

De Onosmate. CAP. CXLVIII.

Nosma aliqui Osmeden, alij Ononin, alij Phlonytin appella-
o lāt. Oblōga folia habet, ad similitudinē anchusæ, lōgitudine
quattuor digitorū & duū latitudine, mollia, in terra iacētia.
Sine caule, sine semine, sine flore. Radice nititur lōga, tenui, ifirma, ru-
bescēte. Gignitur in asperis. Folia in vino pota partus extrahūt. Præ-
gnans si eam supergrediatur, abortum facere dicitur.

De Nymphæa. CAP. CXLIX.

nymphæa nascitur in paludibus, & stagnantibus aquis, folijs
n ciborio minoribus, & lōgioribus. Alijs in summa aqua, alijs
demersis, pluribus ex radice prodeuntibus. Flore lilio simili,
albo, & in medio crocos habente. Cum defloruerit, vt rotundum ma-
lum, aut papaueris caput, extuberat. Nigro semine, denso & lato, lenti
gustus. Caulis est læuis, niger, minime crassus, ciborio cognatus. Ra-
dix nigra, scabra, clauæ similis. Quæ autumnō secatur. Sicca cū vino
pota cœliacis dysentericisq; auxiliatur. Lienē absumit. Radix stoma-
chi ac vesicæ doloribus illinitur Vitilignes ex aqua emendat. Impos-
ita cum pice, alopecijs medetur. Eadem contra veneris insomnia bibi-
tur. Siquidem ea prorsus adimit. Pota assidue aliquot diebus, genita-
le infirmat. Idem semen potum efficit. Nymphæa nomen sibi vendi-
casse videtur, quoniam aquosa amet. Plurima inuenitur in Helide, in
Anygro amne, & in Beotia Haliarto.

LIBER TERTIVS

83

De altera Nymphæa. CAP. CL.

St & altera Nymphæa, cuius flos Blephara dicitur, folijs ante dictæ. Radice alba, scabra, flore luteo, nitente, rosæ simili. Huius semen & radix, contra fœminarû profluuiâ efficaciter ex vino nigro bibuntur. Nascitur in Thessalia amne peneo.

De Androsace. CAP. CLII.

Androsaces, sunt qui Picrada appellêt, alij Leucen, alij Thassiam. Hæba est amara, tenues spargēs iuncos, sine folijs. Folliculos in capitulis habens, in quibus semen continetur. Gignitur in Syriæ maritimis. Ea drachmis duabus in vino pota copiosam hydropicis vrinam ciet. Idem effectus est semini pota, & hæbæ decocto. Podagris vtiliter illinitur.

De Asplenio. CAP. CLIII.

Splenium aliqui Scolopendrium vocant, alij Splenion, alij Hemionium, alij Pteryx, alij Lonchitim, alij Aturion, alij Phrygiam, aut Phrygitim, aliqui Philrodoten, Magi mustellæ sanguinem. Folijs est multis, Scolopendræ animali similibus, ab radice vna prodeuntibus. Nascitur in parietibus, saxisque filiceis, & opacis. Nec caulem nec florem nec semē habet. Folia filiculæ modo diuiduntur. Subter flauescencia hirsutaq, superne viridia. Vim hanc habent folia in aceto feruefacta, vt per dies quadraginta pota, lienem absumant. Quibus etiam contritis lienem ex vino illini oportet. Stranguriæ & regio morbo prodest. Singultum sedat. Calculos in vesica cōminuit. Conceptum adimere creditur, per sese aut cum muli liene appensa. Tradunt noctu, silente luna, huius rei gratia effodiendam.

De Hemionitide. CAP. CLIII.

Hemionitis quam aliqui Splenion vocant, folium emittit Dracunculi, lunatū. Radicibus cohæret multis, tenuibus. Nunq̃ flores neq; semen neq; caulem gignit. In petrosis nascens, austero sapore. Ea ex aceto pota lienem absumit.

De Anthyllide. CAP. CLIII.

Anthyllis quam quidam Anthemida vocāt, alij Erāthemion, alij Leucanthemon, alij Soranthin, alij Campestrem florem, Romani Solastrum, duplex est. Quædam enim lenti simillima, folijs mollibus, rectis ramulis, palmi altitudine, radice parua, tenui. Nascitur in salsis terris, & a sole illustratis, non insulso gustu. Altera est folijs ramulisque trifagini similis, hirsutioribus tamen, breuioribus & asperioribus. Flore purpureo, odoris admodū grauis. Radice Cichorij. Pota drachmis quattuor vrinæ difficultati renibusq; plurimū prodest. Trita, vuluæ pituitas emolliūt, cū rosaceo & lacte imposita. Vulneribus medentur, quæ autem trifaginis similitudinem refert.

l. iij.

DE MEDICINALI MATERIA

pota cum aceto mulso comitiales sanat.

De Anthemide.

CAP.

CLV.

a Nthemida aliqui Leucanthemon, alij Heranthemon, quoniam vere floreat, alij Chamæmelon, quoniam mali odorem habeat, nonnulli Melanthemon, alij Chrysocomam, alij caliam, Romani mallium, Aphri astertiphen appellât. Genera eius tria, tantum flore distantia. Rami palmum nō excedunt, fruticosi, alis multis, concaui. Tenuibus ramulis, rotundis capitulis, floribus in medio aureis, forinsecus orbiculato ambitu, candidis, melinis aut purpureis, magnitudine foliorū rutæ. Nascitur in asperis, & iuxta semitas. Coligitur vere. Vim habent radices flores & hærba excalfaciendi extenuandiq. Potu & in sessione, pellūt mēstrua, partus, vrinam, calculosq. Aduersus inflationes & ilei tormenta bibuntur. Bilem suffusam expurgant. Iocinerum vitia sanant. Decocto earum vesicæ fouentur. Ex omnibus his generibus ad calculos efficacissima est, quæ florem purpureum habet, cuius amplitudo maiuscula est. Hæc proprie Heranthemon vocant. Ea cui Leucanthemo nomen est, itē quæ Crysanthemum dicitur, vehementius vrinam ciunt. Aegilopijs illitæ medētur. Comæ manducatæ vlcera eruptiones in ore, sanāt. Nōnulli in clysteribus ex oleo vtuntur. Teruntur in farinam ad abigēdos febrium circuitus. Flores & folia recondi debent, & priuatim tusa, in pastillos digeri. Radix quoq. ficcari, dūq. ingruit necessitas, binæ partes hærbae dari, modo floris aut radice pars vna, modo contra, floris partes duæ & hærba vna, permutatim duplicato pondere alternis diebus. Bibere autem oportet in vino mulso diluto.

De Parthenio.

CAP.

CLVI.

p Arthenium aliqui Amaracon vocant, alij Anthemida, alij Leucanthemon, alij Camæmelon, alij Chryfocalin, alij Melabathron, nonnulli campestem florem. Romani Solis seculum, aliqui millefoliū, Hetrusci Cautam, Aphri Thamath. Folijs est coriandri, tenuibus, flore per ambitum albo, intus melino, odore graui, sapore amaro. Siccatum cum aceto mulso aut sale potum, nō secus atq. Epithymum, & bilem & pituitam detrahit. Suspiriosis prodest & melancholicis. Hærba sine flore a calculosis & anhelatoribus magna vtilitate bibitur. Valet decoctum ad insedendum in duricia vulvarum & inflammationibus. Illinitur sacro igni & collectionibus cum flore.

De Bupphalmo.

CAP.

CLVII.

b Vpphalmon quidam cachlam vocant, alij Balsamenā, Magi hæmoran, alij mercurij genituram, alij Aphthitis semen, aut mnesitheum, Romani cappacorianam, Aphri narat. Te

nues emittit cauliculos mollesq; folia fœniculi, luteum florē Anthemide maiorem, oculi similitudine. Vnde nomē traxit. Circa opida nascitur, & in campestribus. Flores cum cærato triti tumores duriciasq; discutunt. Aiunt epotam post exitum a balneis, regio morbo correptis, colorem tractu temporis reddere.

De Pæonia.

CAP.

CLVIII.

Aeonias mas siue glycyfide, Græcis aliquibus Pætoboron dicitur, alijs Orobeliō, quibusdā Orobax, alijs Hæmagogō, alijs Pæsæden, alijs Monogenion, alijs Menion, alijs Pæonion, alijs Panthiceratos, alijs idei dactyli, alijs Aglaophotis, alijs Theodonion, alijs Selenion. Magis Selenogonō, alijs Phthifis, Romanis casta. Caulis altitudine sesquipedis adolefcit, comitantibus multis stolonibus. Huius duo genera. Mas folia iuglandis habet. In fœmina vero, Smyrni more diuiditur. Summo caule siliquas emittit veluti græcas nucs. In quibus, quum dehiscūt, multa granula rubra, acinis punicorum similia, inueniuntur, & in medio nigra, quinq; aut sex purpurea. Radix maris tenuis, digitali crassitudine, & palmi longitudine, gustu adstringens, alba. Fœminæ radicibus ceu glandes circiter septem aut octo inhærent vt in hastula regia. Fœminis a partu non purgatis sicca radix datur. Ciet menses nucis græcæ magnitudine porta. Sic vêtis doloribus cum vino auxiliatur. Valet cōtra regiū morbum & renum ac vesicæ dolores. Decocta in vino aluum sistit. Rubra grana rubenteis menses sistunt, decem vel duodecim porta in vino austro & nigro. Stomacho & erosionibus eius esse prodest. A pueris porta, initia calculorum eximunt. Grana nigra auxiliantur suppressionibus nocturnis, vuluæ strågulationibus, & matricis doloribus, quindecim numero porta, in aqua mulsa aut vino. Nascitur in altissimis montibus & promontorijs.

De Lithospermo.

CAP.

CLIX.

Ithospermō alij Aegonychō vocāt, alij Leontion, alij Leoninum lapidem, alij Gorgonion, alij Tantalitin, alij Diosporon, Romani Columbam. Daci Gonoletā, alij Heracliam. A fœminis duricia nomē accēpit. Folijs est oliuæ longioribus, & latioribus. Iacent humi quæ ab radice exiliunt. Ramulis furculosis, rectis, tenuibus, firmis, crassitudine iunci. In quorum cacumine bifidi exortus, cauliculorum speciem exhibent. Folijs longis, inter quæ parvū semen, rotundum, erui magnitudine, duricea lapidea. Nascitur in asperis & æditis locis. Vim hanc habet vt semine cum vino albo potu calculos frangat, pellatq; vrinam.

l. iiii.

DE MEDICINALI MATERIA

De Phalaride. CAP. CLX.

Halaris cauliculos emittit, quales zea, e minutis ac nullius
p vsus radicibus, multos, duum palmorum, geniculis cinctos.
Semen candidum, oblongum, milij magnitudine. Tunditur,
et in aqua aut vino succus ad vesicæ cruciatus vtilissime bibitur. Semen
men cochleari mensura potum ad eadem efficax est.

De Rubia. CAP. CLXI.

Rythodanū aliqui Teuthrion, alij Dracanon, alij Cinnaba
c rim, Latini Rubiam, Etrusci Lappam minorem, Aegyptij
Sophobi vocant. Radix rubra est, qua tinguntur lana. Vna
sponte provenit. Altera seritur vt in Thebana Galileæ, & Rauēna I
talia. In Caria inter oleas, vt in aruis, solo creditur. Hæc nō sine quæ
stu ferunt. Namq; maximum ex ea sentiunt prouentum. Asperi caules
& quadranguli, longi, Aparinæ nō dissimiles, robustiores, & multo
maiores. Folijs per interualla certa circū articulos, stellatim decussa
tis. Semen eius rotundum, inter initia viride, mox rubrum, postea cum
ematuruit nigrū. Radix tenuis, longa, rubra. Vrinam ciet. Qua de cau
sa regio morbo opitulatur, pota cum aqua mulsa. Item Ischiadicis &
resolutis, Crassam copiosamq; vrinam pellit, nonnunq; & sanguinem.
Bibentes tamen quotidie lauari oportet, & excrementorum quæ red
duntur differentiam spectare. Aduersus serpētium morsus, succum ex
vino bibere prodest. Semen ex aceto potum lienem absumit. Imposi
ta radix trahit partus, menses, secundasq; Albæ vitilagini illita ex ace
to medetur.

De Lonchitide. CAP. CLXII.

Onchitis quæ Cestron aut Medusa alio nomine dicitur, lati
ne venerea aut Lanceola, folia habet latioris porri, rubētia,
plurima, ad radicem circumfracta, veluti in terram procum
bentia, pauca in caule. In quo flores ceu galericuli hiantibus comicis
personis similes, nigri, & velut e ritu albam exerentes linguam, quæ
ad labrum inferius semē promat, lanceæ simile, triangulum. Vnde sibi
cognomentum arrogauit. Radix dauci. Nascitur in sitiētibus & aspe
ris. Radix ex vino pota vrinam ciet.

De altera Lonchitide. CAP. CLXIII.

Altera est Lonchitis, quam aliqui asperam Lonchitin, Latini
Longinā, aut Calabrinam dicūt. Folia Scolopēdrij emittit.
Sed asperiora maioraq; ac multo magis diuisa. Vulneribus
mirum in modum prodest. In eisq; inflammationes excitari non pati
tur. Pota ex aceto lienem absumit.

LIBER TERTIVS.

85

De Althæa.

CAP. CLXIII.

Althæa quam alij Althiocon, alij Ibiscū vocant, in syluestriū
 a maluarū genere est, cui folia vt Cyclamino rotunda, lanugi-
 ne canescunt. Flore rosaceo, bicubitali caule. Radice lenta, ina-
 tus alba. Althæa appellatur q̄ inter primas sit utilis, & pluribus pol-
 leat remedijs. Decocta enim in vino aut aqua mulsa, in potu efficax est
 contra vulnera, parotidas, abscessus, mammarum inflammationes, at-
 tritus sedis, inflationes, nervorum rigores. Siquidem discutit, & ex-
 coquit, rumpit, & ad cicatricem perducit. Cocta vt dictum est, adiecto
 suillo adipe, aut anserino, terebinthinave, vt malagmatis lentor fiat, fa-
 cit ad vuluæ inflammationes, præclusionesq̄ in pessis subdita. Deco-
 ctum eodē fungitur munere. Onera vuluæ reliquiasq̄ a partu extrahit.
 Decoctæ succus ex vino potus, succurrit vrinæ difficultati, calculoso-
 rum cruditatibus, dysentericis, ischiadicis, tremulis, ruptis. Dentium
 mulcet dolorem, cū aceto decocta, colluto inde ore. Viride semen sic-
 cumq̄ tritum, vitilignes in sole perunctas emendat. Eodem cum oleo
 peruncti, a venenatis non feriuntur. Valet contra dysenteriam & san-
 guinis reiectiones, aluiq̄ profluuium. In posca aut vino decoctum bi-
 bitur, cōtra omnes vesparum, apum, similiumq̄ aculeatos ictus. Folia
 cū olei momento, morfibz & igni ambustis illinuntur. Constat aquā
 trita radice addita, sub diuo addensari

De Alcea.

CAP.

CLXV.

Alcea syluestrium malvarum generi assignatur. Folia habet di-
 a uisa, Verbenacæ proxima, caules treis aut quattuor, cortice
 cānabino vestitos. Florem rosæ, paruum, radices albas, latas,
 quinq̄ aut sex, cum plurimum cubitales. Quæ cum vino aut aqua po-
 tæ dysentericis ruptisq̄ medentur.

De syluestri Cannabe

CAP. CLXVI.

yluestris Cannabis quā aliqui Hydrastinam, Romani termi-
 f nalē vocāt, virgas fert Althææ similes, minores, nigriores
 & asperiores, cubiti altitudinem æquantes. Folio satiua, ni-
 griore & asperiore, flore Lychnidis, subrubro, semine & radice Al-
 thææ. Decocta radix, illitu inflammationes mulcet. Tumores discutit.
 Tosos articulorum dissipat. Huius cortex, torquendis funibus accom-
 modatus.

De satiua Cannabe.

CAP. CLXVII.

Atiua Cānabim aliqui Cānabion, alij Schinostrophon, alij
 f Asterion appellarūt, plātam magni in vita vsus, ad robustis-
 simos funes factitādos. Folijs mali, graui odore, caulibus pro-
 cæris, inanibus, semine rotundo. Quod largiore cibo genituram extin-

DE MEDICINALI MATERIA

guit. Succus ex ea recente cōueniēter auriū doloribus insillatur.

De Anagyri.

CAP. CLXVIII.

a Nagyris quā aliqui Acopon, alij Anagyron, alij Agnacopon vocant, frutex est arboris instar, grauis odore, folijs agni virgisque, flore oleris. Semē in corniculis nō breuibz gignit, subrotundum, firmum, versicolori facie, simile renibus, quod durefcit per messes. Tēnera folia tumores illitu reprimunt. Si partus hæreat, & secundæ mensesq; morentur, drachmæ pondere bibuntur in passo. Sic et suspiriosis dantur, & contra capitis dolores in vino. Difficulter parientibus adalligantur, ita vt a partu statim auferantur. Radicis cortex concoquendis discutien disq; adhibetur. Semen commanducatum vomitiones vehementer ciet.

De Cepæa.

CAP. CLXIX.

c Epæa portulacæ similis est, sed nigriora habet folia, & radicē tenuem. Folia in vino pota, vrinæ stillicidio, & vesicæ scabiē laborantibus, opitulantur. Maxime id præstat, si cum decocto radicū Asparagi bibatur.

De Alismate.

CAP. CLXX.

a Lisma alij Alceā, alij Damassionion, alij Acyrō, alij Lyron, appellant. Folia ei plantaginis, nisi angustiora essent, laciniosa, cōnexaq; in terram, caule simpliciter tenui, cubito altiore, capitibus thyrsi. Flore tenui, candido, pallefciente, radicibus tenuibus, vt veratri nigri, acribus, odoratis, pinguibz. Aquosos amat tractus. Radix si drachma vna aut altera bibatur, his cōuenit qui leporē marinum deuorarūt, aut a rubetis ranis demorsi sunt, aut opium hauserūt. Torminibus atq; dysenteria, per se aut cū pari modo Dauci, potui datur. Conuulsis & contra vitia vuluæ prodest. Hæba sistit aluum. Mēstrua pellit. Tumores illita mitigat.

De Onobrychide.

CAP. CLXXI.

o Nobrychis quā e Græcis aliqui Onobrochilon, alij Eschasmenē, alij Corion, alij Chamæpityn, Romani opacā, alij Brihilatam, alij Loptā, alij Iocinalē, Daci Aniassexe appellāt. Folia habet lentis, longiora paulo, caulem dodrantalem. Florem purpureum, radicem paruam Nascitur in vliginosis. Hæba suapte vitritā illinatur, tubercula dissipat. Cum vino pota strangurias sanat. Illita ex oleo sudores mouet.

De Hyperico.

CAP. CLXXII.

h ypericū alij Androsæmō, alij Coriō, alij Chamæpithyn appellant, quoniā semē odore resinā imitatur. Surculaceo frutice, dodrā tali, rubente. Folio rutæ, flore albæ violæ simili, qui di-

gitis tritus sanguineū succum remittit. Qua ex causa Androsæmon cognominatur. Subhirsuta filiqua, & tereti, hordei magnitudine, semine intus nigro, resinosi odoris. Gignitur in cultis & asperis. Vrinam cit. Menstrua pellit appositum. Tertianis quartanisq; cum vino potum liberat. Semē triginta diebus haustum, ischiadicis medetur. Folia cum semine illita ambusta sanant.

De Ascyro.

CAP. CLXXIII.

Scyrum quod a quibusdam Ascyroides nominatur, hyperici genus est, magnitudine distans, fruticosius, maiores habet ramos, rubentia folia, tenuia. Flores luteos & fructum resinofum, hyperico non absimilem. Cuius attritu digiti fere cruentantur. Qua de causa Androsæmum vocauere. Vfus seminis ad ischiadicos. Potum in hydromelitis sextario biliosa recrementa amplissime detrahit. Sed assidue dare oportet, donec sanitati restituantur. Illinitur & ambustis efficaciter.

De Androsæmo.

CAP. CLXXIIII.

Androsæmon siue vt alij appellauere Ascyron, aut Dionysiadem, ab hyperico ascyroq; differt, quod surculosum ac tenuius sit. Rubentes rami, & folia rutæ duplicia, aut triplicia. Quæ trita vinoso succo manant. Complureis alas habet in cacumine, in versus vtrinq; digestas. In quibus flores pusilli lutei & in calyculis semen Papaueris nigri, insigne lineis. Huius comæ tritæ resinofum odorem reddunt. Semen drachmis duabus potum, biliosa excrementa pellit. Ischiadicis medetur, sed a purgatione aquam exorbere oportet. Herba ambustis illita medetur. Vulneribus sanguinem cohibet.

De Cori.

CAP. CLXXV.

Oris quod aliqui hypericon vocant, frutex est folio ericæ, rubro, pinguiore, ac minore, non altior palmo, suavis, odoratus, acris. Potum semen menses trahit & vrinas. Contra Phalangiorum morsus ex vino potum auxilio est. Rigoribus ex pipere, opisthotonicis ex oleo, aptissime illinitur. Radix vino decocta potaq; defectis opem ferre creditur. Sed laborantem inter potandum q̄ optime cooperiri licet. Siquidem corpus totum defudabit, ex qua re pristinam agilitatem recuperabit.

De Aiuga.

CAP. CLXXVI.

Racis chamæpitys, alijs pitysorysis, alijs Orizelon, ijs quæ pontū incolūt Olocyron, alijs Bryonia syluestris, Athenis Ionia, Euboicis Sideritis, Magis mineruæ sanguis, Latinis Aiuga aut cypripū, Dacis Dochela appellatur. Herba in terra repēs incurua, folijs semperuiui minoris, multo tenuioribus, hirsutis et pin-

DE MEDICINALI MATERIA

pinguioribus, circum ramos defis. Odore pinus, flore tenui, luteo, vel candido, radicibus cichorij. Folia septem diebus in vino pota, regio morbo medentur. Et quadraginta diebus ex hydromelite, ischiadicos sanant. Dantur peculiariter urinæ difficultatibus, iocineris & renum vitij. Torminosi profunt. Ea apud heracleam pōticam, perinde atq; antidoto contra aconitum vruntur, bibentes decoctum. Ad antedicta illinitur, cum polenta iure decocti subacta. Trita in farinam & cum fico in pilulis sumpta, aluum emollit. Excepta melle cum æris squama & refina purgat. Apposita ex melle vuluæ vitia extrahit. Mammarum duricias discutit. Vulnere glutinat. Ulcera quæ serpunt cum melle illita cohibet.

De altera Aiugæ CAP. CLXXVII.

Lterum est genus Aiugæ, cubitalibus ramis, in anchoræ speciem incuruatis, prætenuibus, coma præcedentis, flore candido, semine nigro. Hæc pinū redolet. Tertia mas nominatur, paruula, folijs exilibus, albis, scabris, caule aspero, cādido, luteis floribus, semine iuxta alas. Resipit hæc pinum. Vim eandem obtinet, sed non vsq; adeo efficacem.

Pedacij Dioscoridis Anazarbei
de medicinali materia
Tertij Libri

F I N I S

LIBER QVARTVS.
 PEDACII DIOSCORIDIS ANAZARBEI
 DE MEDICINALI MATERIA LI-
 BER QVARTVS, IOANNE
 RVELLIO SVESSIO
 NENSI IN-
 TERPRE-
 TE.

87

I

In superioribus libris amantissime Ari-
 tradidimus de odoramentis, oleis, arbori-
 bus, vnguentis, animalibus, frumentis, o-
 leribus, radicibus, succis, hærbis, semini-
 busq;. In hoc autem quarto differemus de
 radicibus & eis quæ restant hærbis.

De Betonica.

CAP. I

Est *Psychotrophon* vocitatur, quoniã frigidis locis inue-
 niatur. Latini *Betonica* appellat. Hærbæ est, caulem ferens
 tenuem, cubiti altitudine, aut maiore, quadratum, folia quær-
 cus, mollia, longa, in ambitu diuisa, odorata, prope radicem maiora.
 In summis caulibus, semen veluti *Satureiæ* spicatum inest. Decerpta
 huius folia ficcantur, plurimos ad vsus. Radicibus nititur vt *veratri*
 tenuibus. Quæ ex *hydromelite* in potu, pituitosam vomitionem euo-
 cant. Folia dari debent ruptis, cõuulsis, mulieribus vuluæ malo opor-
 tunis, & ad laxandos vteri stragulus, drachmæ vnus pondere cum
hydromelite. Tres in vini sextario drachmæ, contra serpentium mora-
 sus ebibuntur. Hærbæ magna vtilitate illatis a serpente vulneribus il-
 linitur. Aduersus etiam venena drachma ex vino pota conuenit. Præ-
 sumpta ea, si venenum hauriatur, nihil nocebit. Vrinam ciet. Aluum
 subducit. Medetur comitialibus & insanis pota ex aqua, & iocineris
 lienisq; vitij, drachmæ pondere in aceto mulso. Concoctionem adiu-
 nat, si quis ea fabæ magnitudine secundum cœnam cum melle cocto de-
 uorarit. Modo consimili accide rudatibus propinatur. Stomachicis
 eam manducare & succum deuorare proderit, si postea dilutum vinum
 sorbeatur. Datur sanguinem excreatibus tribus obolis, cū diluti vini
 aut laetis cyatho. Ischiadicis, renum & vesicæ doloribus ex aqua. A-
 quæ intercutem binis drachmis ex *hydromelite*. Regio morbo laborā-
 tes recreat. Menses pellit, drachmæ pondere cum vino pota. Aluum
 purgant drachmæ quattuor potæ, in *hydromelitis* decem cyathis. Fa-
 cit cum melle ad tabem & purulētam excreationem. Folia sicca tritaq;
 fictili vase reconduntur.

DE MEDICINALI MATERIA

De Bretanica. CAP. II.

b Retanica aut Vettonica, folia habet sylvestris lapathi, sed nigriora, & densiora, gustu adstringentia, Radicem tenuem & breuem. Caulem paruum emittit. Folij exprimitur succus, qui igni aut sole cogitur. Vim habet adstringentem. Priuatim depascentibus oris & tonsillarum vlceribus accommodatam. Valet etiam ad reliqua, quibus adstrictione est opus.

De Vettonica. CAP. III.

v Ettonica nascitur in pratis & montibus, locis mundis, & opacis, circa frutices. Animas hominum & corpora custodit, nocturnas ambulationes, & loca sancta. Grauibz somnis resistit. Ad omnem medendi usum commendata. Radicem habet rubram, odoratam, porracea folia, medio eorum puniceo, in recto calamo triangula, floribus in cacumine purpureis. Farina recentis vulneribus capitis indita, dolorē finit. Vulnera glutinat. Fracta ossa extrahit. Sed quotidie imponi debet, dum persanescant. Dolori capitis medetur, si iure decocti perfundatur, aut temporibus cum bitumine illinatur, aut radix suffiatur.

De Lyfimachia. CAP. IIII.

i yfimachia, quā aliqui Lytron appellant, caules emittit cubitales altioresve, fruticosos, tenues, prodeuntibus geniculatim folijs, tenuibus, salicis figura, gustu adstringentibus, flore rubro aut aureo. Gignitur in aquosis & palustribus. Foliorum succus adstringente sua vi sanguinis reiectionem suppressit. Dysentericis potui datur, aut infunditur. Mensum abundantiam sistit, in pello. Sanguinis profluuium subuenit, si nares ea hærba obturentur. Vulnerum cruorem cohibet. Acerrimum nidorem suffita reddit. Qua de causa serpentes fugat, & muscas interficit.

De Sanguinaria ceu polygono. CAP. V.

p Olygonum arrhen, aliqui Polygonatum appellant, alij Cynochalam, alij Heracliam, alij Asphalton, alij Chiliophylon, alij Clema, alij Polycarpon, alij Carcinethron, alij Teuthalida, alij Myrtopetalon, alij Cnopodion, alij zarithæa, alij Pedalion, Aegyptij Telphin, aliqui Stêphin, Magi genituram herois, alij qui vnguem muris, Latini Sanguinariam aut seminalem, Aphri Chulum. Ramos habet teneros & molles, frequentibus geniculis cinctos, qui per terram vt gramen repunt. Folia rutæ, sed molliora planioraqz. Semine sub omnibus folijs turgescente. Vnde mare appellari voluit. Flos ei cæcidus, aut puniceus. Vis epoti succi est spissare ac refrigerare. Prodest cruentæ excreationi, cholerae, alui fluxionibus, & urinæ

LIBER QVARTVS.

88

Stillicidio . Vrinam aperte ciet . Cum vino potus, contra serpentium morsus auxiliatur. Datur in febribus per horam ante significationes. Fœminarum profluuia impositu sistit. Idem succus purulentis auribus instillatur. Facit eximie ad genitalium vlcera , cum vino adiecto melle decoctus. Stomachi feruori, sanguinis reiectionibus, vlceribus quæ serpunt, ignibus sacris, collectionibus, tumoribus, & recentibus vulneribus folia illinuntur.

De Sanguinaria fœmina. CAP. VI.

Anguinaria fœmina fruticat vno caule, arūdinē teneræ simi-
 f li, densis geniculis, & in se tubarum modo factis, tuberibus
 articulorū eminulis, torulisq; cingentibus. Folijs piceæ. Ra-
 dicis nullus vsus. Nascitur in riguis. Huic quoq; spissandi refrigeran-
 diq; natura, ad eadem valens sed inefficacior.

De Polygonato. CAP. VII.

Olygonatum nascitur in montibus, frutice cubito altiore, fo-
 p lijs lauri, latoribus, & læuioribus, sapore mali cotonei, aut
 punici, cum quadam adstrictione. Flores per singulos folio-
 rum exortus promit, candidos, folijs numerosiores incepta a radice
 supputatione. Radicem habet albam, mollem, longam, crebro genicu-
 latam, densam, graueolentem, digitum crassitudine æquantem. Quæ
 vulneribus efficaciter illinitur. Quinetiam maculas in facie delet.

De Clematide. CAP. VIII.

Lematis Græcis, alijs Phyleteriō, ab alijs Daphnoides ab
 c alijs Smyrnoides, aut polygonoides appellatur. Læto pin-
 guiq; solo prouenit, iuncos spargens exiguos. Folia lauri
 figura & colore, multo minora. Folia cum caulibus in vino pota, alui
 profluuia & dysenterias sedant. Subdita in pello cum lacte & rosa-
 ceo aut cyprino, cruciatibus vuluæ medentur. Dolores dentium com-
 manducata finit. Imposita serpentium morsibus iuuamentum præ-
 stat. Fertur etiam contra aspidum ictus ex aceto pota opitulari. Gigni-
 tur solo inculto.

De altera Clematide. CAP. IX.

St & altera Clematis, quā aliqui Epigetin, Aegyptij Phila-
 c crion, Romani Ambuxū vocitant. Viticulos emittit rube-
 scentes, lentos, folium gustu admodum acre, ac exulcerās. Re-
 pit per arbores vt Smilax. Semen tritum pituitam bilemq; detrahit, in
 aqua aut hydromelite potum. Folia eius illita, lepras purgant. Cum
 Lepidio conditur ad cibos.

DE MEDICINALI MATERIA

De Polemonia. CAP. X.

Olemoniā alij Phylætheriā, Cappadoces Chiliodynamin p appellant. Ramis exilibus in versus vtrinque digestis. Folijs paulo quā Rutæ maioribus, ac longioribus, calaminthæ aut sanguinariæ proximis. Quibus in summis corymbi dependent, nigro semine. Radice cubitali, albicante, radicula simili. Nascitur in montosis & asperis. Bibitur in vino radix contra serpentes & dysenteriam. Et ex aqua aduersus vrinæ difficultatem & coxendicum cruciatus. Datur ex aceto drachmæ pondere lienosis. Eadem scorpionis plagæ alligatur. Tradunt eum qui radicem gestauerit, a scorpione non feriri, eumque si idcirco sit, nihil molesti passurum. Dentium dolorem manfa mitigat.

De Alo. CAP. XI.

ymphyton petreon id est alus, nascitur in petris, ramis tenuibus, paruis, origano similibus, capitulis thymi, surculosum totum, odoratum, gustu dulce, saluam ciens. Longa radice, subruffa, digitali crassitudine. Decoctum in aqua mulsa & potum pulmonis vitia purgat. Sanguinem reiicientibus & renū malis ex aqua datur. Ad dysenteriam rubramque sceminarum profluvia in vino decoctum. Ad conuulsa vero & rupta ex aceto mulso bibitur. Quin & com manducatum sitim sedat. Faucibus asperis subuenit. Vulnere recentia enterocelaque coaglutinat, & illitu cohibet. Carnes autem cum symphyto decoctæ coalescunt.

De Altero Symphyto. CAP. XII.

St & aliud Symphyton quod aliqui pecton, Romani Soldaginem vocant. Id caulem emittit bicubitalem, aut maiorem, crassum, leuē, angulosum, inanem, quasi fungosum, circa quē breui interuacante spacio, folia exeunt angusta, linguæ bubulæ proxima, oblonga, hirsuta, caule secundum angulos quosdam striato. Folijs tenuibus ex alarum finu prodeuntibus. In quibus flores lutei, rutaceis similes, & verbasci semina emicant. Tam caulis quā folia, aspera lanugine horrent, tactuque pruritus concitant. Radices demittuntur foris nigrae, intus candidæ, viscosæ. Quarum est vsus. Tritæ & potæ cruentis excreationibus, ruptisque proficiunt. Recentia vulnera illitæ coaglutināt. Carnes quoque si concoquantur, cogunt additæ. Inflammationibus præsertim sedis, cum functionis folijs, vtiliter illinuntur.

De Holosleo. CAP. XIII.

Olosteon quadrantalē hærbula est, humi repens, folijs viticulisque coronopo aut gramine proximis, gustu adstringentibus. Radice, alba, prætenui usque in capillamentis speciem, longitudine quattuor digitorū. Nascitur in collibus terrenis. Vsus eius

adrupta in vino potæ. Nā & carnes coguntur, decoctionibus addita.
De Stoebe. CAP. XIII.

Toebe quam alij Tobion, Romani stipam vocant. Vulgaris
est notitiæ. Cuius semen & folia stringunt. Quapropter deco-
ctum dysentericis infunditur. Auribus quoque purulentis
instillatur. Illita folia oculis ab ictu cruentis profunt. Erumpentis san-
guinis impetus, cohibent

De Volucro. CAP. XV.

Ræci clymenon vocant, alij Calycanthem, alij Perycly-
menon, alij Helyophyes, nonnulli Hepatitin, alij Milacem,
alij Anatolicon, alij Dyticon, alij merginæ, Latini volucrū,
aliqui volucrum maius. Aegyptij oxioni. Clymenion quod & ago-
non, id est sterile, nūcupant, caulem fert fabæ, quadratum, folia planta-
ginis, folliculis supra caulem in sese inflexis, iridi & poliporum cirris
non ab similibus. Probatissimum est e montibus. E frutice toto cum ra-
dice succus exprimitur, qui ad sanguinis reiectiones, in potu efficax est.
Celiacos rubraque foeminarum profluua, refrigerando infrenat. San-
guinem naribus erumpentem suppressit. Trita folia aut filiquæ recentis
bus vulneribus impositæ, ea ad cicatricem perducunt.

De Periclymeno. CAP. XVI.

Ericlymenon aliqui Aeginā, alij Cylmenon, alij Carpathon,
alij Splenion, alij Epetitin, alij Axinam maiorem, nonnulli
clemaritin, alij Myrcinen, alij Calycanthem, Magi polion
veneris, Aegyptij turcon, Romani volucrū maius, Aphri lanath ap-
pellant. Simplex fruticat, ex interuallis parua folia habens, ipsum am-
plectentia, subcandida, hederacea. Inter folia furculi exeunt, in quibus
baccæ, hederæ similes. Flos fabæ, candidus, aliquantum rotundus, &
quasi in foliū procubens, semen durū, & quod difficile euellatur. Radi-
ce rotunda, crassa. Nasctur in aruis ac sæpibus, cōuoluens se admini-
culis, propter assidentibus. Semen eius postquam ematuruit collectum, &
in vmbra siccatur, drachmæ pōdere datur in vino quadragenis diebus,
ut lienem absumat, ac molestiā discutiat. Sed urinā ciet, statim a sexto
die cruentā. Orthopnoeæ & singultui prodest. Partū accelerat. Folia
sunt eisdem viribus prædita. Quæ tricenis septenis diebus epota, steris-
ilitatem facere produntur. Perunctis ex oleo febrium rigores abigunt.

De Tribulo. CAP. XVII.

Ribulus aliquibus Bucephalus, alijs Tauroceros, Romanis
tribulus aquaticus dicitur. Tribuli genus vñū terrestre, folijs ad
effigiē portulacæ, tenuioribus viticulis, in terra stratis, spi-
nis secūda folia rigidis, præduris. Iuxta amnes & domicilia nascitur. Est

m. j.

DE MEDICINALI MATERIA

& alterū genus aquis familiare, quod in fluminibus natū comā exerit, aculeos condens. Folijs latis & pediculo longo. Caule parte summa q̄ ima crassiori. Capillamenta quædam indidem exorta spicantur. Semen durum, ab altero non abhorrens. Vterq; refrigerantis & inspissantis est naturæ. Ideo inflammationes omneis cataplasmate adiuuat. Vlcera in ore erumpentia, putredines, gingiuas, tonsillasq; perfanat. Succus ex his colligitur ad oculorum medicinas. Semen dum recens bibitur, calculosis iuuamētum affert. Drachma terrestris tribuli pota, illi ta ve, istos a vipera recreat. Contra venena cum vino aptissime bibitur. Decoctum eius sparsum pulices necat. Thraces qui ad Strymona amnē habitant, virēti tribulo equos sagināt, & e dulci semine & escu lento panem quo vescuntur faciunt.

De Sarxiphago. CAP. XVIII.

Sarxiphagō aliqui Sarxiphragō, alij Empetron, Romani saxifragiam vocant. Frutex est surculosus, in petris & asperis locis nascens. Coctus in vino, mox potus, febricitatibus opitulatur. Stranguriæ prodest. Singultum sedat. Calculos vesicæ frangit, & urinam ciet.

De Limonio. CAP. XIX.

Imonion aliquibus Potamogiton appellatur, alijs Neuroides, alijs Lonchitis, alijs Rapionion, Mysijs Mendruta, Syris Meuda, alijs Lycosemphyllon, alijs Heleborosemata, alijs Scyllion, Magis lupi cor, Romanis viartū nigrum, quibusdam titinabulum terræ, Gallis iumbarū, Dacis dacina. Folia habet betæ, renuiora & longiora, decem, sæpe plura, caulem tenuem, rectum, vt in lilio æqualem, seminibus scatentem, quæ gustata adstringunt. Semen tritum & ex vino acetabuli mēsurā potū, dysentericis cœliacisq; prodest. Rubra fœminarum profluvia sistit. Nascitur in pratis & palustribus.

De Lagopo. CAP. XX.

Agopus hærbā, quam aliqui Leporis cuminum appellāt, sistit aluum in vino pota, aut in febris ex aqua. Eadem inguini adligatur, in inflammatione. Nascitur in segetibus.

De Medio. CAP. XXI.

Edion aliqui medicam appellant, alij Triphyllon, alij Clemathion, nōnulli Osmō, quidā Trigonon, alij Cybelliō, alij polyphyllon, Romani Trifoliū odoratū, Aegyptij Epaphon. Medion in saxis & opacis nascitur. Folia habet Iridis, caulē tricubitalē, & in eo florē grandē, purpureū, rotundū, semine cnici minuto, radicem dodrantalem, crassitudine baculi, gustu acerbo. Quæ trita in

LIBER QVARTVS

90

farinam & ex melle decocta, rubros menses fœminarum sistit, eclegma-
te per aliquot dies sumpto. Semen in vino potum menstrua pellit.

De Epimedio.

CAP.

XXII.

Pimediū ab alijs Erincos, ab alijs Tryas, a nōnullis Polyr-
rhizon, a Romanis vindicta nominatur. Caulis est non ma-
gnus, hederæ folijs, denis atq; duodenis, neq; florem neq; fru-
ctum ferens. Radice tenui, nigra, graui odore, gustu fatuo. Nascitur in
humidis. Folia cū oleo trita, imposito cataplasmate, māmās increlcea-
re non sinunt. Radix cōceptū adimit. Folia quinis drachmis, post mē-
struas purgationes quinq; diebus in vino pota, præstant mulieribus
ne concipiant.

De Gladiola.

CAP.

XXIII.

x yphion, aliqui Anaſtorion, alijs Phalſganon, alijs Machæro-
nion, alijs Arion vocāt, Romani gladiolam, quidam genitalē.
Nomen inde accēpit, q̄ foliū, gladij præbeat speciem. Iri-
di simile erat, nisi minus & angustius videretur, & gladij modo mu-
cronatum, neruosumq;. In caulem exit cubitalem, in quo purpurei flo-
res, in ordinem digesti, inter se distant. Rotundo semine, radicibus ge-
minis, vna bulborum modo super alteram insidente. Quarum inferior
gracilis est, superna vberior. Nascitur in aruis. Pars superior radice
cum thure illita, admisto vino, spicula & aculeos e corpore extrahit.
Panos cum lolij farina & hydromelite discutit. Qua dere huiusmo-
di emplastris inferi solet. Menses imposita trahit. Superiorem radice ex
vino pota, venerem stimulari, & inferiore sumpta sterilescere tradunt.
Superiorem quoq; vtiliter infantium enterocelis, cum aqua potui dari
præcipiunt.

De Sparganio.

CAP.

XXIIII.

f Parganion aliqui Xiphidiō, alijs Bolon vocāt. Folia gladio-
læ, sed arctiora & in terram magis procumbentia. In summo
caule pilulæ prominent, in quibus semen. Contra serpentis
venenā, radix cum vino datur.

De sylvestri Iride.

CAP.

XXV.

x yris ab aliquibus Iris agria, ab alijs Cacos, a Romanis Gla-
diolus, aut Iris agrestis, a Dacis Caprus diciť. Folia habet
Iridis, latiora, & in turbinē mucronata, quorū medio caulis
erūpit, crassus, cubitalis, ex quo filiquæ triāgulares depēdēt. In quibus
purpureus flos, in medio puniceus. Semen in folliculis, simile fabis, ro-
tundum, rubrū, acre. Radix longa, geniculata, ruffa. Cōtra capitis vul-
m .ij.

DE MEDICINALI MATERIA

nera, fractaq; efficax est. Aculeos & spicula omnia citra, molestia ex-
trahit, adiecta floris æris tertia parte, & radice cetaurij ac mellis quin-
ta. Tumoribus & collectionibus illita cum aceto medetur. Radix ex
passo bibitur, ad cōuulsa, rupta, coxendicū dolores, strangurias & alui
profluuia. Semē tribus obolis potū, vrinā vehemētius impellit, & cū
aceto lienē absumit.

De Anchusa. CAP. XXVI.

a Nchusam aliqui cantanchusam vocant, alij Libycā, alij Ar-
chibelion, alij Alcibiadion, alij Onophyllō, alij Porphyri-
da, alij Mydusam, alij Calyca, alij Noneam, Aphri Bu-
nesath. Anchusa quæ alio nomine calyx, aut Onoclia appellatur, folia
habet laetucæ acuti folij similia, hirsuta, aspera, nigra, multa, quoquo
versum humi sparsa, spinis horrida. Radici crassitudo digitalis. Quæ
æstate prouenit, manus inficit sanguineo colore. Læto solo nascitur.
Radix adstringit. Ad ambusta & vetera vlcera, ex oleo & cæra efficax
est. Igni sacro cū polenta medetur. Lepris & vitiliginibus illinitur ex
aceto. Partus extrahit, vuluæ indita. Eius decoctū renū vitijs, lieni &
bile suffusus datur, & si febris sit, ex aqua mulsā. Sistūt aluū folia in vino
pota. Radice pigmentarij vtuntur ad spissamenta.

De alia Anchusa. CAP. XXVII.

e St & alia quam aliqui Alchibiadion, aut Onochiles appella-
rūt. Hæc a priore distat, q̃ minora habeat folia, sed simili mo-
do aspera, ramulos exiles, florem purpureum, radices rubras,
oblongas. Quæ messibus sanguineum succum fundūt. In sabulosis na-
scitur. Vis ei folijsq; inest, quæ contra virus cū reliquorū serpentū, tū
maxime viperarū, auxiliatur siue cibo, siue potu, siue alligatu. Nam si
quisquam mandens in serpentis os inspuat, eum necabit.

De alia Anchusa. CAP. XXVIII.

e St & alia huic haud dissimilis, semine puniceo, minore. Cu-
ius semen māducatū, si in serpētis fauces inspuatur, eā interfici-
et. Radix acetabuli mensura cū hyssopo & cardamomo po-
ta, latas vētris tineas excutit.

De Lycophi. CAP. XXIX.

i ycopis quæ a nonnullis Anchusa vocatur, lōgioribus q̃ la-
etuca constat folijs, asperioribus, latioribusq; crassius, ad radi-
cis caput recidētibus. Caule lōgo, recto, scabro, hirsutis adna-
tis, multis, cubitalibus, flore paruo purpureo. Radice rubra & ad-
stringente. Nascitur in campestribus. Cū oleo radix illita vulneribus
medetur, et cum farina hordeacea ignibus sacris. Sudores perūta mo-
uet, adiecto oleo.

LIBER QVARTVS

91

De Echio.

CAP.

XXX.

Chion aliqui aridam, alij Alcibiadion, Romani alcibiaccum
 c nominant. Folia habet prælonga, hirsuta, subalbida, an-
 chusæ proxima, minora tamen, subrubra, & pingua, spi-
 nulis tenuibus horridula. Cauliculos exiles, numerosos; minutaq;
 utroq; latere folia, in versus digesta, nigra, in summo caule minuscule.
 Flores secundum folia purpureos, in quibus semina capiti viperarum
 similia insunt. Radix nigricat, digito tenuior. Quæ non percussis mo-
 do a serpentibus ex vino prodest, sed eos qui antea biberint feriri non
 patitur. Folia & semen, idem præstât munus. Lumborū dolores sedat.
 In vino aut sorbitione sumpta lac extrahit.

De Ocimastro.

CAP.

XXXI.

Cymoides aliqui & hanc Echion vocant, alij Scorpiuron,
 o alij Sparganon, alij Althæam, alij Amaranthida, alij Proba-
 thæam, alij Elaphion, alij Antiminō, alij Porphyriada, alij
 Augion, alij Nemesion, alij Pphileræion, alij Hyænopolon, alij
 Thyrsitin, alij Themutin, alij Misopathos, Latini Ocimastri. Folia
 fert ocimi, & ramos dodrantes, hirsutos, filiquas hyoscyamo similes
 semine ut gith nigro prægnantes. Vim habet semen in vino potum,
 qua viperarum cæterarumq; serpentium moribus medeatur. Datur
 ischiadicis cum melle vino myrrha et pipere. Radice nititur tenui et
 superuacua.

De Erino

CAP.

XXXII.

Rinon aliqui Hydreron, aliqui Ocymoides vocant. Na-
 c scitur apud fontes et fluuios, folijs Ocymi, sed minoribus
 parte superna diuisis, quinque senisve, dodrantalibus surculis
 flore candido, semine nigro, et acerbo. Folia et caules lacteo succo tur-
 gent. Semen drachmis duabus, in quattuor mellis cyathis, oblitū ocu-
 lorū fluxiones cohibet. Succus cū sulphure et nitro instillatus, aurium
 dolores sedat.

De Gramine.

CAP.

XXXIII.

Grostia aliqui Egiron, alij Amaxitin, Aegyptij anuphi vo-
 cant, Latini gramen, aliqui Asyphylion, alij Sanguinalem,
 alij vniolam, Hispani apariam, Daci cotiatam, Aphri ie bal.
 Gramen geniculatis serpit ramulis a quibus crebro radices spargit dul-
 ces, articulis præcinctas. Folia dura, & ut arundinis parua lata, in ex-
 litatem fastigiantur. Ea q; iumenta & boues pascunt. Trita radix illitu
 vulnera conglutinat. Decoctum eius in potu, torminibus medetur, &
 urinæ difficultatibus. Calculosa etiam vesicæ excrementa cōminuit.

De Arundinaceo gramine.

CAP.

XXXIII.

St & arundinaceū gramē, priore multo maius, quod iumēta
 c necare traditur, præfert in babylone. Idq; iuxta vias nascit.

m. iij.

DE MEDICINALI MATERIA

De Gramine Parnasi. CAP. XXXV.

Vod in Parnaso monte gignitur, densius fruticat, folijs hederaceis, flore odorato, cādido, semine paruo, nō inutuli. Radicibus quinis aut senis, digitali crassitudine, cādidis, mollibus, & mirum in modum dulcibus. Succus si in vino cū melle pari, & myrrhæ dimidio decoquatur, adijcianturq; piperis & thuris tertiæ portiones, probatissimum erit oculorum medicamentum. Id in ærea pixide reconditur. Decoctum radicis, idem quod hærba, præstat. Semen vehementius vrinam impellit. Alium vomitioneq; sistit. Natū in Sicilia gramen, quod incolæ Cinnam appellant, boues inflāmat, si eo virēti sæpe pascantur.

De Siderite. CAP. XXXVI.

Ideritin aliqui Heracleam vocant, Magi genituram aut sanguinem titani, alij Scorpionis vrinā, Pythagoras Parmirō, Andreas Xanthophanea, Osthane boeophthalmon, Aegyptij sendionor, Romani vertemnum, alij Soleastrum, Aphri vdedonin. Folia habet Marrubij, sed longiora, satis ad frondem quærcus aut saluix accedētia, minora tamen, & hirsuta. Caules ædit quadratos, palmum sæpe excedentes, non iniucundi gustus, aliquantūq; substringentis. In quibus per interstitia, orbiculatæ vertebrae vt in Marrubio spectantur. Et semen in eis nigrum. Nascitur in petrosis. Illita folia, sua pte vi, vulnera sine inflammationis periculo iungunt.

De alia Siderite. CAP. XXXVII.

Lia Sideritis binū cubitorū, ramulis exilibus, folio Filicis, in ambitu vtraq; parte diuiso, pediculo lōgo, prodeūtib; e summo alarum finu furculis, longis, tenuibus, capitulo in cacumine orbiculato, aspero, in quo semen continetur, q̄ Betæ rotundius aliquanto, ac durius. Huius vis foliorumq; ad vulnera præcipua.

De alia Siderite. CAP. XXXVIII.

Ideritin aliam esse tradunt, quam Crateuas Heracleam vocat, in macerijs & vineis nascentem, folijs coriani, a radice numerosis, do drantalibus cauliculis, læuibus, teneris, in rubore candicantibus. Flore purpureo, paruo, gustanti amaro & viscido. Huius ea vis est, vt quamuis recenti vulnere imposita sanguinem supprimat.

De Achillea. CAP. XXXIX.

Chilleam aliqui Myriomorphon nomināt, alij Chiliophylon, alij Stratioticon, alij Heracleon, Latini supercilium venenis, alij Acron syluaticum, alij Militarem, alij Millefoliū

Aphri asterchillos, et aliqui Achilleam sideritin, Dodrantes aut maiores, gerit scapos, fuorum effigie, quasi minutulis folijs circumdatos, crebris in latere, foliorum sectionibus, coriãdri similitudine, subfuluo colore, odore multo, non insuaui, medicato, & viscido. Umbella in cacumine rotunda, floribus cãdidis, purpureis, & aurum æmulantibus. Prouenit lato solo. Trita coma sanguinolenta glutinat, & ab inflammationum periculo tuetur. Erumpentem sanguinem inhibet, & cruenta vuluæ profluua in vellere. Decocto quoq; insident fœminæ fluctione vuluæ laborantes. Ad dysenteriam bibitur.

De Rubo.

CAP.

XL.

Atos a Græcis, ab alijs Cynosbatos, ab alijs, Selinorition, ab alijs Syntrophos, a Magis titani sanguis, ab alijs ibidis sanguis, a Romanis Rubus, ab alijs Sentes, a quibusdam mora baticana, a Dacis manthia, Aegyptijs hæmoos, alijs Ametros appellatur. Rubus notitiæ vulgaris. Vim habet siccandi & adstringendi. Capillum tingit. Ramorum decoctum, potu aluum fistit, & fœminarum profluua. Præsteris morsui accommodatissimum. Gingiuas firmat. Oris vitrijs folia commanducata medentur. Cohibent vlcera quæ serpunt. Vlcibus in capite manantibus, oculisq; procidentibus, remedio sunt. Condylomatis & hæmorrhoidibus folia illinuntur. Cardiacis, & stomachi doloribus, trita conuenienter imponuntur. Caules cum folijs tunduntur, exprimiturq; succus, mox sole cogitur, singulari remedio, contra omnia, quæ modo dicta sunt. Mori in rubo nascentis, q̃optime maturi succus, ad oris medicamenta conuenit. Sistitur aluus præmaturi cibo, necnon flore in vino pot.

De Idæo Rubo.

CAP.

XLI.

Dæus Rubus appellatus est, quoniam passim in Ida proueniat. Est autem lōge tenerior priore, ac minoribus spinis horrens. Quamq; & sine spinis inueniatur. Eadem præstat quæ super dictus. Caterum flos cum melle oculorum collectionibus commo dissime illinitur. Ignem sacrum extinguit. Stomachicisq; ex aqua bibendus datur.

De Helxine idest murali hæba.

CAP.

XLII.

Elxinen aliqui Elitim vocāt, alij Canocersæā, alij Amelxinē, alij Eufinen, nonnulli, Amorginen, alij Sucotachos, alij Pychuacos, alij psychouacos, alij Melāpelon, alij Cirtāpelon, alij Cissamethō, alij Anatetamenō, Romani volutū lapparō, Aegyptij apap, alij Partheniō, alij Sideritin, alij Heracleā, nonnulli agriā, quidā Clibodiō, alij Polyonymō. Nascitur in sepibus, vinetis, maceijs, & segetibus. Folia ei mercurialis adsunt, hirsuta, cauliculi leniter

m .iiij.

DE MEDICINALI MATERIA

rubentes, & circa eos veluti semina aspera, adhærētia vestibus. Folia refrigerādi spissandiꝫ naturā habent. Qua ex causa sanāt illitu ignes sacros, adusta, condylomata, incipiētes panos, tumores, inflationesq;. Succus eius cū cerussa, ignibus sacris, & vlceribus quæ serpunt, aptissime illinitur. Imponiturq; podagris, cum hircino seuo aut cærato cyprino. Veterem tussim adiuuat, cyatho hausto. Tonsillis inflammatione turgentibus, vtilissime & gargarizatur, & illinitur. Succus in aurium dolore infusus, iuuamen præstat.

De Elatine. CAP. XLIII.

e Latine folia habet Helxinæ, minora, rotundiora, pilosa, semipedalibus ramulis, quinis senisve, a radice foliosis, gustu adstringentibus. Nascitur in segetibus & cultis. Oculorum fluxionibus et inflammationibus auxiliatur, folijs cum polēta tritis et impositis. Eadem cocta sorbitionis vsu dysenteriam sistit.

De Eupatorio. CAP. XLIIII.

e Vpatorium siue vt alijs placet hepatorium, aut hepatitis, fruticosa hærba est, vnum efferens caulem, lignosum, nigricantem, rectum, tenuem, hirsutum, cubitalem, interdum ampliorē. Folijs per interualla quinquifolij aut Cānabis similibus, quinquepartito aut amplius diuisis, nigricantibus, per ambitum serratis. Semen medio caule erumpit, pilosum, deorsum spectans, quod ficutū vestibus inhæret. Contrita huius folia, & cum suillo adipe imposita, vlceribus quæ ægre cicatricem trahunt, medentur. Hærba aut semen in vino potum, dysenteria, iocineris vitijs, & serpentium iectibus, liberat. Nec defunt qui aberrantes, Artemisiam hanc appellarint, cum tamen longe alia sit, vti exposuimus.

De Quinquefolio. CAP. XLV.

p Entaphyllon aliqui Pentapetes, alij Pentatomon, alij Pentadactylon, alij Pseudoselinum, alij Callipetalon, alij Xyloloton, nonnulli Xyllopetalon, alij Asphalton, alij Pentaœnon, alij Thymiatitin. Aegyptij Orphitebeocen, alij Enotrō, Magi Ibidis vnguem, alij Ibidis penam, alij Hermodactylon, Romani quinquifolium, Galli pempedulam, Daci propedulam appellant. Ramulos fert surculaceos, tenues, palmi magnitudine, in quibus semē, folia mentæ, quina singulis pediculis, raro plura, in ambitu ferrata, florem ex luteo pallescētem, interdum auri æmulum. Nascitur in riguis, & aquarijs ductibus. Subrubram habet radicem, oblongam, veratro nigro crassiorē. Plurimis pollet remedijs. Ius radicis decoctæ ad tertias, si in ore contineatur, dentium dolores sedat. Putrida oris vlcera, collutione sistit. Arteriæ scabricias, gargarizatu læuigat. Cōtra alui

profluua, & dysenterias auxiliatur. Item articulorum coxendicumq; cruciatibus potum. Cocta in aceto & illita, serpentia vlcera cohibet. Strumas, tumores, duricias, abscessus, & distentiones discutit. Ignēs sacros, reduuias, condylomata, pforasq; sanat. Teneræ radice succus, cōtra iocineris pulmonumq; vitia prodest. Item aduersum venena. Cū hydromelite autem vel diluto vino & piperis exiguo, bibuntur folia, contra febrium circuitus. In quartana quidem quaternum ramulorū, in tertiana vero ternum, in quotidiana vnus. Tricena quoq; folia, tricenis pota diebus, comitialibus profunt. Foliorum succus, tribus cyathis aliquot dies potus, celerrime regio morbo medetur. Illita cū melle & sale, tam vulneribus q̄ fistulis remedio sunt. Enterocelicis auxiliū præstant. Quinquifolium sanguinis profluua & potu & illitu sistit. Ad expiationes, castimonias, & sanguinis eruptiones inciditur.

De Phœnice.

CAP.

XLVI.

P Hœnicen aliqui rhon, alij Anchinopa, alij Phœnicopteron, alij Rhonstachyos, alij Osthalen, Aegyptij Athnō nominant. Folia habet hordei, sed breuiora, & angustiora, spicā lolio similem, ramos digitorum senum, radici aduolutos, septenas octonasve spicas. In aruis tectisq; recenter illitis nascitur, harum viriū compos, vt in vino austero pota, alui profluuium & emanantem vluua sanguinem sistat. Vrinæ impetus infrenet. Sunt qui ad alligatam in puniceo vellere & suspensam, sanguinem suppressere prodant.

De Idæa radice.

CAP.

XLVII.

I Dæa radice folia sunt ea quæ Rusco. Adhærent his veluti exigui pampini, in quibus flos, Radix spissandi cohibendiq; naturam habet, his conueniēs, quibus ad strictione opus est. Pota citam aluum mensescq; & omnem abundantiam sanguinis sistit.

De Rhodia radice.

CAP.

XLVIII.

G Ignitur rhodia radix in Macedonia, costo similis, leuior, inæquabilis. Quæ cōtrita rosas redolet. Vtilissima capitis doloribus, si madefacta frōti & tēporibus cū nardo imponatur.

De Equiseto.

CAP.

XLIX.

E Quisetum Græci hippurin, alij Trimachion, alij Anabasin, alij Cheredranon, alij Phædran, alij Iriandendron, alij gis, alij Scœniostrophon vocant. Aegyptij pherphram. Magi saturni cibum, Romani equinalem, alij equi salicem, aut Anabasion, alij Ephydron. In riguis & scrobibus nascitur. Cauliculi prodeūt inanes, geniculati, in se facti, rubescētes, scabri, & iuncea circa eos folia, crebra, exilia. In sublime equisetum attollitur, vicinos arborum caudices

DE MEDICINALI MATERIA

scandens, obuolutumq; dependet, comis multis, nigris, vt equorum cauda. Radix lignosa, dura. Vis eius spissare. Quare sanguinē naribus erumpentē succus ipse sistit. Prodest dysentericis in vino potus. Vri nam cit. Sanguinolēta vulnera glutinantur, tritis folijs & illitis. Tussim orthopnoeam ruptaq; adiuuat. Folijs in aqua potis, dissectiones vesicæ & intestinorum, enterocelæq; in vnum coalescere, cogiq; feruntur.

De altero Equifeto. CAP. L.

Lterum Equisetum quod aliqui Equition, alij Chedran, alij
 a Gynon appellant. Caulis est rebus, cubitalis, aut maior, inanis. Comis per intervalla breuioribus, cādidioribus, & mollioribus. Id cum aceto tritum vulneribus remedio est. Eademq; fungitur facultate.

De Cocco seu infectorio. CAP. LI

Occū quo infectores vtuntur, frutex est furculosus, paruus,
 c cui grana ceu lentes adhærent, quæ electa congeruntur. Optimum gignitur in Galatia & Armenia. Deinde Asia & Silicia. Vltimus ex omnibus Hispanicus. Vis huic spissandi. Vulneribus nervisq; præcis, cōuenienter ex aceto illinitur. Nascitur quoq; in Siliciæ quærcubus, cochlearum exilium similitudine, quod illius regionis mulieres orelegunt & Coccum vocitant.

De Tragio. CAP. LII.

Ragium nascitur in Creta tantum insula, lentisco simile, & semine, folio & ramis. Singulis tamen minoribus. Succus ei laevis, gummi non dissimilis. Semen folia lachrymaq; illitu spicula e corpore eijciunt. Omnia quoq; corpori impacta, euocant. Potest stranguriæ medentur. Calculos vesicæ frangunt. Menses trahunt. Modus in sūptione est, drachma vna. Fama est sylvestres capras sagittis confossas, eius hærbæ pabulo, spiculā excutere.

De alio Tragio. CAP. LIII.

St & aliud tragium quod tragoceros aliqui vocant, alij Scorpion, alij Garganon, Romani cornulacā, Daci Saliā, Aegyptij sober, Aphri Achæosim. Folia scolopendrij habet, & radicem sylvestris raphani, tenuem, candidam. Quam crudam vel coctā esse dysentericis prodest. Folia autumno, hirci virus olent. Exinde sibi tragij nomen adoptauit. Prouenit in montibus, & præcipitijs.

De Trago. CAP. LIIII.

St etiam hærbæ Tragos, quam aliqui scorpion aut Tragos non vocant, maxime in maritimis nascens, palmum alta, aut amplior, fruticosa, humilis, oblonga, sine folijs, pusillis circa

ramos acinis ruffis, multis, magnitudine tritici, acuto cacumine, gustu multum adstringente. Racemorum grana decem ex vino pota, cœliacis, et fœminis fluxione vuluæ laborantibus, auxiliatur. Tūduntur a plerisque, et in pastillos digerūtur, quibus vtuntur.

De Iunco CAP. LV.

Xyschinos aliquibus Schinos læuis, alijs Oxypternos, alijs Solis superciliū, Romanis Iūcus marinus, aut manualis dicitur. Duo eius genera. Vnum læuis nominati, alterū acuti, qui in mucronē fastigiatur. Cuius etiam duo assignantur genera. Vnū sterile. Reliquum fert semen nigrum, rotundum, & crassiore constat calamo, carnosioreq;. Tertius est iūcus qui vocatur Oloschinos, prioribus carnosior, asperiorq;, qui similem fructum in cacumine parit. Semē vtriusq; tostum, ex diluto potum, fistit aluum, & rubra fœminarum profluvia. Vrinam cit. Capitisq; dolores facit. Quæ proxima sunt radicis folia, tenera conuenienter illinuntur, aduersus phalangiorum morsus. Aethiopici iunci semine, somnus allicitur. Sed modus in potione seruandus est, ne sopor fiat.

De Lichenæ. CAP. LVI.

Ichen qui saxis est familiaris, aliquibus Bryon appellatur. Asperginosis petris adhæret, vt muscus. Qui illitus sanguinis profluvia fistit. Inflammationes arcet. Impetigini medetur. Iuuat regio morbo correptos, cum melle illitus, Oris & linguæ defluuiones inhibet.

De Parrhonychia. CAP. LVII.

Arrhonychia alijs Adocetos, alijs Neuras, alijs Phrynion, Romanis bouinalis, exiguis frutex in petris nascens, peplo similis, minor longitudine, maioribus folijs. Illita Paronychijs atq; duricijs remedio est.

De Chrysocomæ. CAP. LVIII.

Chrysocome, alijs Chryfitis, alijs Chrysanthemon, nonnullis amaranton, alijs Diospogon, Aphris dubath, vel buchumath, Romanis iouis barba appellatur. Palmi altitudine fructuat. Coma specie corymborū, hyssopo simili. Radice hirsuta veratri nigri modo, tenui, cyperum æquante, gustu nō iniucundo, ex austero dulci. In petrosis opacisque nascitur. Radix excalfacit & adstringit. His conueniens, quos iecur aut pulmonis inflammatio male habet. Contra purgationes vuluæ, decocta cum hydromelite assumitur.

De Chrysogono. CAP. LIX.

Chrysogonon, aliqui Chrysospermon vocant, alijs Daspin, alijs Organū, alijs Arcophthalmon, Romani Arilana. Dese

DE MEDICINALI MATERIA

fruticat, quærnis folijs, flore coronarij Verbasci. Radix vt rapum extu-
berat, intus ruberrima, foris nigra, quæ trita cum aceto, atq; imposita
muris aranei morfibz auxiliatur.

De Elichryso. CAP. LX.

Lichryson quidam Chrysanthemon, nonnulli & id amaran-
ton vocant, quo Lymphas coronant. Ramulum habet can-
didum, virentem, rectum, firmum. Folia intercedentibus spa-
cijs angusta, Abrotono similia, comam aureæ lucis, in orbem, umbel-
la rotunda, veluti siccis corymbis dependentibus, radice tenui. Nasci-
tur in asperis & torrentium alueis. Contra serpentium ictus, coxendi-
cum dolores, vrinæ stillicidia, ruptaq; coma e vino pota opitulatur.
Ciet menses. Sanguinem concretum ventris ac vesicæ absumit, pota
cum mulso folia. Ieiunis, trium obolorum pondere, sistit destillatio-
nes, data in vino albo diluto. Vestibus inseritur, vt eas ab erodētium
iniurijs tueatur.

De Chrysanthemo. CAP. LXI.

Chrysanthemon aut chalcas, aliqui chalchitin vocāt, alij chal-
canthon, alij chalcanthemon, alij Buphthalmon, Romani
acanthan, Hetrusci garuleū, Aphri churseten. Hærbæ est tes-
nera, fruticosa, læues proferens caules, & multifida folia, flores supra
modum splendentes, luteos, orbem oculi imitantes, vnde nomē traxit,
Propter oppida nascitur. Cuius caules oleris vice manduntur. Flores
cum carato triti, steatomata discutere produntur. Regio morbo cor-
reptis, colorem breui reddit, si sequente longo balnei vsu, post exitum
ebibatur.

De Agerato. CAP. LXII.

Geraton fruticosa hærbæ est, palmari longitudine assurgens,
simplex, humilis, Origano non dissimilis. Umbellam gerit,
in qua flos bullis aureis emicat, elichryso minor. Nomen ei
inditum est, quoniam diutissime flos, in sua coloris specie, cōseruetur.
Vis decocti feruens. Huius vsuæ nidor vrinam cit, et vuluæ duricias
emollit.

De Verbenacæ. CAP. LXIII.

Erbenacam rectā, Græci peristereona vocāt, alij Trigonion,
alij Bunion, alij Hierobotanen, alij Philtrodoten, Aegyptij
pempsempe. Magi Iunonis lachrymā, nonnulli mustellæ san-
guinem, alij Sanguinem Mercurij, Romani Cristam gallinaceam, alij
Pheriam, alij trixalidem, alij exuperam, aliqui hærbam sanguinalem.
Nascitur in aquosis. Nomen ex eo duxisse videtur, quod columbæ circa
hanc, perq; libenter versari soleant. Palmi altitudine et interdum am-

plius adolefcit. Folia e caule prodeūt incifa, & fubalbida. Ea fingula
ri ramo, radiceq; fola, conftare ſæpius inuenitur. Folia cum fuilla adipe
recenti, aut roſaceo impoſita, vuluarum dolores finire putantur. Ignē
ſacrum illita ex aceto reprimunt. Putrida vlcera cohibent. Vulnera
glutinant. Veteraq; ex melle, ad cicatricem perducunt.

De Supina verbenaca. CAP. LXIII.

Vpinam verbenacam aliqui ſacram hærbam appellant, alij
f Erigeniō, alij Chamælycon, alij Sideritin, quidam Curitin,
alij Perſephonion, alij Iouis colū, alij Dichromon, alij Cal-
lefin, alij Hippariſon, nonnulli demetriada, Aegyptij pēphtheuphthā,
Pythagoras Eryſſepton, Romani cincinallem. Ramulos emittit cu-
bitales, aut maiuſculos, anguloſos, in quibus ex interuallis folia quæ-
cus, ſed minora anguſtioraq; eiſdē diuiſuris in ambitu, colore aliqua-
tenus cæſio. Radix longa, tenuis. Flores purpurei, graciles. Folia cum
radice in vino pota, illitave, aduerſus ſerpentes pollent. Eadem dra-
chmæ pondere cum thuris obolis tribus, in vini veteris hemina, qua
dragenis diebus ieiuino ore, contra regium morbum bibuntur. Vete-
res tumores & inflammationes mitigant. Sordida vlcera purgant. To-
ta in vino decocta tonſillarum cruſtas abrumpit. Oris nomas garga-
riſatu cohibet. Aiūt ſi aqua ſpargatur triclinium, qua maduerit, lætio-
res conuietus fieri. Datur potandum in tertianis febribus, tertium a
terra geniculum, cum folijs circulantibus, quartanis quartum. Sacra
vocat hærbam, quoniam multum ad amuleta, expiationeſq; commen-
detur.

De Aſtragalo. CAP. LXV.

a Stragalū aliqui Chamælycen, alij Gatalen, alij Onyca vo-
cant, Romani Pinum triuiam, aut ficum terræ, aliqui glan-
dulam, alij Thium, alij Nonariam. Aſtragalus paruus in ter-
ra frutex, folijs & ramis lupino ſimilis, flore purpureo, paruo, radice ro-
tunda, raphani modo grandi, quæ adnatas appendices, firmas habet,
nigras, præduras, veluti cornua inter ſe implicatas, guſtu adſtringen-
tes. Naſcitur in vêtōſis, opacis, & inuallibus. Eo Mēphis Archadiæ
ſcatet. Aluum ſiſtit radix in vino pota. Vrinam mouet. Vetuſtis vlce-
ribus, ſicca efficaciter inſpargitur. Sanguinē ſupprimit. Aegre propter
duriciam tunditur.

De Hyacyntho. CAP. LXVI.

h yacynthum aliqui Heloniam, alij porphyranthes, Roma-
ni vaccinum, alij vlcinum vocant. Folia habet bulbi, dodran-
talem caulem, minimo digito tenuiorem, hærbaceum, co-
mam procumbentem, florum purpureorum plenam, incuruam, radicē

DE MEDICINALI MATERIA

bulbaceam. Quæ vt creditur, pueris cum vino albo illita, puberitatē coerct, & non patitur erumpere. Sistit aluum. Pota vrinam impellit. Phalangiorum moribus auxiliatur. Semen adstringentius est, theriacis expetitur. Regium morbum emendat, cum vino potum.

De Papauere erratico. CAP. LXVII.

Papauer erraticum quod Rhoëa vocant, nonnulli Oxytonon, Romani papaueralem, Aegyptij nanti, vere quidem in aruis cū hordeo nascitur, flore protinus deciduo, vnde et nomen apud Græcos accipit. Folia erucæ aut origano aut cichorio aut thymo similia spectantur, sed longiora, diuisa, scabra. Iunceus ei caulis, rectus, cubitalis, asper, flos sylvestris fremij, puniceus, interdum albus, oblongum caput, sed q̄ fremij minus, semen rufum, radix longa, subalbida, minoris digiti crassitudine, gustu amara. Huius capita quinque aut sex, in vini cyathis tribus ad dimidias decocta, potui dabis, quibus somnus accersuolus est. Semina acetabuli mensura ex aqua mulla pota, aluū leniter emolliūt. Ad idem præstandū mellitis rebus, & dulciarijs, ammiscetur. Folia cum calycibus illita, inflammationes sanant. Eorumdem fotu & perfusione, somnus allicitur.

De Papauere satiuo. CAP. LXVIII.

Papauer satiuū aliqui chamaefycen, alij oxytonon appellant, Romani papauer, Aegyptij nanti. E satiuo genere, quoddam hortensium est, cuius semen in panem densatur, qui sanis in vsu sit. Eo etiam ex melle pro sesama vtuntur. Thylacitin vocant. Capitulum habet longum, & semen candidum. Sylvestre vero, caput infidens demissumq̄ et nigrum semē. Quod pithitis nominatur. Nonnullis tamen & ipsum rhoëas dicitur, quoniam eius scapo lacteus succus emanat. Tertium magis sylvestre, & ad medicinas valētius, multo his longius, productiore capitulo. Omnium in commune natura refrigeratrix. Quare si capita ipsa & folia decoquantur in aqua, somnū fotu conciliabunt. Bibitur decoctum cōtra vigilias. Calyces cum polenta triti, & cataplasmatibus ammissi, ignibus sacris, & inflammationibus profunt. Tunduntur quoq̄ virides, & digeruntur in pastillos, qui ficcati ad vsū reconduntur. Capita quoq̄ in aqua coquūtur ad dimidias, iterumq̄ adiecto melle, dum humor coeat in eclegmatis lentore. Id medicamentum in tussi, arteriæ fluctionibus, & celiacorum affectu, doloris leuamētum præbet. Efficacius tamen redditur, addito hypocythidis succo, & acacia. Papaueris nigri semen tritum cū vino bibitur, contra citam aluum, & fœminarum profluvia. In peruigilijs frōti tēporibusq̄ illinitur, ex aqua. Opiū eius, magis refrigerat, inspissat, fccatq̄. Sumptum erui magnitudine, dolorem finit, cōcoquit, & some

num allicit. Tussi atq; celiacorum valetudini auxiliatur. Verum si copiosius hauriatur, nocet, cum lethargicos efficiens interimat. Ad dolores capitis, cum rosaceo perfusum efficax est. Aurium dolori, cum amygdalino, myrrha & croco instillatur. Inflammationibus oculorum cum torrefacto oui luteo proficit. Igni sacro & vulneribus cum aceto, podagris cum lacte mulieris & croco. Somnum accersit, subditum sedi probalano: Optimum habetur graue, & densum, gustu amarum, odoratu soporiferum, quod facile aqua diluitur, læue, candidum, neq; asperum, neq; grumosum, quod inter colandum non ut cæra coeat, et in sole diffundatur. Dein ad motum lucernis non atra luceat flamma, extinctum deniq; odoris vim cõseruet. Sed opion glaucio, gummi, aut sylvestris lactuca succo, adulterant. Verum glaucio fucatum in dilutione croci colorem reddit, lactucaceo succo fictum, exiliter spirat, & asperius spectatur. Gummi vitiatum, splendescit, & infirmum est. Nec desunt qui eo dementia deuenierint, ut adipem ei admiscerent. Fictili nouo torretur ad oculorum medicamenta, dum mollius, atq; rufius appareat. Diagoras, ut Erasistratus author est, usum eius damnavit, oculorum lippitudinibus & aurium vitij infundi vetans, quoniam visus aciem hebetaret, & soporem gigneret. Addidit Andreas, illitos eo protinus excari, si non adulteraretur. Mnesidemus usum dumtaxat olfactandi probauit, quoniam ad conciliandum somnum conueniret, alioqui nobis ut noxiõ interdicit. Quæ commentitia esse, experimento deprehenduntur. Siquidem effectus, virium huiusce medicamenti, fidem faciunt. Quare non alienum fuerit scriptis mandare, quonam modo is excipiat succus. Aliqui capita ipsa & folia tundunt, & prælo exprimunt, terentesq; in mortario, digerunt in pastillos. Id meconium vocatur multum opio ignauius. Porro opij faciendi ratio hæc est. Cum ros in eo exaruerit, cultro circũdante asterisco, ne penitus adigatur, ex obliquo in rectum summam cutem incidere oportet, lachrymam exeuntem, digito in concham abstergere. Nec multo post redire, ut cõcreta inueniatur. Etenim quæ tum, aut postero die etiam offenditur, in veteri pile teri debet, & in pastillos cogi. Cum tamẽ inciditur retrocedendum est, ne vestibus succus deradatur.

De corniculato Papauere. CAP. LXIX.

Papauer ceratidem idest Corniculatum, aliqui paralion, alij sylvestre Papauer, alij Thalassion, Romani fabulum marianum, Aphri Sifimacam vocant. Folia habet cãdida, hirsuta; verbasco similia, in ambitu sylvestrium papauerum more serrata, caule non dissimili, flore luteo, calyculo sœnogræci, in corniculorum modum inflexo. Vnde nomen mutuatur. Semine papaueris, pusillo, nigroq;

DE MEDICINALI MATERIA

radice per summa cespitū, nigra, crassa. Nascitur in maritimis & asperis. Radici ea vis inest, vt in aqua decocta ad dimidias, coxendicum & iocineris affectus, potu sanet. Prodest his qui crassa quædam, aspera aut araneosa cum lotio reddunt. Alium leniter purgat semen, acetabulo in aqua mulsa poto. Crustas emarginant, illita ex oleo folia, floresq̃. Argema ac nubeculas iumentorum perunctas, abstergunt. Sunt qui glaucium, hoc papaueris genere factitari existimarunt, falsi quadam foliorum cognatione. Qui hoc papauer hauserit, non alia accident, q̃ qui opium ebiberit. Cui eisdem succurritur auxilijs. Semen æstate dum sicum est, colligitur. Decoctum radice bibitur cum vino, sanatq̃ dysenteriam.

De spumeo Papauere. CAP. LXX.

Iterum papaueris genus, aphrodes idest spumeum vocatur, ab alijs Heracleum, caule dodrātali, folijs admodū paruis, radiculæ similibus, fructu inter ea candido. Nam hærbula alba est & spumæ tota. Radice in summo cespite. Legitur æstate semen, cū integre adoleuit, deciditq̃ exiccatum. Datū acetabuli mēsurā in aqua mulsa, vomitione expurgat. Priuatim huiusmodi purgatio, comitialibus prodest.

De Hypécoo CAP. LXXI.

ypæcoon, aliqui Hypopheon vocant. Nascitur in segetibus aruisq̃, folijs rutæ, exilibus ramis. Natura eadem quæ papaueris succo.

De Apollinari & hyoscyamo. CAP. LXXII.

hyoscyamon, alij Pythonion, aliqui Dioscyamon vocāt, alij Adamāta, alij Adamenon, alij Hypnoticon, alij Emmanes, alij Atomon, nonnulli Dithiambrion, Magi, Pythagoras et Ofsanes, zeleo, Zoroastres Tiphomon, alij Raponticam, Romani apollinarem, Aegyptij Saphtho, Hetrusci fabulū, Galli billinuntiā, Daci dieliām. Frutex est caules emittens crassos, folia lata, oblonga, diuisa, nigra, hirsuta. Flores e latere caulis, ordine prodeunt, tanq̃ puni corum cytini, scutulis septi seminum plenis, vt papaueris. Tres eius differentiæ. Vna semine nigro, floribus pene purpureis, similaceis folijs, cytiniis præduris, & spinosis. Alterius semen subflauum, vt Iriosis. Flores lutei, folia & siliquæ simpliciores. Ambo insaniam gignūt & soporem. Ideo in communi vsu damnātur. Tertium genus vt quod mitissimum esset, medici recepere, pingue, lanuginosum, molle, candidi floris seminisq̃, in maritimis ruderibusq̃ nascens. In cuius deficiētis vicē, ruffum vsurpari oportet. Niger vt deterrimus, improbatur. Recenti semine, caulibus folijsq̃ tuis, succus in sole exprimitur, & exic-

cato humore, vsus ad annum vsq; prorogatur. Nam facile corruptio-
nem sentit. Extrahitur etiā separatim ex sicco semine, in aqua calida tu-
so, & obtrito. Succo autem liquamentum præstantius, & magis dolo-
res finit. Contusa hærba, addita trimestri farina, digeritur in pastillos,
& reconditur. Liquamentum primum, & quod a sicco semine exem-
ptum est, collyrijs quæ doloris sensum auferunt, commodissime inse-
ri solent. Cōtra acutas calidasq; fluctiones, dolores aurium, atq; vul-
uæ mala profunt. Cum farina autem aut polēta, oculorum, pedum, cæ-
terarumq; partium inflammationes placant. Semen eadē præbet. Tusa
si, destillationibus, oculorum fluctioni, & doloribus, efficax. Contra
mensium abundantiam, & erumpentem aliunde sanguinem, oboli
pōdere cum papaueris semine & aqua mulsa, bibitur. Podagris subue-
nit, testibus inflatis, mammisq; tumentibus a partu, tritum ex vino il-
linitur. Alijs quoq; cataplasmatibus, quæ doloris leuamentum præstant,
ammisceri solet. Folia omnibus medicamentis dolorem sedantibus,
per sese, & ex polenta, vtilissime imponuntur. Recentia, ad mitigan-
dos omne genus dolores, oblinuntur. Cum vino ter quaterve pota, sa-
nant algidas febres, quas hepialos vocant. Cōsta olerū modo folia, si
acetabuli mensura manduntur, mediocrē insaniam gignunt. Idē effi-
cere tradunt, si colo vlcus sentiente infundantur. Radice in aceto deco-
cta, dentes in dolore colluuntur.

De Psyllio.

CAP. LXXIII.

psyllion aliqui cataphysin, alij Cynocephalion, alij Chrysta-
lion, alij Cynomyam, alij Psyllerin, alij Sicelioticon, Siculi
comidijn, Romani hærbam pulicarem aut silbacium. Aphri
Vargugum appellant. Folijs coronopo non dissimilibus, hirsutis, lon-
gioribus, sarmentosa in totum hærbula, ramis dodrantalibus. Coma
a medio caule exoritur, duobus tribusve conuolutis in cacumine capi-
tulis, semine duro, nigro, pulicum simili. Vnde & nomen. In aruis &
incultis nascitur. Vis ei ad refrigerandum, inspissandum, & mollien-
dum conueniens. Articulorum morbis, parotidibus, tuberculis, tu-
moribus, vulsis, illitum auxiliatur. Imponitur in dolore capitis, cum
rosaceo aqua aut aceto. Enterocelis infantium, & prominenti vmbili-
co, illitum ex aceto, medetur. Teritur acetabuli mensura, & in aquæ
sextario madefactum, vbi concreuit aqua, illinitur. Siquidem vehemē-
ter refrigerat, & in feruentem aquam deiectum, calorem reprimat. Con-
tra ignes sacros efficax est. Fama est, si virens domum importetur, non
finire in ea pulices gigni. Cum adipe tusum, sordida vlcera, & quæ cæ-
coethe vocatur, expurgat. Succus vermiculosis auribus, aut fluctione
laborantibus, ex melle prodest.

DE MEDICINALI MATERIA

De Hortensi Solano. CAP. LXXVII.

Ortenfium seu vrbānū Strychnon Romani Solanum vocant, alij Cacabalum, Aegyptij allelo, Galli scubulum, Aphri astrismunim. Frutex cibus idoneus, exilis, pusillus, multis concavus alis, folio nigro, maiore q̄ ocimi, & latiore, fructu rotundo, viridi, qui post maturitatem nigricat, aut fulvescit. Hæba innocentis gustus. Natura ei refrigerandi. Quare folia vlceribus quæ serpunt, & ignibus sacris, conuenienter cum polline polentæ illinuntur. Aegilopia, capitisq̄ dolores, trita & imposita sanant. Aestuanti stomacho auxiliantur. Parotidas, cum sale detrita illitu discutiunt. Valet succus eius aduersus ignem sacrum, atq̄ vlcera quæ serpunt, cum cerussa, rosaceo & argenti spuma, ad ægilopas cū pane, infantium adustioni quam syriam vocāt, cū rosaceo perfusus proficit. In colyrijs, aquæ vel oui vicem exhibet, contra acutas fluxiones, suffusionesq̄. Aurium dolori instillatus prodest. Mensum abundantiam sistit, in velere subditus. Succus fuluo gallinarum in domibus oberrantium fimo subactus, & linteo appositus, ægilopijs præsentaneo est remedio.

De Veficaria. CAP. LXXV.

St & aliud solanum, quod peculiari nomine Halicacabon, id est veficariā, aut Physalida vocāt, folijs antedicto latioribus. Cuius caules, posteaq̄ adoleuerunt, humi prosternuntur, folliculis orbiculatis, fuluo intus acino, vesiculis simili, rotundo, læui, Quo coronarij vtuntur, & corollas faciunt. Vim vsusq̄ hortensij solani habet. Verum cibus nequaq̄ expetitur. Regium morbum purgat, semine poto. Et vrinam pellit. Ex vtraq̄ hæba succus extrahitur, qui ficcatus in vmbra reconditur, ad eadem valens.

De Solano somnifero. CAP. LXXVI.

Olanum somniferum e Græcis aliqui Dircion appellant, alij Strychnon, alij Manicon, alij Dorycnion, alij Calliada, Romani Apollinarē minorē, alij Vlticanā hæbā, aut opfaginē, Daci Cycolidē, Pœni Cacabū. Fruticat multis ramis, densis, lignosis, fractu contumacibus, pinguiū foliorū cotoneæq̄ mali similibus, flore grādi, rubro, fructu in folliculis crocato, radice lōga, subrubro cortice vestita. Nascitur in saxis non procul a mari. Radicis cor

LIBER QVARTVS

98

tex, in vino drachmæ pōdere potus, somnificā vim habet, opio mitiorē. Semen vehemēter vrinā cit. Corymbi duodeci, hydropicis dātur. Si quid numero adijciatur, alienationem mentis faciunt. Remedio est aqua copiosa mulsa, potui data. Succus pastillis inferitur, & medicamentis quæ doloris leuamentum præbent. Decoctus in vino, si in ore contineatur, dentium doloribus auxiliatur. Radicis succus, cum melle illitus, oculorum hebetudines tollit.

De Manico solanō. CAP. LXXVII.

Trychnon siue solanū Manicon, aliqui Persion, alij Thryon appellauere, alij Andron, alij Pentadryon, alij Enoron, quidā Orthogyon. Huic folium erucæ simile, maius aliquāto, satis ad spinam quam pæderota vocant, accedens. Caules a radice eximios emittit, decem aut duodecim vlnarum altitudine adolescētes, caput in cacumine oliua maius, & latius, & vt platani pillula, hirsutius, florem nigrum. Postq̃ eo exuitur, racemus exit rotūdus, niger, denis aut duodenis acinis constans, similibus hederæ corymbis, vt vux mollibus. Radice firmatur candida, crassa, caua, cubitali. Gignitur in montibus vento perflatis, maritimis foueis, & vagis. Radix drachmæ vnus pondere pota ex vino, facit species vanas, imaginesq̃ non iniucundas, obuersari. Sed duplicatus hic modus, ad treis vsq̃ dies mētis alienationē affert. Triplicatus interimit. Remedio est aqua mulsa copiosius pota, & vomitione reiecta.

De Dorycnio. CAP. LXXVIII.

Orycnion Crateuas Halycacabon, aut caleā vocat. Frutex oleæ nuper prodeunti, similis. Nascitur in petris non procul a mari, ramis cubito minoribus, folijs oleæ similibus colore, minusculis, firmioribus, præter modum scabris, flore candido, siliquis in cacumine ceu ciceris, densis, rotūdis, quinis intus aut senis seminibus, exigui erui magnitudine, læuibus, firmis, versicoloribus. Radix ad digiti crassitudinem & cubiti lōgitudinē adolescit. Id somniferum esse constat. Copiosius haustum mortem adfert. Nec desuere, qui dicerent, semen in amatoria expeti.

De Mandragora. CAP. LXXIX.

Andragoram aliqui circæum, alij Xeranthos, aliqui antimonion aut antimion, alij Bombochylon, nonnulli minon, n. ij.

DE MEDICINALI MATERIA

Aegyptij Apemum, Pythagoras anthropomorphon, alij Aloe-
ten, alij Thridaciā, alij Cammaron, Zoroastres diamonō, aut Archi-
nen, Magi hemionos, aliqui Gonogeonas, Romani caninū malum,
alij terrestre malum, quidam antimelon, nonnulli dircæam, alij Cir-
cæam vocant, quoniam videatur radix ad amatoria conducere. Duo
eius genera. Niger, quæ fœmina existimatur, Thridacias appellatus,
angustioribus folijs, ac minoribus q̃ lactucæ, graueolentibus, in ter-
ra sparsis. Mala gerit luteis ouorum similia, pallida, odorata, in qui-
bus semen veluti pyrorum. Radicibus inhæret binis, ternisue, inter
se conuolutis, nigris foris, intus albis, carnosiss, ingentibus. Verum
is Mandragoras caule viduus est. Alter candidus, qui mas dicitur,
nonnullis Norion vocitatus. Huius folia, magna, alba, lata, læuia vt
Betæ. Mala q̃ alterius duplo maiora, colore in crocum inclinante,
iucunde cum grauitate quadam olentia. Horum pomorum cibo, ali-
quantum opiliones soporantur. Radix, alterius similis, maior, &
candidior, orbata caule. Succus fit e cortice recentis radiceis tuso, &
prælis subiecto, qui terendo coactus, fistili reconditur. Malis quoq̃
succus depromitur, sed aliquanto ignauior. Delibratur radix, & tra-
iectus lino cortex, ad vsum suspenditur. Aliqui radices in vino ad
tercias coquunt, & defæcatum ius seruant. Cyathosq̃ vno vtuntur,
in peruigilijs, & doloribus, & ante sectiones vstionesq̃, ne sentian-
tur. Succus duobus obolis ex mulso potus, vt Veratrum, per vomit-
iones bilem atram, pituitamq̃ extrahit. Verum potu largiore, vita
adimitur. Medicamentis ocularibus, & his quæ dolores finiunt, pes-
sis quoq̃ emollientibus, ammiscetur. Semioboli pondere inditus,
menses & partus expellit. Subditus pro balano, somnificus est. Ra-
dix ebur emollire fertur, quæ senis horis cum eo decocta sit, & ad ac-
cipiendam quam effingere optaueris formam, ipsum facile præstat.
Folia recentia conuenienter oculorum inflammationibus, & collectio-
nibus, quas vlcera citarunt, cum polenta illinuntur. Duricias ome-
neis, suppurationes, strumas, & tubercula discutiunt. Stigmata si-
ne exulceratione delent, si quinis senisve diebus, sensim perfricentur.
Folia seruantur in murijs, eosdem ad vsus. Trita radix ignibus sa-
cris ex aceto, & serpentium istibus ex melle aut oleo, medetur. Stru-
mas atq̃ tubercula, cum aqua dissipat. Articulorum cruciatus, cum
polenta sedat. Fit citra coctionem vinum e cortice radiceis, ad hunc
modum. Ternæ minæ in vini dulcis metretā, coniunguntur. Datur ex
eo terni cyathi, ijs qui secari aut amburi debent, vt ante dictum est. Si
quidem nullo tunc afficiuntur dolore. Sed veterno quodam pressi,
torpescunt. Mala soporem afferunt olfactu, & etiam si mandantur.

Item expressus ex eis succus. Nimio tamen odore percussi, obmutescunt. Semen malorum potum vulvas purgat, appositumque cum sulphure ignem non experto. Rubra foeminarum profluvia sistit. Scarioficatis multiphariam radicibus, erumpens lachryma, cauo vase recipitur. Est autem lachryma lacteo succo efficacior. Sed non ubique, ut experientia docet, radices lacteum succum de lachrymant. Alium tradunt esse mandragoram, nomine morion, in opacis iuxta specus enatum, folijs albi mandragorae, minoribus, albis, dodrantalibus, in orbem circum radicem. Quae mollis est & candida, paulo maior palmo, pollicemque crassitudine aequat. Tradunt eam in pane, ossa, obsoniove, drachmae pondere deuorata, non memoriam modo, sed usum quoque rationis intercipere. Obdormiscit enim homo, eo fere quo comederit habitu, sensus impos, ternis quaternisve ex quo data est horis. Hac medici vtuntur, cum scindendi, vrendique necessitas adest. Antidotum esse volunt radicem cum manico solano potam.

De Aconito.

CAP.

LXXX.

Conitum aliqui Pardalianches, alij Cammoron, alij Thelyphonon, alij Myostonon, alij Therophonon vocant. Folia habet Cyclamini, aut cucumeris, tria aut quattuor, minora & subhirsuta, caulem palmo altum. Radix scorpionis caudam aemulatur, & alabastrum modo splendet. Torpescunt, ut fama est, scorpiones ad motam radicem, stupentque. Qui rursum hellebori contactu, excitantur. Oculorum medicamentis leuandi doloris gratia adijcitur. Enecat pantheras, feras, lupos & feras omnes, in carnibus obiectum.

De altero Aconito.

LXXXI.

Et alterum aconitum, quod aliqui Cynostonon, alij Lycostonon appellant, alij Cyamon leucon, Romani Colomellum. Huius genera sunt tria. Vinum quo vtuntur venatores, alia duo in usum suum vertere medici. E quibus tertium, quod ponticum nominatur, magna ex parte in Italia montibus iustinis exilit, a priore distans, quoniam folia faciat effigie platani, crebriore diuisura, longiora, & multo nigriora. Caulem filicis, laeuum stylum cubitali altitudine aut ampliorem. Semen in siliquis oblongis recondit. Radices in modum squillae piscis scirrorum nigrescunt. Quibus ad venationem luporum vtuntur. Insertae siquidem crudis carnibus, et deuoratae lupos enecant.

n. iij.

DE MEDICINALI MATERIA

De Cicuta.

CAP. LXXXII.

Oniō aliquibus ægynos, alijs Ethusa, alijs Apolegusa, alijs
 c Dolia, alijs Amaurosis, alijs Paralyfis, nonnullis Aphron,
 Quibusdam Creidion, alijs Coeten, alijs catechomenion,
 alijs Abioton, alijs Abseudes, alijs Ageomoron, alij Timoron, alijs
 Polyanodinos, alijs Dardanis, alijs catapsyxis, Ostani Babathy, Æ
 gyprijs Apemphi, Romanis cicuta appellatur. Caulē ædit genicula-
 tum, vt fœniculi grandem, in cacumine ramofum, folia ferulæ, angustio-
 ra, graui odoratu. Umbellæ in summo prodeunt, flores quoq; albi
 cantes, & semē aniso candidius. Radice non alta, concava. Cicutæ le-
 tale venenum inest, suaq; vi refrigeratoria necat. Remedio est vini
 meraculi potus. Succus exprimitur cōtusis cacuminibus, priusq; semi-
 na & comæ siccescant, qui sole dēsat in pastillos. Præcipuus ad me-
 dendi rationem vsus est aridi. Miscetur collyrijs, quæ leuandi doloris
 gratia temperantur. Ignis sacros, & vlcera quæ serpunt, illitu restin-
 guit. Hæba cum coma trita, & testibus circumlita, libidinum imagi-
 nationes in somno, cōpescit. Sed genitale resoluit. Lac puerperarum
 mammis apposita extinguit. In virginitate mammas coerct, & in-
 crescere non patitur. Pueris præstat vt eorum testiculi cibum non sen-
 tientes, intabescant. Efficacissima vis Creticæ, Megarenfi, mox Atti-
 cæ & in Chio & Cilicia nascenti.

De Taxo.

CAP. LXXXIII.

Milax a Græcis, Taxus a Latinis appellatur. Arbor abietis
 f magnitudine, & foliorum eiusdem figura. In Italia & Nar-
 bonensi Gallia Hispaniæ contermina nascens. Auiculæ quæ
 Italicæ taxi baccas deuorant, denigrantur, & qui ederint easdem homi-
 nes, alui profluuiū corripiuntur. Narbone tam præsentis est veneni,
 vt si qui dormiant sub ea, aut in eius vmbra subsideant, lædantur, & sæ-
 penumero moriantur. Quare de taxo hæc traduntur, vt ab ea cauea-
 mus.

De Apocyno.

CAP. LXXXIIII.

Pocynon aliqui Cynanchon appellant, alij Pardalian-
 a ches, alij Cynomoron, alij Cynocramben, alij Cynodonon,
 alij Phaleon, alij Cynanchen, alij Oligoron, alij Hippo-
 manes, alij Onistia, alij Ophioscorodon, alij Cynaricæ, alij Elapho-
 scorodon, Magi paralyfin, Romani brassicam rusticam aut caninam.
 Frutex est paruis viticulis constans, male olentibus, fractu fere inui-
 dis, folio hederæ, molliore tamen, & per extremum acutiore, viscoso,

gravi odore. Id luteo succo turget. Siliquæ ceu fabarum, digiti longitudine protenduntur, semine intus albo, duro, paruo. Folia cū adipe in panes coacta, canes, lupos, vulpes, & pantheras enecant in cibo data, & protinus eorum coxas resoluunt.

De Nerio seu Rhodendro. CAP. LXXXV.

Erion aliqui Rhododaphnen, alij Rhodendron, alij Spon-
 n gion, alij Hamostarin, Romani Rhododēdron, Lucani Ie-
 manen, Aegyptij Scympham, Pœni Rhododaphnem ap-
 pellauere. Erutex est vulgaris notitiæ, longioribus q̄ amygdala folijs,
 asperioribusq̄, flore in rosam conformato, fructu nuci græcæ simili,
 corniculato qui patefactus quādam flocorum speciem ostendit, Hya-
 cynthi pappos repræsentantem. Radice longa, acuta, lignosa, gu-
 stanti falsa. Nasclitur in amœnis, maritimis, amnibusq̄. Flores & folia
 mulis, asinis & quadrupedum plurimis venena sunt, hominum vero
 contra serpentium morsus præsidia. E vino pota, eo magis ruta addita
 imbecillæ etiam animantes, vt pœcus & capræ, si aquam bibāt in qua
 folia ea maduerint, moriuntur.

De Fungis.

CAP. LXXXVI.

Vngorum differentia duplex. Aut enim manduntur, aut per-
 f niciasales sunt. Multis de causis venenosi gignuntur. Si enim
 clauus ferreus, in quo sit rubigo, aut panni marcor adfuerit.
 Aut si iuxta serpentis cauernam, arbore seu, quæ pariunt noxios fru-
 ctus erumpant. Continent nescio quod strigmentum concretamq̄ pi-
 tuitam, terraq̄ eruti, q̄ celerime computrescunt, atq̄ marcore vi-
 riantur. Sed qui veneno imbuti non sunt, suauem in iuribus gratiam
 habent. Largius tamen sumpti nocent, & ægrius concocti strangu-
 lant, aut choleram morbum citant. Remedio est nitri potus, aut li-
 xiuum cum acida muria, aut feruefactæ saturiæ aut Origanî iuscu-
 lum. Debellatur etiam gallinæ fimi potu ex aceto, aut eiusdem delin-
 tu cum melle multo. Corpus alunt, sed ægre dissoluuntur, cum ma-
 gna ex parte integri ipsi, cum recrementis alui reijciuntur.

De Colchico.

CAP. LXXXVII.

Olchicon aliqui Ephemeron, Romani agrestem Bulbum
 c vocant. Autumni exitu florem ædit croci, candicantē, ab eo
 tempore, folia bulbi, sed pinguiora, caulē palmo altū, ferentē
 rufum semen, radicem foris e nigra rufescentem, quæ delibrata, candi-
 da & mollis spectatur. Lacteo succo madet, atq̄ gustatu dulcis inueni-
 tur. Bulbus mediam habet rimam, fissuramq̄, qua flos erumpit. Pluri-
 n. iiii.

DE MEDICINALI MATERIA

mum in Messenia, & Colchis, nascitur. Ea comesa, fungorum more, strangulando enecat. Hanc autem depinximus, ne a quoq; imprudenter, pro bulbo deuoretur. Miram enim incautis voluptatē affert. Res media sunt eadem quæ fungis. Bubulum etiam lac potum auxiliatur. Itaq; cum adfuerit, non aliud desideratur auxilium.

De Ephemero. CAP. LXXXVIII.

Phemeron aliqui syluestre Irin appellant. Folia habet Liliij, sed tenuiora, caulem parem, florem candidum, amarum, semen molle, radicem vnam, digitali crassitudine, longam, adstringentem, odoratam. Nascitur in syluis & opacis. Huius radix dentibus præcipua, si decocto colluantur. Folia in vino cocta, discutiunt tumores, & tubercula, quæ nihil adhuc humidi contraxerunt.

De Alfinæ. CAP. LXXXIX.

Alfinen aliqui Anthyllion. alij Myortochon, alij Myrtosplenon, Romani Muris auriculam, Pœni Labatholabat, nō nulli myos ota vocāt, quoniam musculorum aures folia imitantur. Lucis opacisq; gaudet, vnde alfine dicta est. Hæc erat eadē quæ Helxine, nisi folijs minor, minusq; hirsuta esset. Cum teritur, odorē cumis reddit. Vim refrigerandi adstringendiq; obtinet. Oculorum inflammationibus cum polenta illinitur. Succus aurium doloribus infunditur. Quin & emendat omnia quæ helxine idest muralis hærbæ.

De palustri Lente. CAP. XC.

Ens palustris quam agriam aliqui, alij Epipteron, Romani Viperalem vacant. Inuenitur in aqua non fluente, muscus lenticulæ similis, refrigeratoriæ naturæ. Propter quod conuenienter collectionibus, igni sacro, & podagris, illinitur per se, & cum polenta. Glutinat & procidentia puerorum interanea.

De semperuino seu Sedo magno. CAP. XCI.

Izoon maius, aliqui Aithales, alij Ambrosion, alij Chrysospermon, alij zoophthalmon, alij Bubophthalmon, alij Stergethron, alij Aeonion, alij Aichryson, alij Olochryson, non nulli Chrysanthemon, alij Protogonon, alij Boron, alij Notion. Magi Paronychiam, alij Chryfitin. Romani ceriam cuspiā, aut iouis caulem nominant, alij Leapetes, alij Sedum maius, Aegyptij Pamphanes. Semperuium ideo nominatur, quoniam perpetuo folia vireant, cuius caules cubiti altitudinem implent, interdum excedunt, pingues, crassitudine pollicari, virētes, Characiæ titimali modo infecti, folia carnosa, longitudine pollicari, in cacumine linguæ similia, alia in terram conuexa, alia in capite stantia inuicem, ita vt ambitu, effigiem imitent.

tur oculi. Nascitur in mōtibz, & testaceis. Supra domicilia etiam se-
ritur. Eius vis refrigerare & adstringere. Medentur igni sacro, nomis,
vlceribus quæ serpunt, oculorum inflammationibus, ambustis igni,
podagris per se, & cum polenta illita folia. Succus capiti, in dolori-
bus cum polenta aut rosaceo perfunditur. Datur in potu contra pha-
langiorum ictus, dysenteriam, aluiq; profluvia. Teretes tineas potus
in vino excutit. Subditus in vellere, mulierum abundantia fislit. Suc-
cus oculorum lippitudinibus, sanguinis vicio conceptis, inungitur.

De minore Semperuino. CAP. XCII.

Izoon paruum, alij Petrophyes appellant, alij Brotion, alij
a Theobrotion, alij Crobyslon, alij Chimerinen, alij Cerau-
niam, Romani Vitalem, alij Semperuium, Aegyptij Erij-
celtam. In petris, parietinis, & maceris, necnon scrobibus opacis
nascitur, caulibus ab vna radice multis, tenuibus, crebro foliatis, exili-
bus folijs, rotundis, pinguibz, mucronatis, caule a medio emicante,
palmum alto, vmbellam hærbidosq; flores & tenues gerente. Folia eise-
dem cum priore, viribus prædita sunt. Semperuium quod tenui con-
stat folio, aliqui aizoon paruum, alij Petrophyes, alij Aizoon sylue-
stre, Romani Semperuium minus, appellant. Tertium videtur semper-
uiui genus, quam aliqui Andrachnen agriam, aut Telephion vocaue-
runt, Romani illecebram, pusillis crassioribusq; folijs, hirsutis, portu-
lacæ proximis. Vis ei excafactoria, acris, exulcerans. Illita cum axun-
gia strumas discutit.

De Veneris vmbilico. CAP. XCIII.

Otyledon aliquibus Cymbalion, alijs Scytalion, alijs Ce-
c pos Aphrodites, alijs terræ vmbilicus, alijs Stæchis, alijs
Stergethron, Latinis vmbilicus veneris dicitur. Folio est in
acetabuli formam tornato, ineuidenter concauo, breui in medio cauli-
culo, in quo semen inest, radice oliuæ modo rotunda. Succus cum vi-
no circumlitus, instillatusve, asperam carnis excrecentiam, constrin-
gentem os vuluæ, reprimat. Inflammationibus, sacris ignibus, strumis,
pernionibus, illitu auxiliatur. Stomachi ardorem refrigerat. Folia cū
radice comesta, calculos frangunt. Vrinam cient. Hydropicis ex melle
dantur. Hærbæ vtuntur ad amatoria.

De altero veneris vmbilico. CAP. XCIIII.

Et alterum genus eiusdem, cymbalion aliqui vocant, pingui-
bus folijs, latioribus, ligularum modo densis, circa radicem
c ambitum oculi describentibus, vt in maiore Semperuiuo, ad-
stringentis gustus, cauliculo tenui, in quo flores & semina hyperici, ra-
dice maiuscula. Facit eadem, quæ semperuium.

DE MEDICINALI MATERIA

De Vrtica. CAP. XCV.

Calyphen aliqui Cniden, alij Adicen, Latini Vrticam, Aegyptij Selephon, Daci Dyn appellant. Acalyphen etiam alteram aliqui Cniphen, Romani Vrticam mollem vocant. Duo eius genera. Sylvestris asperior, latioribus, nigrioribusque folijs, semine lini, sed minore. Altera non aequè aspera, minuto semine. Folia vtriusque illita, canis moribus addito sale medentur. Gangrænas, carcerum nomata, sordida vlcera, & quæ cacoethe vocantur, item luxata, panos, tubercula, parotidas, suppurationesque sanant. Lienosis cum cæratō imponuntur. Faciunt ad profluvia narium cum succo trita, & narium indita. Menses ciunt, eadem recentia detrita cum myrrha, & imposita. Procidentes vulvas, contactu resiliere cogunt. Semen potum ex passō, venerem stimulat. Vuluam aperit. Cum melle delinctum, orthopnoeæ, lateris & pulmonū inflammationibus, prodest. Thoracem expurgat. Erodentibus medicamentis ammiscetur. Cocta cum conchis folia, aluum emolliunt. Urinas mouent. Inflationes discutiunt. Decocta cum ptisana, vitia pectoris extrahunt. Mulierum menses euocant, cum myrrhæ modico pota. Inflammatione turgentem vuam, gargarisatus succus reprimit.

De Galiopfi. CAP. XCVI.

Aliopfis, aut vt alijs Galeobdolon, vel Gallephos, Aegyptijs Aetopi, Latinis Vrtica labeo dicitur. Frutex in totum caulem & folia habet vrticæ, læuiores, & quæ grauem odorem fructu reddant. Florē purpureo, tenui. Nascitur circa sepes, ædificia, ac semitas, vbiq. Folia, caules, semen, succusque, duriciās & carcinomata dissipant. Strumas, panos, & parotidas discutiunt. Oportet bis in die tepidum ex aceto cataplasma imponere, & eius decocto fouere. Ad putrescentia, gangrænas, & nomas, cum sale efficaciter illinuntur.

De Gallio. CAP. XCVII.

Allion siue vt alijs Gallacion, aut Gallerion, nomen ex eo traxit, quod in contrahendo lacte, coaguli vicem impleat. Ramulū foliumque habet aparinæ simillimum, rectū, florē in cacumine luteum, tenuē, odoratum. Flos igni ambustus illinitur. Sanguinis profluvia sistit. Cærato rosaceo Gallion ammiscetur, insolutum vsque dum albescat. Lassitudines reficit. Radix venerem concitat. Nascitur in palustribus.

De Senetione. CAP. XCVIII.

Rigeron a Græcis vocatur, a Latinis hærbulum aut senetio, alias Erechites. Cauliculo est cubitali, subrubro, folijs continuis, diuisura erucæ, sed minoribus multo, luteis floribus

qui celeriter dissecti, vanescunt in pappos. Nomen vero sibi vëdicauit, quoniã flores capillorũ ritu, vere canescunt. Radice superuacua. Nascitur maxime in macerijs, & circũ oppida. Folia cũ floribus refrigerant. Quare illita cum vini modico, vel per sese, testium & sedis inflammationes sanant. Quin & ex manna thuris medentur, cum reliquis vuneribus, tum ijs quæ nerui accœperunt. Illiti cum aceto pappi, idem munus præstant. Verum recentes epoti, strangulant. Totus caulis si coctus in passo potui detur, stomachi dolores a bili contractos, persanant.

De Thaliastro. CAP. XCIX.

t Haliastri folia Coriandri habet, pinguiora paulo, caulem rutæ, in quo folia. Quæ trita, illitu antiqua vlcera ad cicatricem perducunt. Nascitur maxime in campestribus.

De marino Bryo. CAP. C.

m Aarinum Bryon, aliqui Balaryin, alij Iranen vocant. Nascitur in scopulis testaceisq; haud procul a mari, gracile, capillaceum, caulis expers. Præcipua ei spissandi vis, & collectiones cohibendi, & podagras, quas refrigerare opus sit.

De Fuco marino. CAP. CI.

e Fuci marini generibus, quoddam latum, & alterum sublongius, & rubens. Tertium candidum, nascens in Creta, floridum valde, quod nulla corruptionis labe polluitur. Omnia vim habent refrigeratorem, non podagræ modo, sed etiam inflammationibus, in cataplasmatibus efficaciter vtilem. Verũ ijs vti humidis cõuenit, priusq; exarescant. Nicander, puniceum aduersus serpentes dedit. Hoc fucus quidam putant, mulieres suum colorem mentiri. Cum tamen sit radícula eiusdem nominis, qua sese fucant.

De Potamogetone. CAP. CII.

p Otamogeton alias Stachyites, apud Aegyptios Etheuchis, Latine fatalis dicitur, folium betæ simile, hirsutum, paululum supereminens extra aquam. Refrigerat & inspissat. Foliũ pruriginibus vtile. Et contra veterum vlcera nomas. Nomen ex coinditum est, q; palustribus & aquosis enascatur.

De Stratiote. CAP. CIII.

f Stratiotes in aquis nascens, aliquibus fluuiatilis Stratiotes nũcupatur, Aegyptijs Tibus, Magis Aeluri sanguis. Aquis supernatat, & sine radice viuit. Vnde cognomentum traxit. Hæba semper uiuo similis, ni maiora haberet folia. Quæ refrigerant. Sanguinẽ qui defluit a renibus, pota sistũt. Vulnere quæ inflammationem minantur, intumescere non sinunt. Ignibus sacris & tumoribus

DE MEDICINALI MATERIA

ex aceto illinuntur.

De Stratiote Chiliophyllo. CAP. CIII.

Stratiotes Chiliophyllos, exiguus frutex, palmi altitudine, aut amplius assurgit. Folijs auicularum pennas imitantibus, breui admodum dissectoq; foliorum exortu. Folia syluestre cuminum simulant, præsertim breuitate, atq; scabricia, breuiora paulo, densiore umbella, & plenior. Surculos in cacumine gerit exiguos, & capitula in modum aneti, flores paruos, candidos. Nascitur in asperis agris, præcipue circa semitas. Eximij vsus ad vlcera vetera, recentiaq; profluentem sanguinem, & fistulas.

De Verbasco. CAP. CV.

Hlomon Græci, Latini verbasco vocant. Differentiam duplicem habet, nigrum & album, in quo mas & fœmina intelligitur. Fœminæ igitur folia sunt brassicæ, pilosiora multo, & latiora, candida, caulis albus, cubitalis, aut amplior, subhirsutus, flores albi, aut ex luteo pallefcentes, semen nigrum, radix longa, acerba, crassitudine digiti. Nascitur in campestribus. Verbasco qui mas appellatur, oblongius, albis folijs & angustioribus, tenui caule. Sed nigrum prorsus albo simile esset, nisi nigriore latioreq; cõstaret folio. Syluestre folia fert saluix, altas virgas, & lignosas, & circa eas ramulos quales Marrubium, flores luteos, auri æmulos. Sunt & Phlomidæ duæ, hirsutæ, rotundis folijs, humiles. Tertia Lychnitis appellatur, ab alijs autem thryallis, folijs ternis, aut quaternis, vel paulo pluribus, crassis, pinguibusq; apta ad lucernarum lumina. Radix priorum duarum adstringit, quare quod magnitudine ludicrum talum æquet, in alui profluvio, conuenienter ex vino datur. Decodum ruptis, cõuulsis, fractis, antiquæ tussi, auxiliatur. Deterium dolorem collutione mitigat. Verbasco cui flos aureus, capillos tingit. Et quocunq; abijciatur, blattas in se contrahit. Cocta in aqua folia, aduersus tumores, inflammationes oculorum, syderata vlcera, ex vino & melle illinuntur. Cũ aceto quoq; vulneribus medentur. Contra scorpionum ictus, auxilio est. Sylvestris folia ambustis igni, sunt cataplasmata. Aiunt in folijs eius, quam fœminam dicimus, aridos ficus omnino non putrescere.

De Aethiopide. CAP. CVI.

Aethiopis folia habet verbasco similia, perq; hirsuta, densaq; in orbem circa radicem imam redacta, caulem quadrangulum, scabrum, similem apiastro, aut arctio, multis concauum alis, semen erui magnitudine, geminum, in vno conceptaculo, radices numerosas, longas, plenas, glutinosas gustu, quæ siccæ nigrescunt duranturq; vt cornua possint videri. Plurima nascitur in Ida monte Troadis,

LIBER QVARTVS.

103

& in Messenia. Auxiliatur purulentis excreationibus, Ischiadicis, pleuriticis, arteriæ scabricijs, decocta radix & pota. Quin & cum melle, eclegmatis vicem præbet.

De Arctio.

CAP.

CVII.

Ration aliqui potius Arcturon vocant. Similis est verba
a sco folijs, nisi quod hirsutiora & rotundiora sunt, caule longo, molli, semine cumini, paruo, radice tenera, alba, dulciq̃. Decocta cum semine radix in vino, dentium dolorem mulcet, si continetur ore decoctum. Ambusta pernionesq̃ fouentur eodem. Bibitur aduersus coxendicum dolores, & stranguriam e vino.

De Personata.

CAP.

CVIII.

Ration alij Prosopida, alij Prosopion, alij Aparinen, Latini
a Personatam, aut Lappam appellant. Folia habet maiora etiã cucurbitis, & hirsutiora, nigriora, & crassiora, caulẽ albicans, quanq̃ & interdum vidua caule reperiatur, radice intus candida, foris nigra. Hæc drachmæ vnus pondere pota, cum pineis nucibus, purulenta & cruenta extussientibus auxiliatur. Trita dolores in artubus, astrictius vinctis illitu sedat. Folia vtiliter antiquis vlcerebus illinuntur.

De Petasite.

CAP.

CIX.

Petasites pediculus cubito maior, crassitudine pollicis, a quo
p prægrande folium, galeri modo amplum, ceu fungus dependet. Contra phagedænas, & vlcera quæ cacoethe vocant, efficaciter illinitur.

De Episaetide.

CAP.

CX.

Pisaetis ab alijs Helleborine, aut Borion, vocatur. Parua hæ
c ba, fruticosa, exiguis folijs. Iocineris vitijs vtilis, & contra venena pota.

De Capno seu fumaria.

CAP.

CXI.

Apnon, aliqui Corydalion, aut Corion vocat, alij sylvestre
c Coridalion, alij Capnon in hordeis, alij Capniten, alij Marmariten, alij Capnogorgion, alij Chelidonium micron, alij Peristerion, alij Cantharida, alij Chalcocri, Romani Fumariam, Aegyptij Tucin. Fruticosa hærbula est, prætenera, Coriandri similis, folijs candidioribus, vndiq̃ numerosis, cineracei coloris, flore purpureo. Huius succus claritatem facit oculis, delachrymationemq̃. Vnde nomen traxit. Illitus cum gummi, euulsas palpebras renasci prohibet. Cõ manducata hærbula biliolosam vrinam trahit.

DE MEDICINALI MATERIA

De Loto vrbana. CAP. CXII.

Otum vrbana alij Triphyllon, alij Libyon, alij Tripodion, alij Tribolion vocant. Nascitur in hortis. Extractus succus, addito melle, oculorum argema, nubeculas, ceterasq; caligines discutit.

De sylvestri Loto. CAP. CXIII.

sylvestris Lotus, quam aliqui Libyon, alij Triphyllon, Romani Trifolium minus appellant. Plurimum in Libya gignitur, caule cubitali, & sæpe maiore, alis multis, folijs Trifolij pratensis, semine fœnigræci, multo minore, gustu medicato. Vim calfaciendi & leniter adstringendi obtinet. Vitia cutis in facie, maculasq; cum melle peruncta expurgat. Trita per sese, aut cum maluæ semine, in vino aut passo bibitur aptissime, contra dolores, qui vesicam male habent.

De Cytrisso. CAP. CXIII.

c ytrissus, quem aliqui Telinen, alij Lotum magnum, alij Triphyllon, Romani Trifolium maius appellant, Frutex est albus in totum, vt rhamnus, ramos spargens cubito longiores, folia fœnigræci, aut loti trifoliæ, minora, dorso medio prominente. Ea digitis trita erucam olent, gustataq; cicer sapiunt. Folia refrigerant. Tumores inter initia discutunt, si cum pane trita illinantur: Decoctum potu vrinam ciet. Nonnulli quod apes alliciat, prope aluearia ferunt.

De Aegyptia Loto. CAP. CXV.

e St & in Aegypto Lotus, quæ aquis provenit, plana irrigantibus, caule fabæ, flore paruo, candido, Lilio simili, quem tradunt occidere sole comprimi, occludiq; ad ortum autem aperiri. Adduntq; caput ipsum vespere aquis condi, & ad exortum solis emergere. Caput quale papaueris, maximum, & intus grana ceu milij, quæ Aegyptij exiccant, & in panes cogunt. Radicem lotos hæc habet, mali cotonei similitudine, quæ cruda coctaq; mādatur. Decoctaq; lutei oui speciem exhibet.

De Millefolio. CAP. CXVI.

m yriophyllon alij Melophyllō, alij Stratioticen, alij Achillion, Latini Millefolium vocant, aliqui Supercilium veneris, Galli Beliocandas. Caulis est tener, indiuiduus, vnica nixus radice, plurimis folijs, fœniculo similibus. Vnde nomen accepit. Caulis flauescit, prædësus, ac veluti ex industria delimatus. Nascitur in palustribus. Vulnere recentia ab inflammatione vindicat. Si vel viride, vel siccum ex aceto, oblinatur. Præcipitatis cum aqua & sale datur.

LIBER QVARTVS.

104

De Myrrhide. CAP. CXVII.

m yrrhis quam alij Myrrham, alij Conilen vocāt, simillima est
cicutā, caule folijsq. Radix ei oblonga, mollis, rotunda, cibo
non insuavis. Quæ pota in vino, phalāgiorum morfibz au-
xiliatur. Cit menstrua & partus. Subuenit & phthificis cocta in sorbi-
tione. Aut quoq. eadem bis die terve potā ex vino, in pestilētia sa-
lutarem esse, & ne morbi contagia sentiantur, obstare.

De Myagro. CAP. CXVIII.

m yagron aliqui Melampyron vocāt. Hæba est surculacea,
folijs rubiæ, pallidis, tripedanea. Semē oleosum, collo simi-
le. Quod cōtusum igni torrent, perunctisq. virgis ad lucer-
narum lumina vtūtur. Hoc pingui, scabrias corporis læuigari, atq.
expoliri, constat.

De Onagra. CAP. CXIX.

o Nagra siue Onothera, aut Onuris. Frutex est arboris instar,
prægrandis, amygdalino folio, Lilio non dissimili, flore rosa-
ceo, magno, radice candida, pusilla, cum ficcata est vinum olē-
te. Nascitur iu montibus. Aqua in qua radix maduerit, in potu data,
feras mitigat & cicures facit. Illitu quoq. tetra vlcera mulcet.

De Crissio. CAP. CXX.

c Rission aliqui Buglossum magnum vocant, Romani Spinā
mollem. Caulis est tener, duorum cubitorum, triangulo simi-
lis, anguli spinosi, per interualla molles, folia buglossi simi-
lia, maiora, subcandida, modice hirsuta, partibus extremis aculeata,
cacumē caulis orbiculatum, hispidum, in quo capitula purpurea, quæ
soluuntur in lanugines. Radicem huius loco laboranti adalligatam,
dolores varicum sedare Andreas scripsit.

De Astere seu inguinali. CAP. CXXI.

a Ster ab aliquibus Bobonion appellatur, ab alijs Astericos,
alijs Asterion, quibusdā Hyophthalmon, Romanis ingui-
nalis. Dacis Rathibis. Cauliculus lignosus, florem in cacu-
mine habens purpureum, luteumve, & in ambitu diuisum anthemidis
modo capitulum, pusilla in eo circa caulem folia, stellæ modo radiata,
oblonga, hirsuta. Feruenti stomacho, oculorum inflammationibus,
procidua sedi, ac inguinibus illitu auxiliatur. Tradūt purpureum flo-
rem, si ex aqua bibatur, anginis, & pueris comitiale malum sentientia-
bus, opitulari. Inguinum inflammationi recentem illinire conuenit.
Si aridus flos sinistra dolentis manu decerpatur, & inguinibus adlige-
tur, dolore liberat. Stellares huius radij noctu splendent, quapropter
qui ignari antea non viderunt, esse inane simulacrum arbitrantur. Me-

DE MEDICINALI MATERIA

dijs faxis & asperis exit. Inuenitur autem ab opilionibus. Crateuas rhizotomus hæc de ea refert, si viridis cum axungia vetere tūdatur, cōtra rabioforum morsus, turgentia guttura proderit. Suffitu quoq; serpentes fugat.

De Isopyro. CAP. CXXII.

i Sopyron aliqui Phasiolon ob similitudinem vocant, quoniam foliū, quod est aniso simile, in pāpinos torquetur. Capitula sunt in summo caule, tenuia, plena seminis, melanthij gustū imitantis. Contra tussim, & cætera pectoris vitia, semen ex aqua mulsa bibitur. Hepaticis & sanguinem excreantibus vtile.

De Viola purpurea. CAP. CXXIII.

v Iolā purpureā, aliqui Dasy podion, alij Priapeion, alij Ion sylvestre, alij Cybelion, Romani Violam purpureā vocant. Foliū habet hedera minus, tenuius ac nigrius, nec multo dissimile. Cauliculus a radice prodit, in quo flosculus, suauiter olens, purpureus. Opacis & asperis nascitur. Refrigerandi naturam habet. Folia per se & ex polenta illinuntur aptissime, stomacho astuanti, & oculorum inflammationibus, sediq; procidēti. Ait quod purpureū est in flore, anginis & comitialibus auxiliari, maxime pueris, in aqua potum.

De Caucalia. CAP. CXXIII.

c Aucalia quæ leontice vocatur, folia fert magna, alba. E quibus medius caulis emicat, rectus, albus, florem ferens robori aut oleæ similem. Radix in vino madefacta vt tragacantha, delinctu aut māducatu per se tussibus, scabrics arteriæ, medetur. Grana quæ post excussum florem innascūtur, trita & cum cærato illita, faciem erugant, & cutem extendunt.

De Bunio napi genere. CAP. CXXV.

b Vnion aliqui Aton, alij Actinen, alij Anemosphoron vocant. Magi Paradacry, Aegyptij Ersonen, Romani Scopā regiam, Aphri Zigar, nonnulli Thepso. Caulemædit quadrangulum, digiti longitudine, in quo ramuli minutis folijs ac floribus scatent, folia proxime radicem apio similia, lōge tenuiora, coriandrinis proxima, flores aneti, semen odoratū, hyoscyamo minus. Vri nam ciet. Excalcacit. Secundas euocat. Lienis, vesicæ, renibus, vtile. Tā humidi, q̄ sicci, expressiq; succi caulibus folijs radicibusq; vsus inualluit ex aqua mulsa.

De Pseudobunio. CAP. CXXVI.

p Pseudobunion palmi altitudine fruticat, in Creta folia ramuloseq; napi ferens, acri gustu. Tormina, atq; stranguriam, laterumq; dolores, sanant quaterni rami eius poti in aqua. Illici

LIBER QVARTVS

105

quoq; cum sale & vino, tepentes, anginam discutiunt.

De Chamæcisso.

CAP. CXXVII.

Hamæcissos, alio nomine Chamæleuce, alio Cissos acarpos, aut terræ corona, aut Selinitis, Latine hederæ pluuiatica dicitur. Folio est hederæ, tenuiore, longiusculo, ramulis quinis senisve, dodrantalibus, foliosis, flore violæ albæ simili, candidiore, ac tenuiore, gustu supra modum amaro, radice tenui, cādida, inutili. Nascitur in cultis. Bibūt conuenientissime ischiadici folia, tribus obolis in aquæ cyathis tribus, tricenis quadragenisve diebus. Eodē pota modo senis aut septenis diebus regium morbum purgant.

De Chamæleuce.

CAP. CXXVIII.

Hamæleuce lumborū doloribus propicia est, hærba virens, incuruis folijs surculisq; flore rosaceo.

De Buglosso seu lingua bubulæ.

CAP. CXXIX.

Vglossum Magi ælurigonon, Osthanes tranochi, Aegyptij Belor, Romani liguā bubulā, alij libaniū, Pœni Anasanaph vocāt. Nascitur in cāpestribus & vaporosis. Iulio mēse colligitur. A iūt eā quæ treis tyrsos emittit cū semine & radice tritā, potāq; contra tertianos rigores prodesse, quæ quattuor ad quaternos. Ea in vino decoquitur. Hærba abcessibus vtilē esse volūt. Verbasco simile est, folium in terra sparsum, nigrius, asperum, bubulas imitās linguas. Quod in vinum deiectum, animi voluptates auget.

De Cynoglosso.

CAP. CXXX.

Cynoglosson alij Phytton, alij Caballation, alij Splineion, alij Scolymon, Romani Liguā canis, aut caninā appellāt. Folia latifolia plātaginis habet, arctiora, minora, lanuginosa. Caulē vacat, & humi sternitur. Prouenit in sabuletis. Folia cū suillo adipe veteri, medētur morsibus canū, alopecijs, & ambustis. Emollit aluū, decoctum hærba ex vino potum.

De Phyteumate.

CAP. CXXXI.

Hyteuma folia habet radiculæ, copiosum semen, perforatum radicem parua, per summa terræ nitentem. Quā ad amatoria conuenire nonnulli scriptum reliquerunt.

De Leontopodio.

CAP. CXXXII.

Leontopodion aliqui Zoonychon vocāt, alij Actonychon, alij Cemos, alij Damnamene, alij Idiophytō, nonnulli Phytobasilā, alij Crossiō, alij Crossophthoon, Magi Sāguinē Crocodili, alij Crocomeriō, Aegyptij Daphnoenen, Romani Minerciū, alij Palladiū, alij flāmulā. Digitalis est hærba, folia ferēs āgusta, lōgitudine ternū quaternūve digitorū, hirsuta. Quæ iuxta radicē spissiore

o. j.

DE MEDICINALI MATERIA

flocco canescūt. Capitula in summo caule quasi dissecta, flores nigri, semen vsq̃ adeo spissa lanugine inuolutū est, vt sæpe fallat. Radice parua cohæret. Quam tradunt appensam ad amatoria prodesse, & tubercula discutere.

De Hippoglossō. CAP. CXXXIII.

Ippoglosson aliqui & id antirrhinon, alij Anarrhinon, nōnulli lychnida agriā vocāt. Frutex est folia habēs rusci figurā, & spinosam comā, & in sūmo ceu linguas e folijs exeūtes, Capitis dolore corona ex comis imposita minuit, Malagmatis radix succusq̃ ammiscetur.

De Antirrhino. CAP. CXXXIII.

Antirrhinon alij Anarrhinon, nonnulli Lychnida agriā appellāt, hærba caule & folijs anagallidi similē, flore albæ violæ, purpureo. Ideoq̃ syluestris anagallis nominata est, semine vituli nariū. Tradunt perundōs ea, cū cyprino oleo aut lilino, venustiores fieri, nec vllō medicamento lædi posse, si quis appensum gestet.

De Catanance. CAP. CXXXV.

Atanāce aliquib⁹ Dānamete, alijs Dionysias, alijs Thyrsiō, alijs Demos, alijs Cemos, alijs Crotion, Magis Archaras, alijs Arcopus, Romanis hærba filicula, alijs Datisca, Dacis Caropithla, dicitur. Ex eo genere vna, folia coronopi habet lōga, radicē iūci modo prætenuē, capitula sēna, septenave, in quibus erui semen inest. Arescens in terrā flectitur, & se contrahit ad speciem vnguī milui exanimati. Altera mali parue magnitudinē explet, radicē exigua, colore figura & magnitudine oliuæ, folijs mollibus, diuisis, humi prostratis. Semen vt cicer in ramis dependet, multis foraminibus perforatum. Vtrāq̃ narrāt in amatoria expeti. Thessalicæ mulieres his vtri traduntur.

De Tripolio. CAP. CXXXVI.

Ripolion aliqui Psychen, alij Merida, alij Potamogitona, alij Stachyten, Romani Calliū marē nominant. In marinis nascitur locis, quæ allidit vnda, recedēsq̃ dimittit, neq̃ in mari neq̃ in sicco, folio glasti latiore, arido, palmeo caule, in mucrone diuiso. Eius, vt tradunt, flores colorē ter in die mutant. Mane cādidi, meridiē purpurei, sero punicei, cōspiciuntur. Radice alba, odorata, calidi gustus. Quæ drachmis duabus in vino pota, aquā vrināq̃ per aluū extrahit. In medicamenta digeritur, quæ venena arcent.

De Adiāto. CAP. CXXXVII.

Diāton, alij Pollytrichon, alij Callitrichō, alij Trychomanes, alij Hebenotrichon, alij Argion, alij Corion enygron. Aegyptij Epier, Romani Cincinalem, alij terræ capillum, alij Superciliū terræ, Daci Phithophthethela vocant. Pusilla gerit folia, similia coriandri, serrata. Cauliculi quibus exoriuntur, nigro colo-

re nitent, prætenues, palmum alti, folijs filicis, admodum exilibus, rare dice superuacua. Neq; caulē neq; fructū, neq; florē profert. Decoctum hærbae potū prodest, spiradi difficultati, suspiriosis, lieni, & felle suffusis, & vrinae difficili. Calculos frangit. Aluū fistit. Serpentium moribus auxilio est. Contra stomachi fluxiones in vino bibitur. Secundas ciet & menstrua. Sanguinis reiectiones inhibet. Contra serpentium morsus crudū illinitur. Alopecias densat. Strumas discutit, furfures in facie, & manantia capitis vlcera, ex lixiuio emendat. Desluentes capillos cōtinet, cum ladano & myrtino, & susino, aut hyssopo vinoq;. Decoctū eius cum lixiuio & vino infusum, idē præstat. Coturnices & gallinaceos pugnatiores facit, in cibos eorū additū. Seritur gratia utilitatis pecorum. In spelūcis, vmbrosis, & palustribus, circa parietum aspergines, & fontium specus enascitur.

De Fidicula seu Trichomane CAP. CXXXVIII.

Trichomanes aliqui Pterion, alij Opteron, Romani Capil-
 larem, alij Pinulam, alij Fidiculam, nonnulli & eā adianton
 appellāt. Nascitur eisdem in locis quibus adianton, filici si-
 mile, sed exilius, folijs lenticulae, tenuibus, in ordinem vtrinque digestis,
 aduersis inse, ramulis acerbis, fusco colore splendentibus. Eadem quæ
 & adianton præstare posse constat.

De Xanthio & lapa. CAP. CXXXIX.

Anthion aliqui Phasganon, alij Antithesion, alij Chasca-
 non, alij Choeradolethron, alij & hanc Aparinā nomināt.
 Latini Lapam. Nascitur læto & pinguī solo, & lacubus exic-
 catis, caule cubitali, anguloso, pingui, prodeuntibus ex eo crebris alis.
 Folia atriplicis habet insecta, nasturtium odore imitātia, fructum grā-
 dis oliuæ modo rotundum, & vt platani pilula spinosum, qui conta-
 ctu vestibus adhærescit. Is ante collectus q̄ perfecte siccescat, tunditur,
 & fictili vase reconditur. Flauos autē facit capillos, si acetabuli instar
 repida aqua madescat, mox caput nitro ante perfritum illinatur. Alij
 in vino tundūt, & ita asseruant. Semen aptissime tumoribus imponi-
 tur.

De Auenæ.

CAP.

CXL.

Egilops aliquibus sitospelos, alijs Siphō, alijs Bromos, Ro-
 manis Auenæ dicitur. Hærbula folia tritici habens, sed mol-
 liora, in summo capite semina bina ternave, rubra, quibus ari-
 stæ quasi capillaceæ, exeūt. Illita cum farina hærbæ ægilopijs mede-
 tur. Duricias discutit. Succus farinæ ammixtus, siccatur & eorūdem
 gratia reponitur. De Bromo Auenæ genere. CAP. CXLI.

Romos hærbæ quam aliqui Siphonion, alij Acrospelon vo-
 cant, Auenæ similis est, exiccatoriam vim habens. Deco-

o .ij.

DE MEDICINALI MATERIA

quitur cum sua radice in aqua ad tertias, & iuri colato par modus mellis adijcitur, rursus incoquitur, dum liquidi mellis crassitudo fiat. Linteum eo humore imbutum, & naribus inditū, contra graueolentiam vlcera efficacis est. Aliqui tritam aloen addunt, & eo modo vtitur. Cum ficcis rosis cocta in vino, grauem oris halitum emendat.

De Glauce. CAP. CXLII.

g Laux cytiso & lēticulæ folijs similis, quæ superne virēt, auersæq; candidiora spectantur. Ramuli a terra exiliunt quini senive, tenues, ab radice dodrātem alti. Flores ceu violæ albæ purpurei exeunt. Nascitur iuxta mare. Coquitur cū hordeacea farina, sale & oleo in sorbitione, ad reuocandam extincti lactis vbertatem.

De Polygala. CAP. CXLIII.

p Olygala palmi altitudinē petit. Folijs lēticulæ, gustu adstricto, quæ pota lactis abundantiam facit.

De Olyri. CAP. CXLIII.

o Syris frutex est niger, lentus, ramulos ferens tenues, & in his folia quaterna, quina senave, ceu lini, nigra in initio, dein colore mutato rubescunt. Decoctū eius potū iuuat arquatos.

De aspera Smilace. CAP. CXLV.

f Milax aspera ab alijs Epatitis, alijs Lycanthenon, alijs Cynobaton, alijs Anicetō, alijs Heliophytō, alijs Anatolicō, alijs Dyticō alijs Helide, Aegyptijs Lyiste, Romanis mergina, Hetruscis Radia appellatur. Folia habet periclymeni, sarmēta tenuia, multa, rubi modo aut paliuri aculeata. Arbores scādīt, se conuolūēs eis. Fert racemos exiles, qui maturi rubescunt, gustūq; leniter mordēt. Nascitur in palustribus & asperis, radice dura crassaq;. Folia & acini & ante & post epoti, venenorū antidota sunt. Tradūt si infantibus nuper in lucē æditis, quid ex his tritū propinetur, nulla post modū venena nocitura.

De læui Smilace. CAP. CXLVI.

l Aeuī Smilacis folia hederæ similitudinem habēt, molliora, læuīora, tenuiora. Huius sarmenta nullis horrent spinis. Cōuoluitur arboribus vt prior. Fructum parit, lupini modo nigrum, exiguum, floribus in cacumine perpetuis, multis, rotundis. Hac smilace quadam topiariorū arte, tentoria contra æstus molestiā factātur. Folia per autumnū decidua. Semine cū doricinio potō, ternis singulorum obolis varia & tumultuosa in somnis obuersari traduntur.

De Rusco. CAP. CXLVII.

f yluēstris myrtus aliquibus, Græcis Myrtacanta, alijs Hieromyrton, alijs Oxymyrline, alijs Myacantha, alijs Agonō, alijs Scincos, alij Mintha, alijs Catāgelos, alijs Anange

los, alijs Acerō, alijs Ocneron, alijs Cnicē, alijs Lychene, alijs Chamæpitys, alijs Chamæmyrte. Beotis Gyrenia, Magis Herculis genitura, Latinis Ruscū appellatur. Foliū fert myrti, latius, in formā lācæ mucronatum. Baccæ per maturitatē rubescunt, rotundæ, a medio folio dependentes, osseo intus nucleo. Cubitales ramuli ab radice exeunt, vtiliū modo lenti, fractu contumaces, foliosi. Radice graminis simili, acerba, & subamara. Folia & baccæ in vino potæ vrinā cient. Menses pellunt. Vesicæ calculos frangunt. Stillicidio vrinæ medentur. Dolores capitis sanant, & regium morbum. In asperis & præcipitibus locis nascitur. Decoctum radicis in vino potū, eisdē præbet effectus. Cauliculi recētes asparagorum vice, in cibo sumuntur. Amari autem sunt, sed vrinam mouent.

De Lauro Alexandrina. CAP. CXLVIII.

Aurus Alexandrina quam aliqui Idæam, alij Danaen, alij Hippoglotton, alij Zaliā, alij Stephanen, alij Daphnon, alij Samothracicen, alij Methrion, alij Hippoglossion vocant. Folio est maiore q̄ rusci, molliore, & candidiore, semine inter folia rubro, ciceris magnitudine. Ramos spargit in terra, dodrantes, interdum longiores. Radice sylvestri myrto simili, molliore, odorata. Inuenitur in montosis. Difficiles partus accelerat, radice pota sex drachmarum pondere in vino dulci. Et stillicidio vrinæ auxiliatur. Sed sanguinem extrahit.

De Daphnoide. CAP. CXLIX.

Aphnoides alypo simile, flos vt Nymphææ, cuius mediū nuci cypressi nō dissimile, in quo semē. Aliqui chamædaphnen, alij Peplion, alij Eupetalon vocant. Cubiti altitudine fruticat, ramis flexilibus, multis inde sursum versus foliosis. Cortex supra modum viscosus ramos vestit. Folia lauri, graciliora, & molliora, fractu contumacia, quorum gustatu os & fauces incenduntur. Flores candidi, bacca cū ematuruit, magna, radix inutilis. Nascitur in montosis. Pituitas extrahit foliū recens vel aridū in potu. Menses ciet & vomitus. Caput inanit cōmanducatū. Sternutamēta mouet. Baccæ quindécim potæ aluū resoluūt. De Camædaphne. CAP. CL.

Hamædaphnen aliqui & hanc Alexandrinam appellarunt, alij Daphniten, alij Hydragogon, Romani Laureolā, alij lātaginē, Galli Vsubim. Virgas emittit cubitales singulari ramulo cōstātes, rectas, tenues, læues, folia lauri similitudine, læuora multo, ac viridiora, semen rotundū, rubens, annexū folijs. Illinūtur capitis doloribus trita folia. Stomachi ardores mulcent. Ad sedanda tormina cum vino bibuntur. Potus cū vino succus mēses & vrinā ciet. Idem
o .iij.

DE MEDICINALI MATERIA

facit pello appositus.

De albo Veratro. CAP. CLI.

h Elleborū albū aliqui *Ascida* vocāt, alij *Atomon*, alij *Pignatoxarin*, Magi sanguinē *herculis*, alij *Polyidos*, alij *Anaphyston*, *Aegyptij* *Somphiam*, alij *Oure*, Latini *Veratrū* albū, Galli *Laginū*, aliqui *Anepsa*. Fert folia plātaginis aut betæ sylvestris similia, sed breuiora, & nigriora, rubefcentia, caulem cauū, quadrantalem, tunicis conuolutum cum arescere cœpit. Radicibus nititur multis, tenuibus, ab oblongo capite exeuntibus, cæparum modo fibratis. Nascitur in montibus & asperis. Radices messibus colligendæ. Optimum habetur cādīdū, friabile, carnosum, modice extensū, nec tamē iunci modo mucronatū, quod frangēdo puluerē emittit; & tenuem habet medullā, gustu nō admodū feruēs, neq; saluā subinde ciens. Huiusce modi autē strāgulat. Primatū cyrenaicū tenet. Galaticū autē & *Capadocicū*, candidiora, & puluere quodā oblita, celerius strangulatus mouent. Vomitione autē varios extrahit humores. Collyrijs ammiscetur, quæ caliginem oculorū discutiunt. Partus impositū necat. Menses pellit. Sternutamenta excitat. Mures interficit, cū melle & polenta subactū. Absumit carnes si coquatur vna. Datur per se ieiunis, & cū sesama, aut ptisanæ succo, aut halicæ aut lentis cremore, cum aqua multa aut pulte, aut quauis alia sorbitione. Cogitur cū pane, & ita inassatur. Præparatio corporū, ac victus ratio, diligenter tradita est, cum ab his qui de medica eius potione scriptitarunt, tū maxime a *Philonide* siculo ennesi, cui nunc assentimur. Quippe longū nimis esset in hac præsertim æditione de materia, simul medicam viuendi rationē exponere. Dant nonnulli in pulte aut halicæ sorbitione, aut paucū antea cibum dari præcipientes, statim veratrum offerunt, ijs præsertim, quibus nulla strangulationis suspicio imminet, si nulla valetudo corpus infirmat. Siquidem dum hæc ita contingunt, deiectio nihil periculi minatur, quod nō intempestiue medicamentum corporibus offeratur. Vomitiones concitant subditæ ex eo balani, cum aceto.

De Veratro nigro. CAP. CLII.

h Elleborum nigrū, aliqui *Nelampodion* vocant, alij *Ecstomon*, alij *Polyrrhyson*, alij *Protion*, alij *Melanorrhizon*, alij *Cyranion*, Magi *Zomarition*, *Aegyptij* *Isæam*, alij *Elaphine*, alij *Cemeleg*, Latini *Veratrum nigrum*, alij *Saraca*, *Daci* prodiorna. Appellatur *Melampodion*, quoniam caprarū pastor nomine *Melampus*, furens in se *Proeti* filias, primus purgasse, & sanasse fertur. Folia ei viridia, platani similia, minora, folijs *sphōdylij* proxima, subaspera, pluribus diuisuris incisa, caulis asper, flores purpurei race-

matim cohærentes, semen cnici, quod in Anticyra sesamoides vocât. Quo deiectiones molliuntur. Radicibus cohæret nigris, tenuibus, a capitulo cæpæ simili confibratis. Quarum est vsus. In collibus, asperis, & sitientibus locis enascitur. Optimum est quod ex quibusdam petitur terris, vt ex Anticyra. Nigrum inibi probatissimum gignitur. Eligi debet corpulentum & plenum, in quo tenuis sit medulla, acre gustu, feruensq;. Cuiusmodi est Elicone, Parnaso, & Aetolia natum. Attamen Eliconium præcellit. Veratrum nigrum purgat ventrem. Detrahit bilē pituitasq;, datum per se aut cū scamonia, & tribus obolis siue drachma salis. Decoquitur cum lente & iusculis, quæ purgationis causa sumptantur. Prodest morbis comitialibus, melancholicis, infantiæ, articularijs doloribus, & resolutis. Menses inditum trahit. Partus necat. Purgat fistulas impositum, & tertio die detractum. Item contra grauitatem auditus in aurem demittitur, ibiq; in alterum aut etiam tertium diem esse finitur. Scabiem sanat, illitum cum thure, aut cæra & pice & cedrino oleo. Vitiliginibus, lepris, impetiginibus ex aceto medetur. Dentium dolorem collutione mitigat. Erodentibus medicamentis commiscetur. Hydropicorum ventri vtilissime imponitur, factum ex eo, farina hordeacea, & vino, cataplasma. Cōstitum proxime radices vitium, vinum purgandi facultate donat. Huius resparsu domos expiari arbitrantur. Quare inter fodiendum stantes, Apollinem Esculapiūq; precantur, ac vitant aquilæ volatus. Aduolare enim non sine periculo tradunt. Namq; si auis effossionē hellebori conspexerit, moriturū qui succidit augurium est. Celeriter effodiatur oportet. Quoniā odore caput aggrauat. Quapropter ad id arcēdū fossuri, allium præsumere, & vinum bibere consueuerūt. Nulli ita noxæ opportuni redduntur. Veratri albi modo emedulatur.

De Sesamoide magno. CAP. CLIII.

Sesamoides magnum, aliqui Sesamiten, alij Sesamin, alij Lycocytalion, alij Anticyricon appellant, quoniam in anticyra albo veratro in purgationibus misceatur. Simile est senecioni aut rutæ, longo folio, flore candido, radice gracili, ignaua, gustu amaro, cætera sesamæ simile. Ventrem purgat. Datur tritum ad bilis pituitæq; deiectiones, quantum tribus digitis capitur, addito veratri albi sesquiobolo ex aqua mulsa.

De Sesamoide paruo. CAP. CLIIII.

Sesamoides paruum, aliqui Coronion, alij Sesamon sylvestre vocant. Cauliculi ei sunt dodrātales, folia coronopi, minora, hirsutiora, & in cauliculorū cacumine capitula florū pene purpureorū, medio eorū albo, semē sesamæ, fuluū, amarū, radix tenuis. De

o .iiij.

DE MEDICINALI MATERIA

trahit bilē pituitasq; semen ex aqua mulsā potum dimidio acetabulo. Illitum ex aqua tumores ac tubercula discutit. Nascitur in asperis.

De sylvestri Cucumere. CAP. CLV.

ylvestrem Cucumin, aliqui Elaterion vocant, alij Grynion, alij Balin, alij Syncrisin, alij Bubaliō, alij Scopion, alij Phe rombron, alij Peucedanon, alij Notion, Romani Ancetum, alij Agrestē, Pœni Cusmēzar. Fructu solo distat a satiūo cucumere, longe minorem pariens fructum, oblongis glandibus non dissimilē. Folia atq; sarmenta satiui refert, radice cādida, magna. Nascitur in sabuletis, & prope domicilia, frutice in totum amaro. Instillatus foliorum succus, aurium dolori conuenit. Illita ex polenta radix, veterem tumorem discutit. Imposita cū refina terebinthina, tubercula rumpit. Ischiadicis infunditur. Podagras discutit, decocta ex aceto & illita. Eius decocto dētes in dolore colluuntur. Aridæ farina impetiginem, lepras & vitilignes absterget. Nigris cicatricibus colorem reddit. Et in facie maculas expurgat. Radicis succus sesquiboli pondere, & itē cortex acetabuli quarta parte, bilem pituitamq; deiiciunt, præsertim in hydropicis. Deiectiones autē citra stomachi iniuriam mouet. Radicis selibra, præsertim in vini Libyci hemina conteritur, danturq; ex eo terni cyathi triduo, dum tumor abunde deprimi cernatur.

De Elaterio. CAP. CLVI.

Fructu huiusce Cucumeris, sit medicamentum quod Elateriū vocatur, ad hūc modū. Decerpti cucumeres qui tacti protinus exiliūt, seruantur nocte vna. Postridie imposito supra craterē rariore cribro, vtriusq; manibus præhensi, sigillatim supino culatro sursum versus aciem habente finduntur, atq; per cribrum humor in subiectū vas exprimitur. Simulq; carnosum quod hæsit cribro, quo facilius excidat eliditur, quod ita pressum est, residere finitur, atq; in vicinam peluim demittitur. Coaceruata autem in cribro segmina, dulci aqua perfunduntur, & denuo pressa abijciuntur. Humor in pelui agitur, & linteo opertus, soli exponitur. Dumq; steterit, tota supernatans aqua cum humore concreto, effunditur. Hoc vero identidem fieri solet, donec existēs aqua lique scat, qua stillatim exhausta sedimentū mortario suscipitur, & conterendo cogitur in pastillos. Sunt qui ad hauriendam protinus succi abundantiam, cribratos cineres humi inspargant, & medium cauantes, triplicatum linteū obtēdant, per quod Elaterium cum sua humiditate diffundunt, siccatumq; in pila vt dictū est, conterunt. Aliqui pro dulci aqua marinā perfundentes, ita eluunt. Alij in nouissima lotionē, mulsam aquam respergunt. Elaterium optimum esse constat, læue, non ponderosum, cum candore leniter hu-

medum, gustu amarissimum, quodq; lucernarumq; luminibus obie-
ctum, facile flagret. Porraceum tamen scabrumq; si turbidum specta-
tur, atq; erui cinerisq; plenum sit, graue & vitiosum esse solet. Nec de-
sunt qui cucumis succo amyli immisceant, vt candorem ipsum & læ-
uitatem imitetur. A bimatu ad decennium deiectionibus vtile est. In-
teger modus obolus est, minimus semiobolus, pueris chalci duo. Si
quidem copiosius, periculum adfert. Bilem ac pituitam alterutra para-
te extrahit. Optima suspensio est purgatio. Quod si in animo sit deie-
ctionem moliri, adiecto salis duplo, & stibij quod colorare sufficiat, ex
aqua erui magnitudine catapotia dato, postea cyathus vnus aquæ tes-
pidæ sorbeat. Ad citandas tamen vomitiones aqua diluens elateri-
um, subiectas linguæ partes penitissime pinna oblinito. Quod si quisq;
difficilius euomat, oleo aut vnguento irino resoluit. Somnum inhi-
beto. Porro his qui eximie vacuantur, continue vinum & oleum dari
conuenit. Etenim vomendo restituntur. Quod si vomitiones non fi-
niantur, aqua frigida, polenta, posca, poma, & quæ stomachum den-
sando corroborant, offerenda sunt. Ciet Elaterium menses. Partus ene-
cat in pello subditum. Morbo regio medetur, cum lacte naribus infu-
sum. Diurnis capitis doloribus liberat. Efficax anginarum vnguen-
tum est, cum vetere oleo, melle, aut felle taurino.

De Satiuo Cucumere. CAP. CLVII.

f Atiui Cucumeris trita radix, & drachmæ vnus pondere po-
ta in hydromelite, vomitus ciet. Si quis facile secundum coe-
nam vomere velit, binis obolis sit contentus.

De Staphideagia. CAP. CLVIII.

f Taphida agriam, alij Triphyllon, alij Stefion, alij Astaphi-
da, alij Phthiroctonon, alij Phthirion, alij Apanthropon,
alij Polyides, alij Pseudopathes, alij Arsenoten, Aegyptij
Ibesæden, Romani hærbā pediculariā vocāt. Folia habet labruscæ,
diuisa, & cauliculos rectos, molles, nigrosq;. Fert florem glasti, & folli-
culos virides, similes ciceri, & in his nucleum triangulum, scabrum, ex
nigro subfuluescētem, intus album, gustu acrem. Grana quina denave,
si trita in aqua mulla dentur, crassum humorem per vomitum purgāt.
Sed qui hauserunt, ambulare debent. Prudenter tamen attendere opor-
tet, & aquam mullam potui dare. Quoniam pericula strangulationis
inferunt, & fauces adurunt. Trita & ex oleo illita, phthiriasi prodest.
Itē prurigini & psoris. Cit plurimam pituitam commanducata. De-
cocta in aceto, dentium dolori colluto ore subuenit. Rheumatismum
gingiuarum sistit. Vlcera oris manantia, cum melle sanat. Vrentibus
malagmatis imponitur.

DE MEDICINALI MATERIA

De Thapsia.

CAP.

CLIX.

Hapsia aliqui Hypopion vocant, alij Pancranon, alij Scamonion, alij Thelyterin, Romani ferulaginem, alij Ferulam syluestre, Poeni Bæden. Nomē ideo accēpit, quod in thapso eiusdem nominis insula, primum inuenta sit. Tota vero natura ferulæ similis est, graciliore caule, folijs fœniculi, vmbella aneti in cacumine a singulis furculis erumpente, flore luteo. Semen quale ferulæ, latum, sed aliquanto minus, radix nigra, intus candida, longa, acris, crassiore libro vestita. Lactis extrahendi ratio hæc est. Facto in ambitu scrobe, cortices inciduntur aut radix in fornicis speciem excauata, cooperitur quo merus succus confluat. Oportet illuc sequenti die se conferre, & cōgestum succum extrahere. Tunditur etiam radix in pila, & succus organo per quallum expressus, fidi crasso insolatur. Aliqui folium vna terunt. Sed inualidior huiusmodi succus. Hoc autē interest. Quoniā qui ab radice manauit grauius olet, & humidus permanet. E folijs autē extractus exiccatur, atq; teredinum iniuriā sentit. Qui succum colligit stare debet non obuersus vento cū dies apricus est & a flatu filet. Quoniā ob vaporis acrimoniam facies vehemēter intumescit, nudaq; corpora inuadunt pustulæ. Ob id prius liquido carato & ad stringente, nudas partes illinunt, & ita muniti accedūt. Tam cortex radices q̄ succus, purgādi vim habent. Lacteus succus in aqua mulsa potus, vtrinq; bilem extrahit. Radicis modus quaterni oboli, cum tribus seminibus aneti drachmis, succi terni oboli, lactis obolus vnus. Quod eo amplius assumitur, periculosum est. Huiusmodi purgatio conuenit, suspiciosus & diuturnis laterum doloribus, reiectionibusq;. Datur in cibis aut obsonio, quibus difficile sit vomere. Tam radix q̄ succus omnium maxime quæ pares cum eis vires adeptæ sunt, vim habent transconcretiua, vbi ex imo aliquid euocandum est, aut meatuum laxitas alio transferenda est. Vnde succus illitione, & radix recens affricu, alopecias explēt. Radix succusq; cum æquis caræ thurisq; portionibus, suggillata liuoresq; tollunt. Sed nō plus binis horis dimittantur. Locus deinde aqua maris calida foueatur. Vitia cutis in facie emendat, cum melle illitus. Lepras tollit. Tubercula discutit, perunctus cum sulphure. Succus in diuturnis pulmonum, laterum, pedum, articulorumq; valetudinibus vtiliter illinitur. Valet ad integendam colic glandem, ijs qui natura nō circūcisione curti sunt. Tumore enim excitat, qui pinguiū fotu emoluitus, in penicillaturam refarcit.

De Spartio.

CAP.

CLX.

Partion aliqui Lygon, alij Lobon appellant. Frutex est longas ferēs virgas, sine folijs, firmas, fractu contumaces, quibus

vites vinciuntur, semen lenticulæ in folliculis phasolorum modo nascens, florem vt albæ violæ, luteū. Purgant per superna hellebori vice, citra periculum flores & semina, quinis obolis in aqua mulsa pota. Semen deiectionem mouet. Ramis in aqua maceratis mox tufis extractus succus, ischiadicis & angina laborantibus auxiliatur, si cyathi modum ieiuni bibat. Quidam marina aqua macerare malunt, & infundeat ischiadicis clystere. Strigmenta autē elicit cruenta.

De Silybo.

CAP.

CLXI.

Ilybum lata spina est, folia ferēs Chamæleonis albi. Hæc recens cū sale oleoq; cocta estur. Radicis succus drachmæ pōdere potus vomitiones ciet.

De Vomitorio bulbo.

CAP.

CLXII.

Vlbus, quem vomitorium vocant, folia habet lētiora & multo longiora cibario bulbo, radicem consimilem cortice nigro vestitam. Vomitiones concitat, si per se comedatur, aut eius decoctum ebibatur.

De vnguentaria Glande.

CAP.

CLXIII.

Lans vnguētaria, fructus est arboris myricæ similis, magnitudine auellanæ nucis, cuius nucleus græcarum nukum more tritus, humorem reddit, quo ad preciosa vnguenta pro oleo vtuntur. Nascitur in Aethiopia, Aegypto, Arabia & Petra oppido Iudææ. Præfertur plena, recens, candida, quæ facile delibretur. Ea drachmæ pōdere pota lienē absumit. Cū erui farina & aqua mulsa podagricis illinitur. Pforas leprasq; decocta in aceto, vitiliginēs & nigras cicatrices cum nitro emendat. Et cum lotio lentiginēs, varos & papulas in facie, & cutis vitia tollit. Vomitiones mouet. Aluum cū hydromelite resoluit. Stomacho aduersatur. Oleum quod ea exprimitur, aluum potu ciet. Cortex eius magis adstringit. Verum tusa & expressæ cremētum abstergentibus medicamentis adiicitur, quæ aduersus pruriginēs, & scabrias, idonea sunt.

De Narcisso.

CAP.

CLXIII.

Arcissum, aliqui Narcisson Anydron, alij Autogenes, alij Bulbon emeticon, alij Lirion, Romani Bulbum morbitariū Sūt et qui vt Lilium, lirium appellarint. Folia porro similia, tenuia, multo minora, & angustiora, caulis vacuus & sine folijs supra dodrantem attollitur. Flos albus in medio, intus croceus, in quibusdā purpureus, radix intus alba, rotunda, bulbosa, semen velut in tunica, nigrum, longum. Probatissimum nascitur in montibus, suauī odore. Cætera porrum imitatur, atq; hærbaceum virus olet. Radix cocta siue estur siue bibitur, vomitoria est. Ambustis igni prodest cū exiguo

DE MEDICINALI MATERIA

melle trita. Præcisos nervos illitu glutinat. Luxatis maleolis diuturnisq; articulorum doloribus, trita ex melle & imposta subuenit. Vitia cutis in facie, vitiliginisq; cum semine vrticæ & aceto emaculat. Cum eruo & melle vlcerum sordes expurgat. Abscessus rumpit concoctioni repugnantes. Infixa corpori extrahit, illita cum lolij farina & melle.

De Hippophaea. CAP. CLXV.

hippophæes, alij Hippophyes, alij Hippophanes, alij Hippion, alij Echinion, alij Pelecinon, Romani Lapaginē vocant, quo fulones vestes interpolant. In sabulosis maritimisq; nascitur, surculaceo frutice, dēso & largo, folijs oleæ, lōgioribus mollioribusq;, inter quæ candicantes spinæ emicāt, siccæ, angulosæ, interstretio quodam distantes. Flores hederæ corymbis similes, racematim coherent, minusculi tamen, & molles, cādidi, ex parte rubescētes. Radix lacteo succo madet, crassa, mollis, amara gustāti, ex qua perinde ac thapsia succus eximitur, qui cum erui farina subactus siccatur, & ad vsum reconditur. Pituitas bilemque detrahit oboli pondere cū mulso & quatuor obolis erui farinæ. Frutex cum radicibus ficcatus tunditur, & cū aquæ mulsæ dimidia hemina tritus datur. Radice liquamentum depromitur, vti in thapsia. Huius in purgationibus modus est drachma.

De Hippophæsto. CAP. CLXVI.

hippophæston id quod aliqui Hippophaes appellant, nascitur eisdem locis quibus hippophaes, estq; spinæ fulloniæ genus, humilis hærba, sine cauliculo, sine flore, inanibus tantum capitulis, folijs parvis, spinosis, radículas habens albas, molles, crassas. Succus radice & folijs exprimitur, & exiccatur. Datus cui voles tribus obolis in aqua mulsæ, aquā pituitasq; detrahit. Priuatim comitialibus morbis, nervorum vitijs, & orthopnoeæ convenit huiusce modi purgatio.

De Ricino. CAP. CLXVII.

Ici aut Croton, aliqui Sefamon sylvestre vocant, alij Sefeli Cypriion, alij Crotona. Aegyptij Siftamna, aliqui Trixin, Magi Sanguinem febris, Latini Ricinum, alij Lupam. Id nomen accēpit, a ricini animalis similitudine. Arbor provenit parvæ fuscus altitudine, folio platani, maiore, læuiore & nigriore, ramis caudicibusq; cauis in arundinis morem. Semine in vvis asperis, quod corticibus exutum, Ricinum animal representat, ex quo oleum nomine cicinum exprimitur, cibis scdum, lucernis emplastrisq; vtile. Grana triginta numero purgata, potu pituitas bilem aquamq; per aluum extrahūt. Vomitiones mouēt. Sed iniucunda admodum est, & molesta purgatio.

tio. Siquidem stomachum vehementer subuertit. Tusa & imposita, vitia cutis in facie, varosq; expurgat. Folia cum polenta trita inflammationes oculorum tumoresq; leniunt. Turgentes mammas cohibent. Eadem ex aceto illita, ignes sacros restingunt.

De Tithymalorum generibus. CAP. CLXVIII.

Tithymali genera septē, quorum masculus characias appellatur, ab aliquibus cometes, aut amygdaloides, vel cobios. Alter Myrthites qui fœmina existimatur, eumq; Myrsinitē aut Caryitē vocant. Tertius paralius, quē Tithymalida appellarūt. Alius Helioscopius. Quintus Cyparyssias. Sextus Dendrodes. Septimus Platyphyllos dicitur.

De Characia appellato. CAP. CLXIX.

Haracia caules supra cubiti altitudinem attolluntur, rubri. Lacteo succo atq; acri madent. Folijs oleæ circum ramos, angustioribus & longioribus, radice dura, lignosa. Pender in cacuminibus caulium coma iunci, & calyculati folliculi, aliquantum caui. In quibus semen continetur. Nascitur in asperis & montibus. Succus aluū purgat. Trahit pituitam bilemq; binis obolis in posca sumptis. Et cum aqua mulsa vomitiones mouet. Appetente vindemiariū tempore, succus congestis ramulis, mox decisis, & vase reclusis, excipitur. Aliqui adiiciunt farinam erui & in pastillos digerunt, qui erui magnitudinem impleant. Alij in aridas ficos ternas quaternasve guttas instillant, vt cum his inarescant. Quas ad vsus recidunt. Perse etiam tufus in pila, & in pastillos coactus reponitur. Porro cū extrahitur lac neq; quo ventus aspiret, stare quemq; neq; manus oculis ad mouere cōuenit, sed ate eius collectionem, corpus, præsertim faciem, collum scrotumq; genitalis, adipe aut oleo cū vino perungere. Fauces autē exasperat. Quapropter catapotia cæra aut decocto melle, oblini par est, & hoc modo dari. Binas tamen ternasve ficos, purgationis gratia sumpsisse, satis est. Recens lac ex oleo, perustus in sole capillos euellit. Renascentesq; flauos & exiles efficit. Deniq; omnes destruit. Dentium cauernis inclusum, leuat dolores. Sed cæra dentes oblinendi, ne suo delapsu, fauces & linguam vitiet. Tollit illitu impetigines, formicantes verrucas, penfiles, & quæ thymi florem repræsentāt. Valet aduersus prexygia, carbūculos, phagedænas vlcerum, gangrænas, fistulasq;. Legitur semē autumno, et siccatum sole leuiter tunditur, serueturq; loco mundo reponitur. Folia item siccantur. Semen et folia lactei succi effectum præbent, dimidio acetabulo pota. Sunt qui condiant admisto cum lacte lepidio, & caseo contuso. Radix drachmæ pōdere in hydro melite pota, per inferna trahit. Decocta cum aceto, dentium dolori au-

DE MEDICINALI MATERIA

xiliatur, colluto ore.

De Fœmina. CAP. CLXX.

f Oemina quam Myrsinitem, aut Caryiten vocarunt, similis
suapte natura Daphnoidi. Folijs myrti, sed maioribus, in ca-
cumine acutis, & pungētibus. Ramulos ab radice mittit do-
drantales. Fructum fert post annum nuci similem, mordaci gustu. Na-
scitur in asperis. Succus, radix, semen, folia, confimilem antedicto for-
tiuntur facultatem. Sed ad citandas vomitiones inualidior est.

De Paralio. CAP. CLXXI.

a Liud tithymali genus dicitur paralios, quem Tithymalida,
aut Mechona aliqui appellauere. Nascitur in maritimis, ra-
mis rubentibus, palmum altis, quinis senisve a radice exeunti-
bus, folijs lini, angustis, paruis, oblongis, in versus quosdam digestis,
capite in cacumine orbiculato. In quo semen vt eruum, vario colore
emicat. Flos albus. Frutex totus cum radice lacteo succo turget. Simi-
les ad vsus reconditur.

De Helioscopo. CAP. CLXXII.

a Liud genus Helioscopus dicitur, folijs portulacæ, rotundio-
ribus, ramulis prodeūtibz a radice, quattuor aut quinqz, ru-
bentibus, dodrantali altitudine, tenuibus, latis copiosi ple-
nis, capite aneti, semine in capitulis incluso. Helioscopi nomen accæ-
pit, quoniā comas cū sole circumagat. Circa oppida nascitur, potissi-
mum in ruderibus. Colligitur succus semenqz vt aliorum. Eadem quæ
superioribus vires, non tamen vsqz adeo validæ.

De Cyparissia. CAP. CLXXIII.

c yparissias in caulem exit dodrantalem, vel maiorem, subru-
brum, ex quo folia piceæ similitudine exoriuntur, molliora ta-
men, & tenuiora. Et in totum nascentem piceam æmulatur.
Vnde nomen traxit. Candido succo madet. Cui eadem vis quæ supe-
rioribus.

De Petræo Tithymalo. CAP. CLXXIIII.

g Enus Tithymali in petris nascens, Dendroides cognomi-
nant, in cacumine largam spargens comā, succo lacteo præ-
gnans, cauliculis rubentibus, folijs myrti tenuioris, fructu
æu characiæ. Eiusdem effectus cuius superiores, similiqz modo recon-
ditur.

De Platyphyllo. CAP. CLXXV.

p Latyphyllos verbasco similis est. Radix, succus & folia, per
infernā trahunt aquas. Pisces necat, tulus & aquæ insparfus.
Reliqua Tithymalorum genera quæ supra scribūtur, eadem

efficiunt.

De Pityusa.

CAP. CLXXVI.

P Ityusam aliqui Clema, alij Crambion, alij Paralion, alij Canopicon vocant. Hanc species a Cyparissia differre constat, etsi tithymalorū generi assignetur. Caulis supra cubiti altitudinem assurgit, geniculatus, folijs piceæ, acutis, exilibus, flore paruo, purpureo, semine instar lenticulæ, lato, radice crassa, candida, succo referta. Quibusdam in locis frutex hic prægrandis inuenitur. Detrahit per aluum radix, drachmis duabus data in aqua mulsæ. Item seminis drachma. Succum cum farina subacti cochlearium, in catapotio datur. Modus foliorum drachmæ tres.

De Lathyri.

CAP. CLXXVII.

L Athyris quam aliqui Tithymalum appellant, eamq; Tithymalorū numero adscribunt, caulem emittit cubiti altitudine, & digitali crassitudine, inanē. Gignūtur in cacumine alæ & folia in caule oblonga, amygdalinis proxima, latiora, & læuora. Quæ autem in summis ramulis exierunt, minora conspiciuntur, aristolochiæ aut oblongæ hederæ figura. In cacumine fructum summis surculis gerit, triplici conceptaculo insignē, rotundum, ceu capparin, in quo grana intercurrentibus membranis distincta continentur, eruis maiora, rotunda, quæ dū corticibus exuuntur, candida sunt, & gustu dulcia. Nullus radicis vsus. Totus frutex lacteo succo turget, vti Tithymalus. Grana sex aut septem in catapotio, aut cum ficis aut palmulis deuorata, aluum purgant. Sed aqua frigida postea sorbenda. Trahunt autem bilem, pituitam & aquas. Succus Tithymali modo exceptus, eundem effectum præbet. In gallinaceo iure aut oleribus folia decoquuntur ad eodē effectus.

De Peplo.

CAP. CLXXIX.

P Eplos quem aliqui Sycen, alij Mecona Aphrodem vocant, frutex est lactei succi plenus, folijs rutæ, paulo latioribus, rotunda coma, dodrantali, humi resperfa, semine sub folijs rotundo, minore q̃ candidi papaueris. Pluribus scatet auxilijs. Vnicam radicem habet, superuacuum, ex qua fruticat. Nascitur inter vites, & in hortis. Colligitur messibus. Siccatur in vmbra & continue versatur. Fructus tulus & feruefactus reconditur. Bilis ac pituita detrahitur, acetabulo eius in hydromelitis cyathopotio. Obsonijs insperfa conturbat aluum. Muria conditur.

De Peplide.

CAP. CLXXX.

P Eplis quam aliqui syluestrem portulacam vocant, Hippocrates Peplion, in maritimis nascitur, largo frutice, candidi

DE MEDICINALI MATERIA

succi pleno, folijs satiuæ portulacæ, rotundis, inferne rubentibus, semine sub folijs rotundo, vti in peplo, feruente gustu, radice singulari, superuacua, tenui. Colligi & reponi solet. Datur vti peplos & conditur. Easdem habet vires.

De Chamæsyce. CAP. CLXXXI.

Hamæsyce aliqui Syce, alij spumofum papauer vocitant.
 c Ramos emittit quaternum digitorū, teretes, succosos, in terram deiectos, folia lentis, parua, peplum plane referentia, tenuia, quæ a terra non attolluntur, semine sub folijs rotundo, vt in peplo. Neq; caulem neq; florem promit. Radice firmatur tenui, superuacua. Rami ex vino triti vuluæ dolores sedant, in pecto appositi. Tollunt tumores, ac verrucas omnium generum illiti. Decoctorum cibo, aluus resoluitur. Succus simili effectu prodest. Illitus contra scorpionis ictum auxiliatur. Aduersus caligines oculorum vtilis, & hebetudines, incipientes suffusiones, nubeculas, cicatrices, cum melle inunctus. In squallidis petrosisque nascitur.

De Scammonia. CAP. CLXXXII.

Cammonia aliquibus Scambonia radix, alijs Colophonia, f alijs Dactylion, Romanis Colophoniū, Magis Apopleumonos, Aegyptijs Sanilum dicitur. Ramos ab vna radice emittit trium cubitorum, multos, pingues, & qui non nihil crassitudinis præferant, folijs Helxinæ, aut hederaceis, mollioribus tamen, densis, & triangulis, flore candido, rotundo, in calathi modum cauo, graueolente, radice prælonga, crassitudine cubitali, cædida, graui odore, succo grauida. Legitur ad hunc modum succus. Capite exempto, radix in testudinis speciem cultro excuatur, quo fit vt in cauum confluat succus, qui conchis demum excipitur. Alij scrobes in terra cōcamerato sinu fodiunt, in quos subiectis iugladium folijs, profundunt succum, siccatumq; extrahūt. Laudatur autem scammonium læue, nitidū, rarum, & colore q̄ simillimum taurino glutini, fungosum, tenuibus fistulis, quale ex Myfia regione Asiæ cōtermina deportatur. Nec attendere solum par est, si linguæ tactu albescat. Hoc enim euenit adulterato, quod admisto fit Tithymali lacte. Sed longe magis antea narratis. Item si non vehementer linguam exurat. Id quod misti Tithymali argumētum est. Natione autem Syriacū, & Iudaicum deterrima habetur, grauiā, densa, erui farina & Tithymalo viriata. Succus drachmæ vnus aut quaternum obolorum pōdere haustus, ex aqua pura vel mulsā, per inferna bilem & pituitam extrahit. Ad resoluendam aluum binos obolos cum sesama, aliove semine, sumpsisse satis est. Dantur efficacioris purgationis causa, succi quaterni oboli cum duobus veratri

LIBER QVARTVS.

113

nigri, & aloes drachma vna. Fiunt purgatorij sales drachmis viginti succi scammonia, in senos salis cyathos adiectis. Horum modus proportionis virium. Integer quidem tria cochlearia, medius duo, minimus vnum. Radicis drachma vna aut altera purgat, cum ijs quæ res tulimus. Nonnulli decoctum radicis ebibunt. Coquitur in aceto & cum hordeacea farina teritur, cataplasmate ischiadicis vtili. Partus enecat, succus vuluæ in lana subditus. Tubercula discutit cum melle aut oleo illitus. Decocto in aceto perunæ lepræ abiguntur. Diuturni capitis dolores ex aceto & rosaceo perfunduntur.

De Chamelæa.

CAP.

CLXXXII.

Hamelæam aliqui Pyros agnen, alij Heracleon, alij Bdelyram, alij Coccon gnidion, Romani Citocacium, nonnulli oleaginem, quidam Oleastellum vocant. Surculosa fruticat, ramis dodrantalibus. Folia oleæ similitudinē habent, tenuiora & amara, quæ gustata linguam mordent, & arteriam deradunt. Detrahit pituitam bilemque, folijs præsertim in catapotio deuoratis. Namque duæ absinthij partes, adiecta chamelææ vna, hydromelite excipiuntur, & in catapotia coguntur. Ea autem in ventre non liquefunt. Siquidem quotquot fuere deuorata, regeruntur. Folijs cum melle tritis fordida viscera & crustosa repurgantur.

De Thymelæa.

CAP.

CLXXXIII.

Hymelæam alij Ghamelæam, alij Pyros agnen, alij Cestron aut Cneoron vocant. Ex qua granum gnidium, quod est thymelææ fructus, colligitur. Hoc Syri Apolinum, alij linū appellant. Quoniam satiui lini frutex suapte natura similitudinem refert. Virgas ædit perpulchras, tenues, tripedaneas, folijs chamelææ, angustioribus, & pinguioribus, viscosis, gummosisque si mordeantur, flore candido, fructu myrti in modum totūdo, qui inter initia viret, & tandem rubescit, pulpa fructus dura, foris nigra, intus alba, quæ per interna bilem, pituitā, aquasque detrahit, si viginti granorum pars interna bibatur. Verū fauces adurit. Itaque cum farina aut polenta, aut in vix acino dari debet, aut melle cocto obducta deuorari. Qui ægre desudant, trito semine cum nitro et aceto, inunguntur. Folia quæ peculiariter gneorum appellantur, per messes colligi debent, & ficcata in umbra recondi. Quibus dare libeat, antea tundere, & nervos eximere cōuenit. Illitū acetabuli modo cum diluta potione, aquā extrahit. Mediocrius purgat, addita lēte cocta, aut cōtritis oleribus. Thymelææ farina vix acerbæ

P. j.

DE MEDICINALI MATERIA

succo excipitur, & in pastillos diuiditur. Hæba stomacho infesta. Partus imposita necat. Nascitur in montibus & asperis. Halucinatur qui coccon gnidium fructum esse chamelæ existimant. Falluntur enim quædam foliorum similitudine.

De Sabuco

CAP. CLXXXIII

Cten aliqui Dendron arctum, alij Hemeron, Latini Sabucum, Galli Scobiem, Daci Sebam vocant. Ex eo genere quædam in arborem assurgit, furculos spargens arundinaceos, teretes, cauos, candicantes, proceros. Folia iuglâdis, terna quaternave, ex interuallis circa ramos exeunt, graui odore, minutim in ambitu secta, & in ramulorum cacuminibus cauliculisque circinata vmbellæ, quæ florē candidum pariunt, mox fructum terebintho similem, in nigredine superpureum, acinosum, succo madentem, vinosumque.

De Ebulo.

CAP. CLXXXV.

Lterum genus chamæactæ vocatur, alijs Heliosactæ, alijs Agria actæ, alijs Euboica, Romanis Ebulum, Gallis Ducosne, Dacis Oliua. Ebulum longe humilior est, magisque hærbaceo generi assignandum, caule quadrangulo, geniculato, folijs amygdalæ, ex interuallo longioribus, geniculatim distributis in versus, graucolentibus, in ambitu serratis, muscario sabuci, flore & acino eiusdem. Radice nititur longa, crassitudine digitali. Eadem vtriusque vis & usus, refrigerans, & exiccans, aluo detrahens aquam, stomacho inutilis, Folia, olerum more coquuntur ad pituitam bilemque detrahendam. Cauli teneri in patinis cocti, eadem efficiunt. Radix in vino decocta & in cibis data hydropicos adiuuat. Prodest viperarum moribus, eodem pota modo. Vuluas emollit infidentium, decocto. Laxat earum spiracula, & vitia corrigit. Acini in vino poti eodem funguntur munere. Denigrant capillos illiti. Folia si prætenera ac mollia ex polenta illinantur, inflammationem mitigant. Ambustis & canis moribus illitu profunt. Vlcera quæ dehiscunt in fistulam agglutinant. Ijs qui podagra tentantur, cum seuo hircino profunt illita folia.

De Pygnocono.

CAP. CLXXXVI.

Pygnoconon constat erucæ folijs, acrioribus, scabris, & crassius, caule quadrangulo, flore ocimi, semine marrubij, radice nigra, rotunda, lutei coloris, exigui mali figura, terram redolente. Inuenitur in saxosis locis. Semine graui somnia et tumultuosa facit, drachmæ instar potum. Tumores discutit, illitum cum polæta. Spicula adactosque corpori aculeos extahit. Folia illitu tubercula panosque discutiunt. Radix eius in aqua mulsa duum drachmarum pondere, aluum et bilem extrahit.

LIBER QVARTVS.

114

De Apio seu radice syluestri. CAP. CLXXXVII.

Pion nonnulli ischiada, alij Camæbalanam agriam, alij Li-
 a nozostin, Latini Radicem syluestrem, Pœni Thorphathsa-
 dœ appellant. Iuncos duos siue tres spargit, rubros, tenues.
 Quia terra parum attolluntur. Folijs rutæ, oblongioribus tamen, &
 angustioribus, hærbaceis, semine paruo, radice hastulæ regiæ, in formâ
 pyri turbinata, succi fœcûda. Intus habet succum candidum. Extra,
 cortices nigros. Superior pars eius vomitione bilem pituitasq; extra-
 hit. Inferior per aluum. Tota vtrinq; purgationes mouet. Succum si li-
 ber eximere, tusa radix i fidili mergitur, & agitata aqua quod superna-
 tat pinna selectum, exiccatur. Purgat vtrâq; parte is succus sesquiobo-
 lo potus.

De Colocynthide. CAP. CLXXXVIII.

Olocynthis aliquibus Colocyntha ægos, alijs Sicya picra,
 c alijs alexâdrina Colocyntha, Zoroastri tymbra, Ostani au-
 togenes, Romanis Cucurbita syluatica, Dacis Tustrata di-
 citur. Sarmæta foliaq; satiæ cucurbitæ emittit, per terrâ repentia, diui-
 sa, fructû in speciem mediocris pilæ conglomeratum, vehementer ama-
 rum, quem legere oportet, cum cœperit in luteum colorem permutari.
 Medulla fructus purgatoriam vim habet, si quattuor oboli melle co-
 cto myrrha & nitro excipiantur, & cogatur in catapotium. Arefactæ
 pilæ teruntur, & infusæ clysteribus profunt, neruorum resolutioni, co-
 xendicum doloribus, & colivitijs, vt quæ bilem, pituitam & strigmē-
 ta, interdum etiam cruorem eliciant. Fœtus ad mortē enecant. Dentiū
 dolorem tollunt, si vna repurgetur & luto oblita cū aceto & nitro in-
 feruescat, hoc q; iure decocti dētes colluantur. Si aqua mulsâ aut pas-
 sum incoquatur & sub diuo refrigescat, potu crassum humorem & stri-
 gmenta alui detrahet. Stomacho supramodum aduersatur. Subdita ex
 ea balano, alui excrementa eiiciuntur. Virenti succo vtilissime ischia-
 dici perfricantur.

De Epithymo. CAP. CLXXXIX.

Pithymum Romani inuolucrum vocant. Flos est epithymo
 e durior, satureiæ similis. Capitula habet tenuia & leuia & in
 eis fibras, quasi capillamenta. Potum cum melle detrahit pi-
 tuitam bilemq; atram per inferna. Priuatim prodest melancholicis, &
 inflatis, acetabuli mensura, ad quattuor drachmas, cum melle sale &
 aceti exiguo. Plurimum in Cappadocia & Pamphylia gignitur.

De Alypo. CAP. CXC.

Lypon surculosa hærbæ est, subrubra, latis ramulis, tenuibus
 a folijs, flore molli, copioso, radice betæ, tenui, referta acris suc-
 co, semine epithymi. Gignitur in maritimis. Hæc pleraq; li-

p. ij.

DE MEDICINALI MATERIA

byæ loca scatent. Semen atram bilem deijcit, si mensura epithymo pari cum sale & aceto sumatur. Verum interanea leniter exulcerat.

De Empetro seu calcifraga. CAP. CXCI.

e Mpetron aliqui Phacoides vocant, Nascitur in mōtibus & maritimis, falso gustu. Sed quo propius terreno fuerit, amari^{us} sentitur. Trahit bilem, pituitā, & aquam, si bibatur in iure aliquo aut hydromelite.

De Clematide. CAP. CXCII.

c Lematidem aliqui Epigetin, Aegyptij Philacuon, Romani Ambuxum nominant. Viticulis constat subrubris, folio vehementer acri gustu, & exulcerante. Vicinis inuoluitur arboribus vt smilax. Tritum semen et ex aqua aut hydromelite potū bilem pituitamq; detrahit. Illita folia lepras eximunt, Cnm lepidio conditur ad esum.

De Labrusca. CAP. CXCIII.

l Abrusca sarmenta vitis modo prælonga emittit, aspera, lignosa, rimoso cortice, folijs hortensij solani, longioribus ac latioribus, muscoso flore, & capillaceo, fructu exiguis vuis famili, post maturitatē rubente. Rotūda est acinorum facies. Feruefacta radix in aqua, & in cyathis duobus vini aqua marina diluti, pota humorem alui ciet. Ideo hydropicis datur. Vuæ eius vitia cutis in facie & maculas omneis expurgant. Enascentes ramuli cibi gratia conduntur.

De Vite alba. CAP. CXCIIII.

v Item albā aliqui Bryoniam, alij Ophioistaphylon, alij Chelidonium, aut Melothron, aut Psilothron, aut Archezostin, aut Agrostin, aut Cedrostin appellant. Folijs sarmentis pampinifq; satiuam vitē imitatur, sed hirsutiora sunt omnia. Ea quos prope se nata sit frutices, suis clauiculis completitur. Fructus rubens in vna dependet, quo coria pilis spoliatur. Ex ea asparagi qui prima germinatione exeunt, decocti in cibo; aluū et vrinam ciet. Folia, fructus, radix, acré vim sortiūtur. Itaq; vlcera phagedænis, gangrænis, chironijs, putrentium tibiærum tedio, efficaciter ex sale illinuntur. Radix corpus abstergit, & cutem erugat. Vitia cutis in facie, varosq; lentiginēs; & cicatrices nigras emendat, cum eruo, creta chia, & fœno græco. Eodem effectu prodest decocta in oleo, vsquedum liquecat. Sugillatā tollit. Reduuias committit. Inflammationes discutit il-

lita ex vino: Suppurationes rumpit. Medicamento apte immisce-
tur, quod carnem exest. Infracta ossa extrahit, trita & imposita.
Datur comitialibus in potu, drachmæ pondere cotidie anno toto.
Prodest attonittis & vertigine laborantibus, confimiliter assumpta.
Contra viperarum ictus pota drachmis duabus auxiliatur. Partus ne-
cat. Mentem interdū subturbar. Cit vrinā pota. Eclegma ex ea fit cum
melle, difficile spirantibus, strangulatu oppressis, tussietibus, vulsis, ru-
ptis, & laterum doloribus. Lienem ternis obolis pota ex aceto trigin-
ta diebus consumit. Illinitur ad eadem cum fico. Ad muliebres inces-
sus decoquitur. Siquidem vulvas purgat, sed abortum facit. Succus e
radice vere exprimitur, qui trahit pituitam cū aqua mulsa potus. Ad
psoras & lepras, semen efficaciter illinitur. Lactis abundantia facit suc-
cus eius, si cum tritico decocto sorbeatur.

De Vitenigra CAP. CXCV.

Igra vitis quam aliqui nigram bryoniam vocant, alij Chiro-
nion ampelon, alij Bucranion, Romani oblameniam, alij
Britanutem, alij Betifalcam, Daci Priadelā, alij Pegrinam,
Aphri Lauothen. Folia fert hederæ, sed maiora, simlaccis proxima,
caules etiam cognatos. Capreolis suis arbores quasi adminicula com-
prehendit. Fructus racematim cohæret, qui inter principia virent, et
post maturitatem nigrescunt. Radix foris nigra intus buxæ colore ni-
tet. Caules qui primo germinum partu erumpunt, in olera recipiuntur.
Menses pellunt. Vrinæ cient. Lienem absumunt. Vertiginosis, comi-
tialibus, nervorum resolutione tētatis, prosunt. Radix eadem quæ vi-
tis alba præstat, sed inefficacius. Folia cum vino exulceratis iumen-
torum ceruicibus commodissime illinuntur. Luxatis itidem impos-
nuntur.

De Filice CAP. CXCVI.

Terin Græcorū alij Pterineon, alij Dacidonon, alij Anas-
phoron, alij Blechnon, alij Polyrhizon, vocat. Magi Her-
mubain, Romani Filicā, alij Laculē, alij Filifanariam, A-
gyptij Asini sanguinem. Folia sine caule, sine fructu, sine flore, ex vno
pediculo, cubitali longitudine exeunt, multifida & lateribus pin-
nata, subgravi odore, radice per summa cespitem nigra, oblonga
multis capillamentis fibrata, subadstringente gustu. Nascitur in
montibus & saxosis. Radix latas tineas excutit, sumpta drachmis
quattuor ex aqua mulsa. Melius si cum scamionæ aut veratri ni-
gri totidem obolis detur. Sed qui sumunt, alia prægustare debent.

p. iij.

DE MEDICINALI MATERIA

Laborantes lienis incremento recreat. Radix & potu & illitu prodest
ijs qui arundinibus cæsi sunt. Probatum maxime quæ in arundinetis
proueniat & locis pulegio scatentibus.

De Filice fœmina. CAP. CXC VII.

Helypteris aliqui Nymphæam pterin nominant, Romani
t Linguam ceruinam, folijs filicis, surculosis & quæ non singula
ri ut illa pediculo fulciantur, radicibus longis, pluribus la-
tis, quæ ex nigro in luteum flauescunt. Aliquæ etiamnum rubræ inue-
niuntur. Pellunt lata interaneorum animalia, cum melle eclegmate
sumpto. Potæ cum vino drachmis tribus teretes tineas eiiciunt. Datæ
fœminis sterilitatem faciunt, & prægnantibus abortum, si supergre-
diatur. Farina humidis vlceribus & cicatrici repugnâtibus ispargitur.
Lumentorum ceruicibus medetur. Folia recentia in oleribus cocta man-
duntur ut ventrem emolliant.

De Filicula. CAP. CXC VIII.

Olypodion aliqui Scolopendrium, alij Pterin, alij Polyrhiz-
p zon, Latini filiculam vocant. Nascitur in muscosis petris, &
vetustis arborum caudicibus, præsertim quærucum, palmi alti-
tudine, filici similis, subhirsuta non tenui peride diuisura. Radix pilosa,
in qua continentur cirri, ceu poliporum, crassitudine digiti minimi, co-
loris intus hærbacei, austera aliquantum, & gustu subdulcis. Purgandi
vim habet. Coquitur cum gallina aut piscibus, aut beta, aut malua, ad
aluum soluendam. Aridæ farina aquæ mulsæ insparsa, detrahit bilem
& pituitam. Trita luxatis efficaciter illinitur, & aduersus digitorum
fissuras.

De Dryopteri CAP. CXC IX.

Ryopteris aliqui Pterion, alij Nymphæam pterin nomi-
d nant. Nascitur in veterum roborum musco, filici similis, mul-
to minore foliorum incisura, radicibus inuicem implexis, hirsu-
tis, gustu acerbis, in dulcedinem vergentibus. Psilotrum est cum ra-
dicibus trita. Illinitur enim primum usque dum sudorem euocet, mox
sudor abluitur, & recens imponitur.

De Cnico. CAP. CC.

Nicus folijs constat oblongis, asperis, spinosis, caule sesquipeda-
c li, capitulo magnitudine gradis oliuæ, flore croci. Semine cadu-
do, alioqui rusto, longo angulo, so. Huius flore in obsonijs utitur

tur. Seminis tufi succus adiectis amygdalis, nitro, aneto, & melle decocto, cogitur in placentulas quæ aluum emolliunt. Hæc in frustra quattuor finduntur, quæ nucis iuglandis magnitudinem impleant. E quibus ante cœnam duo vel tria sumpsisse satis est. Ratio temperandi hæc est. Cnici cãdidi sextarius, amygdalorum tostorum & delibratorum cyathi tres, anethi sextarius vnus, aphronitri drachma vna, cum carnibus triginta caricarũ. Seminis succus lac cogit, & magis ipsum resoluẽdæ alui facultate donat.

De Mercuriali.

CAP.

CCI.

Inozostin marẽ. c Græcis aliqui Parthenion, alij Argyron, alij Aritrillin, alij Chryfitin, Aegyptij Aphlopho, aliqui Hermu botanion, Latini Mercuriale mascula, alij Tesculata, Aphri Asumes vocant. Folijs constat ocimi, minoribus, Helxinæ cognatis, ramulis duplici geniculorũ nodo cinctis, alarum cauis multis, fructu in fœmina copioso, quandam racemorum speciem præbente, mari e foliorum sinu dependente, paruo, rotũdo, ceu binis testiculis vna cohæretibus. Frutice dodrãtali aut maiore. Vtraq; in oleribus manditur, ad aluum ciendam. Cocta in aqua, epoto iure, bilem aquamq; detrahit. Constat vt mares gignantur, hunc facere, vt fœminæ illam, si a purgatione bibantur, & trita folia genitalibus admo- ueantur.

De Cynocrãbæ.

CAP.

CCII.

ynia aut Cynocrãbe, aliquibus Linozostis, Aphris Armas, c alijs Asumeslabon dicitur. Cauliculum binum palmorum altitudine emittit, mollem, subalbidum, folia mercuriali aut hederæ similia, certis interstitijs subalbida. Semen folijs adhæret, paruum, rotundum. Folia cum caulibus pota aluum cient. Oleribus cõmendantur. Ius decocti & pituitam & bilẽ aquamq; detrahit.

De Heliotropio magno.

CAP.

CCIII.

h Eliotropium magnum aliqui Scorpiuron vocant, alij Heliotropon, alij Dialion, alij Heliopon, alij Scorpioctonon, alij Sesamon agrion, alij Scorpij vrã. Flos ei est effigie scorpionis caudæ. Vnde scorpiuro ei nomen. Et quoniam folia cum sole circumagat, Heliotropion dicitur. Folia ocimi habet, hirsutiora & candidiora, & maiora. Ramuli a radice terni, quaterni, aut sæpe quini exiliunt, multis alis cõcaui, flos in cacumine cãdidus, aut subfuluus. Incuruatur vt scorpionis cauda. Radix tenuis est & inutilis. Nascitur in
p .iiij.

DE MEDICINALI MATERIA

asperis. Decocta ex aqua fasciculo manus plenæ, pituitā bilēq; per aluū extrahit. Contra scorpionū idus & potu & illitu prodest. Ad alligatur vt conceptum adiuuet. Aiunt per horam vnā ante accessiones, seminis grana quattuor, quartanas finire, tria vero, tertianas. Illitum semen formicantes verrucas penfilesq;, & thymi florem representantes, et epynithidas exiccat. Folia, infantū destillationibus quas syriae seīs vocāt, podagris, luxatisq; vtilissime illinuntur. Mēses cient. Paratus trita & imposita pellunt.

De Heliotropio paruo. CAP. CCIII.

h Eliotropion paruum quod & aliqui Scorpiuron vocant, nascitur in palustribus iuxta lacus, folijs antedicto proximis, rotundioribus, semine acrochordonum verrucarū modo, penfili, rotundo. Hærbā cum suo semine pota, adiecto nitro, hyssopo, nasturtio & aqua, latas tineas teretesq; excutit. Penfilles verrucas quæ acrochordones vocantur, cum sale illita tollit.

De Scorpioide. CAP. CCV.

f Corpioides hærbula est, folijs exiguis, semine caudæ scorpionis effigie. Illita scorpionum idibus præsentaneo est auxilio.

Pedacij Dioscoridis Anazarbei de medicinali materia Libri Quarti,
Ioanne Ruellio Sueffionensi interprete,

F I N I S

LIBER QVINTVS. 117
 PEDACII DIOSCORIDIS ANAZAR-
 BEI DE MATERIA MEDICINA
 LI LIBER QVINTVS, IOAN
 NERVELLIO SVESSIO-
 NENSI NITER-
 PRETE.

S Vperioribus quattuor libris amicissime
 Ari, tradidimus de aromatibus, oleis, vn-
 guentis, arboribus, & earumdem lachry-
 mis ac fructibus, itē animalibus, melle, la-
 cte, adipe, frumentis, oleribus. Necnon de
 omni radicū, hærbarum, succorum, semi-
 numq; ratione. In hoc autem totius ope-
 ris quinto differemus de vinis & metallicis, & a Vite nostram com-
 mentationem auspicabimur.

De vinifera Vitæ. CAP. I.

f Olia Vitium & triti capreoli, capitis dolores illitu mitigāt,
 & inflātionē stomachi ardoremq; cū polenta. Folia etiam
 per se, vt quæ refrigerent & adstringāt, imponi solent. Potus
 eorū succus dysentericis, sanguinē excreantibus, stomachicis, & gra-
 uidarū malaciæ medetur. Eadem efficiunt madefacti in aqua capreoli
 & poti. Lachryma Vitiū quæ veluti gummi in caudicibus cōcrescit,
 ex vino pota calculos pellit. Illita lichenas & psoras leprasq; nitro
 prius perfritas sanat. Eadem cū oleo sæpius pillis illitis, pilotri effe-
 ctum habet, maximeq; sanies quam accēsa fermenta Vitium exudarūt.
 Qua & perunctæ verrucarum informicationes extrahūtur. Cinis far-
 mentorū & vinaceorū erūpentibus in sede condylomatis & thymijs
 illitus ex aceto medetur. Prodest luxatis & viperarum moribus. Con-
 tra lienis inflammationem illinitur, cum rosaceo & ruta & aceto.

De sylvestri Vite. CAP. II.

f yluestris Vitis duorum generū est. Alterius vva non matu-
 rescit, sed flore tenuis ænanthen nominatam perducit. Altera
 ad frugē peruenit, paruis acinis, nigra, & adstringens. Folia,
 caules & clauiculæ quibus repunt, vim habent cultæ Viti similem.

De Vua. CAP. III.

v Væ recentes aluum turbant, & stomachum inflant. Innocen-
 tiores quæ decerpæ diu pependere, ideo q̄ in eis copia hu-
 moris exiccatur. Vtileq; sunt stomacho ægrisq; atq; cibi
 auiditatem excitant. Vinaceis aut vinario vase seruatæ, ori & stoma-

DE MEDICINALI MATERIA

cho grata sunt. Aluum fistit, sed vesicam & caput tentant. Et sanguinem excreantibus conueniunt. Similesque quæ in musto fuere. Sapa aut musto condita, stomachum magis infestant. At quæ solem prius passæ in aqua cœlesti cōduntur, minus vinosæ sunt, siticulosi, ardētibus & longis febribus salubres. Recōditi vinacei inflammatis mammis, turgētibus ac præduris, cum sale illinuntur. Decoctura eorum dysentericos, cœliacos, & fœminas fluctione vuluæ laborātes iuuat infusa. Ad deflectiones ac fetus assumitur. Nuclei acinorum adstringendi vim obtinent. Stomacho vtilis sunt. Inspargitur farina tostorum polentæ modo, dysentericis & cœliacis & solutis stomacho.

De Vua passa. CAP. IIII.

Vua passa alba adstringentior est. Prodest esitata caro earum tussi, renibus, ac vesicæ. Estur in dysenteria per se cū nucleis.

Et decocta in patinis cum melle, admista milij ac hordei farina & ouo, valet ad purgandum caput. Eiusdem gratia cū pipere conmanducatur. Testium inflammationes sedat, illita cum lomento fabarum, aut cumini farina. Fauos, epynitidas, carbūculos, enatas in articulis putredines, & gangrænas, sine nucleis trita, & cum ruta imposita sanat. Podagræ cōuenienter cum opoponace illinuntur. Mobiles vngues illita extrahit.

De Oenanthæ. CAP. V.

Oenanthæ vocatur vitis sylvestris fructus, cum floret. Recōdi debet fistili non picato, collectaq; substrato linteo in umbra ficcatur. Laudatissima in Syria & Cilicia & Phœnice. Vis ei adstrictoria. Quare pota stomacho acciundæ vrinæ utilis. Aluum fistit, ac sanguinis excreationes. Cōtra fastidia & acorem stomachi, sicca & illita efficax est. Capitis doloribus tā viridis q̄ sicca ex aceto & rosaceo perfunditur. Sanguinolēta vulnera cataplasmate, & incipientes ægilopas, cicatrices in ore, & genitaliū nomas, trita cum melle croco myrrha & rosaceo, ab inflammatione vindicat. Pessis miscetur ad sistendum sanguinem. Cōtra oculorum delachrymationem, et stomachi ardōres, cum polline polentæ & vino illinitur. Crematæ carbonibus cinis facit ad oculorum medicamēta. Rediuiuas, paronychia, abscedentes gingiuas, cruentasq; cum melle sanat.

De Omphacio. CAP. VI.

Omphacion succus est acerbæ vuæ, nōdū maturescētis et thassia Vite, aut amminæa. Oportet autē ante canis ortum, expressam meliginem in cyprio vase linteo cooperto insolare, vsq; dum cogatur. Semperq; quod ceruici vasis concretum hæsit, reliquo humori permiscere. Noctu subdialibus locis auferre. Quādoquis

dem nocturni rores ipsum concrefcere non finunt. Eligendum est flauum, friabile, vehementer adstringens & linguam mordens. Sunt qui coquendo melliginem cogant. Prodest contra tonfillas, vnam, vlcera oris, humida gingiuarū vitia, purulentas aureis cum melle aut passo. Item ad fistulas, vetera vlcera, nomasq; ex aceto. Dysentericis & mulieribus fluxione vuluæ laborantibus clystere infunditur. Oculorum claritati & scabrie & erosionibus angulorum conuenit. Bibitur ad recentem sanguinis excreationem, etiam si rupta parte aliqua cōtingat, sed pauco & aquatior est vtendum. Valde siquidem exurit. Idem ad stringit. Prodest stomacho qui cibi tenax non est, aut tardius cibum concoquit. Item ijs qui ilei dolore conflctantur. Conuenit in grauidarum malacia. Sorbtum auxiliari constat, cum populatim grassatur pestifera lues. Huiusmodi omphacium non nisi post annos multos bibi potest.

De Vini natura.

CAP.

VII.

Ino veterenerui læduntur & reliqui sensus, gustu quod suauius est. Quare cauendum ijs qui internā alicuius partis imbecillitatem sentiunt. Attamen in secunda valetudine paucū aqua dilutū, innoxie sumitur. Nouum inflat. Aegre coquitur. Insomniā parit. Et vrinam ciet. Aetate medium vtraq; vitia fugit. Quare ad vitus sanorum ægrorumq; vsurpatur. Album tenue, stomacho vtile est, ac facile in membra distribuitur. Nigrum vero crassum est, et cōcoctu difficile. Carnem alit. Et ebrietatem creat. Giluum, vtpote quod mediū est, medias inter vtrūq; vires habet. In secūda tamen et sinistra valetudine, cum primis laudatur album. Quin & vina qualitate distant. Siquidem dulce crassis partibus constat. Et difficilius a corpore discutitur. Stomachum inflat. Aluum & interanea vt mustum turbat, sed minus inebriat. Renibus et vesicæ aptissimum. Austerum per vrinam celerius transit. Sed capita dolore tentat, & temulentiam gignit. Acerbum ad ciborum per membra digestionem accommodatissimum. Aluum & cæteras fluxiones cohibet. Nouum nervos minus tentat. Vinū aqua marina factum, stomacho aduersatur. Sitim stimulat. Nervos infestat. Aluo aptum. A valetudine se recoligētibus inutile. Passū quod vuis sole siccatis in area, aut in sarmento adustis exprimitur, creticum cognomine aut pramnion aut protopon, & sapa quæ fit musto igni decocto, Greci syriion aut hepsēma appellant, quodq; melas dicitur, aut melampsygium crassa sunt, & corpora multum alunt. Cādidū tenuius, & medium medias sortitur vires. Omnia tamē adstringūt & pulsus reuocāt. Faciunt aduersus venena, que exulcerando necant ex oleo pota, & vomitionibus reddita. Contra cicutas meconium, vene-

DE MEDICINALI MATERIA

num, toxica & concretum lac. Item contra renum ac vesicæ pruritus, rofiones, exulcerationesq;. Inflat tamē & stomacho aduersantur. Priuatim prodest melapsinthiū si vëter rheumatismū sentiat. Albū magis cæteris emollit aluum. Gipso conditum nervis officit, caput aggrauat et incendit, ac vesicæ aduersatur. Contra venena cæteris aptius. Pica ta, aut resinata, excalfaciūt, cōcoquunt. Sanguinem excreantibus ini mica. Que vero parachyta vocant, admistam sapā recipiūt, caput implent. Temulentia gignūt. Aegrius a corpore discutiūtur. Stomachū male habent. Inter Italica vīna falernum principem locū obtinet, quod inueteratum perq; facile coquitur. Languidos pulsus exuscitat. Aluum adstringit. Stomacho vtile. Sed vesicæ nocet. Atq; ijs qui visus hebetudinem sentiunt, & ad potus crebros minime idoneum. Albana crassioribus constant partibus. Dulcia stomachū inflant. Ventrem emolliunt. Sed cōcoctionem non æque adiuuant, & nervosa minus infestant. Vetustate eadem, austerum saporem concipiunt. Ceccubum dulce est et albano crassius. Corpus et colorem alit. Aegre tamē coquitur. Surrentinum satis austerum est. Quare intestinorū & stomachi fluctiones cohibet. Et cum tenue sit, caput minus tentat. Inueteratum suavius red datur, & stomacho vtile. Adrianum & Mamertianum in Sicilia æque crassis partibus gignūtur. Modice adstringūt, & ocyssime inueterantur, minusq; ob suam tenuitatem nervos tentāt. Paretypianū, & quod ex adriatico sinu defertur, odoratum ac leuius est. Quare multus epotus fallit. Diu seruat ebrietatē, & soporem adfert. Istricū paretypiano simile est, sed vrinam vehementius pellit. Chium tamen antedictis mollius, & aptum potui est. Bene alit & minus inebriat. Fluctiones cohibet. Oculorum medicamentis vtile. Lesbium facile membra subit, chio leuius & aluo idoneū. Ephesium eadē vim habet, Empygela & etino lo asie mesogites nomine, capitis dolores ciet, & nervos lædit. Coum vero & clazomeniū, quoniam multā sibi maris aquā vendicant, facile corrumpuntur. Flatus mouent. Aluū turbant, nervis officiunt. Vinū omne, vt reliqua in commune dicātur, merum, ac syncærum, & sua natura austerum excalfacit. Facile in membra distribuitur. Stomachum adiuuat. Appetētiā ciborum inuitat. Vires alit, ac robur augeat. Somnum conciliat. Et commendat colorem. Potum liberalius auxilio est, contra assumptam cicutam, coriandrum, pharicum, ixiam, meconium, argenti spumam, taxum, aconita, fungosve. Cōtra serpentium morsus, & omnium istus que refrigerando necant, aut stomachum in vomitiones effundunt. Facit ad longas inflationes, rofionesq; præcordiorum, ac distentiones & stomachi singultum, & si venter aut interanea rheumatismum sentiant. Conueniunt sudatoribus, et quibus corpus

immodico sudore digeritur, diaphorumenos vocant, maxime alba, vetera, & odorata. Quæ tamen vetustate dulcescunt, renibus ac vesicæ accommodatiora redduntur. Vlceribus, inflammationibusque in succida lana imponuntur. Tetra vlcera & phagedænica, & fluctionibus obnoxia, commode perfunduntur. Marina austera, & alba, ad sanorum vitus usurpantur. Ijs præstant Italica, falernum surentium, ceccubum, signinum, & per multa cæpaniæ, & parætypianum ab adriatico sinu, & ficulum quod mamertianum appellatur. Ex græcis chiû, lesbiû in phrygia et epheso nascens. Crassa vero & nigra, stomacho negotium exhibent. Inflationem pariunt. Corpus augent. Tenuia tamen & austera stomacho prosunt, & minus carnes alunt. Vetera valde tenuia, & candida vehementius urinam ciunt, & dolores capitis mouent. Nervi quoque largius pota tentant. In media ætate vt a septimo anno, potui saluberrima sunt. Modus autem pro ætate, & tempore anni, & consuetudine, & qualitate vini definiatur. Non sitire & modice cibos proluui, optimum est præceptum. Nocet ebrietas omnis, & maxime assidua. Si quidem obessos nervos quotidie relaxat. Largiorque potus, acutorum morborum adfert initia. Modice tamē inebriari, aliquot diebus maxime post aquæ potus vtile. Namque expurgans sensum excrementa transfert & per cæca corporis spiramenta discutit. Sed aquam post ebrietatem bibere oportet. Namque a cura constantis temulentie quendam auxilij modum inducit. Omphacites nomine peculiariter fit in lesbo, siccata sole acrivua, paulo ante maturitatem decerpta, triduo aut quatrinduo, donec racemi in rugas contrahantur, expressumque vinum cadis insolatur. Vim adstringendi habet. Prodest dissolutis stomacho, & ilei dolore laborantibus. Item prægnantium malaciæ, et crudis. In pestilentia quoque sorbitum auxiliari dicitur. Huiusmodi vina non nisi post multos annos bibi possunt. Lora quæ deuteriam alij potimō appellat, fieri solet, adiectis metretis tribus aquæ, in vinacea, quibus triginta vini metretæ extractæ fuerint, calcatis vinaceis, expressoque decocto ad tertias parteis, & additis in singulos cōgios binis salis sextarijs. Post hyemen trāsfunditur in vasa. Lora post annum vtendū. Etenim celeriter exolefcit. Cōuenit ægris quibus timemus noxam vini, coacti sepe desiderijs eorum obtēperare. Item a longa valetudine se recolligentibus. Fit & vinum quod adynamon vocat, loræ vires habens, hoc modo. Pares aquæ & musti mensuræ coquantur, molli igne, donec absumatur aqua, quod vbi refrixerit elutriatum, picato vase reconditur. Alij marinæ & cœlestis aquæ, mellis, & musti pares miscent portiones, & quadraginta diebus insolant, quo post annum vtuntur. Vinum e syluestri vua nigrum adstringit. Prodest alui & stomachi fluctionibus et cæteris quibus cōstrictione & cōtra-

DE MEDICINALI MATERIA

atione opus est.

De Melitide vino

CAP. VIII.

Elitides datur in longis febribus, quæ stomachū infirmarūt.
 m Namq̃ aluū emollit. Vrinam ciet. Stomachū expurgat. Prodest articulario morbo, renibus, imbecillo capiti, et mulieribus abstemijs. Odoratum siquidem est, & corpus alit. Distat a mulso quod fit e vino vetere, austero, & melle exiguo. Melitides autē adiecto ad quinq̃ congios austeri musti, mellis congio, & salis cyatho, cortinis magnis, quo magis ad effervescendum locus pateat, fieri oportet, sensim asperfo sale. Cumq̃ effervere desierit, in alia vasa transfunditur.

De Mulso.

CAP. IX.

Vulsū e vetere vino austeroq̃, et bono melle factū præfertur.
 m Minus enī inflat, ac celeriter id genus vigore adipiscitur. Vetus corpus alit. Media ætate, aluo prodest. Vrinā pellit. Ab ultimo cibo sumptum nocet. Et inter initia potum implet. Dein appetendi aviditatem reuocat. Fit mulsum duabus vini metretis, ammissa vna mellis. Aliqui quo celerius præberi possit, mel cum vino coquūt, & ita transfundunt. Alij utilitatis gratia, ad sextarios sex musti ferentis, vnum mellis adijciunt, & vbiberbuerit vase recondunt. Dulce autē permanet.

De aqua mulsa.

CAP.

X.

Qua mulsa easdem quas mulsum vires possidet. Decocta uti
 a mur, cum molliri deiectionem, aut vomitionem incitare, volumus, ut ijs qui venena hauserunt ex oleo. Dococta datur imbecillis, & hoibus elanguescentis pulsus, quos illi dixerunt microphyctos, tussientibus, peripneumonicis, & ijs qui immodico sudore digeruntur. Iam paratum repositumq̃, quod aliqui hydromeli proprie vocant, media ætate adynamo vino aut loræ correspondet, & similem vim adipiscitur. Quare inflammationibus alicuius membri plus q̃ loræ prodest. Inueterati tamen vsus damnatur, inflammatis, aut cōstrictis. Sed laboranti stomacho aut cibū fastidienti, sudatoribusve conuenit. Fit duabus pluviæ aquæ veteris ad vnam mellis partem additis, & insolis. Alij fontanam aquam adijciunt, & ad tertias parteis decoquūt & ita recondunt. Nec desunt qui hydromeli appellēt, quod a melle elutis aqua fauis confici solear. Sed meratius facere cōuenit. Aliqui id coquant. Aegrotantibus noxium est, quoniam plurimam sibi floris cerei partem vendicat.

De Aqua.

CAP.

XI.

a Quam in vniuersum, propter locorum proprietates & peculiares naturas, cœlū et alia pleraq̃, difficile est experiri. Magna

LIBER QVINTVS

120

tamen ex parte optima est dulcis, syncæra nullius omnino qualitatis particeps. Et quæ ne minimo quidem tempore in præcordijs commoratur. Ad hæc quæ & facili via fertur, & citra molestiam, Si nec inflationes creet nec corruptioni cedat.

De Aqua marina.

CAP.

XII.

Qua maris calida est, & acris, Stomacho aduersatur. Aluum enim conturbat, Pituitam expellit. Si vero calida ad fatus adhibeatur, elicit & discutit. Nervi vitijs & pernionibus ante vlcerum prodest. Miscetur cataplasmatibus ex hordeacea farina, & emplastris, & discutientibus malagmatis. Ad mouendas deiectiones tepescit & infunditur. Ad tormina calida, psoras, pruritus, impetigines & mammas turgentes, foueri vtile est. Liuios suffitu discutit. Ad venenatos ictus qui tremorem & refrigerationem adferunt, salutaris intelligitur, maxime scorpionum, phalangiorum aspidumque. Etiam si quis in calidam descendat auxiliatur. Et malo habitu confectis iam diu corporibus, nervisque balneæ ex ea vtilis. Hydropicos, capitis dolores, aurium grauitates, feruentis vapor leuat. Syncæra, & sine potabilis aquæ missione reposita, virus deponit. Sunt qui etiam præcoquant & ita rescondant. Datur ad purganda corpora per se, aut ex posca, aut cum vino aut melle. Verum post deiectionem, dant galinæ aut piscium iuscula, ad domandam morfus acrimoniam.

De Thalassomelite.

CAP.

XIII.

Vod Thalassomeli vocatur, vehementer purgare constat. Temperatur autem æquis portionibus maris, mellis, et imbris ex alto, defæcatis, & picato vase per canis æstus isolatis. Alij ad binas marinæ coctæ singulas mellis adiiciunt & vase condunt, moderatius aqua marina & mitius.

De Aceto.

CAP.

XIII.

Cetum refrigerat & adstringit. Stomacho vtile. Appetentiam excitat. Erumpentem vndeunque sanguinem, potu incessuue sistit. Prodest alui fluxionibus coctum cum cibis. Cruentis vulneribus inflammationes arcet, in succidis lanis aut spongia impositum. Reprimit procidetia sedis vuluæque. Item abscedentes gingiuas, et sanguine manantes. Ad nomas, et ignem sacrum, vlcerum quæ serpunt, lepras, impetigines, pterygia, cum aliquo conuenienti efficax est. Phagedænas vlcerum, momasque potu continuo cohibet. Podagricis calido potu cum sulfure auxiliatur. Sugillationes rapit, cum melle illitum. Contra capitis ardores cum rosaceo in succidis velleribus, aut spongia imponitur. Ad aquam intercutem, grauitatem aurium et sonitus, sibilosque feruentis vapor proficit. Instillatum quoque aurium vermes necat.

*Sum post deiectionem
cibum*

DE MEDICINALI MATERIA

Panos coercet tepidi fots, aut si imbuta aceto spongia admoueat. Pruritus permulcet. Contra venenatos morsus, qui refrigerando nocent, calidum commode fouetur. Et frigidum ijs, quæ exures virus eiaculantur. Calidum potum atq; vomitionibus redditum, aduersus omnia venena efficax est, præsertim contra meconium & haustam cicutâ. Conglobatum in ventre sanguinem, lac coagulatum, fungos, ixiam, taxumq; cû sale. Haustu voratas hirudines si sorbeatur eijcit. Tussim verem mitigat, & recentem laceffit. In orthopnoea calidum commode sorbetur. Gutturis fluxiones gargarizatum inhibet. Anginis & iaceti vuæ conuenit. Contra dentium dolorem calidum colluitur.

De Aceto mulso. CXC. V.

Cetum mulsum quod Oxymel vocant, hoc modo temperatur. Aceti heminas quinq; salis marini pondo, mellis minas decem, aquæ sextarios quinq; pariter coquito, decies effervescente cortina, atq; vbi refrixerit diffundito. Sumptum crassos humores extrahere & ischiadicis, comitialibus, & articulorum morbo confectis prodesse creditur. Contra morsum eius viperæ quam sepa vocant, haustum meconium, ixiamve, auxilio est. Anginis vt iliter gargarizatur.

De Acida muria. CAP. XVI.

Acida muria quam Græci Oxalmen vocant. Contra nomas fots, putrida vlcera, canû morsus, & venenatos ictus auxiliatur. Sanguinis fluxiones post extisos calculos sistit, si statim calida in vulnus iniiciatur. Prociduam sedem reprimat. Dysentericis si nomas sentiât, infunditur. Oportet autem eam ex lacte instillare, hirudines sorbitione aut gargarizatu necat. Furfures & manâtia capitis vlcera ex terget.

De Thymoxalme. CAP. XVII.

Thymoxalme veteres vtebantur, dabantq; laborantibus imbecillitate stomachi, ternos quaternosve cyathos, aqua calida dilutos, in articularibus morbis, & inflationibus. Crassos humores atrosq; trahit. Hoc modo facitatur. Thymi triti acetabulû, salis idem modus, rutæ, pulegi, polætæ, singulorum exiguæ portiones in vas coniiciuntur, aquæ terni sextarij & aceti terni cyathi infunduntur & circumposito linteo sub dio madescunt.

De Scyllino aceto. CAP. XVIII.

Cyllinum acetum hoc modo fit. Scylla quæ cãdida fuerit expurgata conciditur, traictaq; lino segmẽta modicis intervalis ne se contingant, ficcantur in vmbra quadraginta diebus. Mina eorum in aceti boni sextarios duodecim immergitur, & vase dig

ligēter operto septenis diebus in sole madescit. Post eū numerū dierū scylla eximit, & expressa abijciť. Defæcatū acetū trāssundit & reponitur. Aliqui scyllæ minā, quīq; acetī sextarijs miscēt. Alij citra exēccationē repurgātes, parē mēsurā adijciūt, & senis mēib⁹ macerari patiūt. Id multo magis humorū lēticias digerit. Gīguas humore pręgnātes collutione stringit. Et motos dētes firmat. Putredines oris & graues halitus tollit. Durat fauces, & callosas facit. Vocē expedit et lipidā canorāq; reddit. Dat stomachicis, ægre cibū cōcoquētib⁹, melācholicis comitialibus, vertiginosis, mēte captis. Itē vuluarū strāgulationibus lienis incremēto laborātibus, ischiadicisq;. Imbecillos admodū recreat. Corpus sanū reddit, et bonū colorē pręstat. Oculorū aciē exacuit. Tarditatē quoq; aurīū infusione purgat. In sūma ad oīa efficax. Cauēdū tamē intestinis exulcerationibus, in capitis dolore, aut neruorū vitijs. Datur quotidie ieiunis sorbēdū, inter initia exigū, paulatim adaugendo ad cyathū vsq;. Nonnulli binos dant cyathos aut largius.

De vino Scyllino. CAP. XIX.

Cylinū vinū fit hoc modo, diseťā vti diťū est scyllā, & sole fīccatā cōtūdito, minā eius tenui cribro incernito, & līteo ila ligatā, in vīcenos sextarios musti recētis ac boni demergito. Vbi trimestri spatio maduerit, elutriatū vinū obstruťto diligēter vase recondito. Licet quoq; sic humida scylla vti. In orbiculos rapī modo diseťā duplicato pōdere, quadraginta diebus insolari oportet, et inueterascere. Alia parādi ratio. Scyllæ diseťæ et repurgatæ tres minas, in italicā metretā musti demittito, & senos mēses in vase obstruťto macerari finito. Post id tēpus excolatū vinū recōdito. Vtile est contra cruditates, et ciborū corruptiones. Itē ijs qui reuomūt cibū, et si pituita in vētre aut stomacho coierit. Prodest lienosis, male habitis corporibus, aquæ iter cutē, regio morbo, difficili vrīnæ, torminosis, īflationib⁹, resolutioni neruorū, rigoribus lōgis, vertiginosis, & vūlſis. Mēses pelilit. Minime neruos infestat. Hoc vinū vetustate fit melius. Cauendus in febre vsus, aut si interanea vlcus sentiant.

De vinis marinis. CAP. XX.

Arina variefactitatur. Aliqui enī statī quū decerpťæ sūt vūæ m aquā maris āmiscent. Alij in area vūas solefīccāt, quibus calcatis, marinā adijciūt. Alij passas prius vūas in dolijs marina aqua macerāt, mox calcatas exprimūt. Id magis passi generibus adscribitur. Quæ tamen austeriore gustu temperantur, contra febrium aduentantium indicia valent, si modo meliora non adsint. Aluum subducunt. Profunt purulenta extussientibus, aut si dura aluus exerceat. Quæ ex aminnæis viuīs fiunt, caput tētant. Stomacho aduersantur, fla

DE MEDICINALI MATERIA

tus creāt. Verū quo plenior habeatur historia, ijs qui huius studio tenētur, nō inutile existimam⁹ varias vinorū cōpositiones adferre. Nō quod frequēs eorū aut necessarius existat vsus, sed ne quid omisisse videremur, quod ad eorū rationē attineret. Sunt autē quædā ex ijs facticia, minoris curæ ac impēdij, quæ cadūt in vsus. Vti quæ ex cotoneis malis, pyris, filiquis, itē myrti baccis cōponuntur.

De vino Cydonite. CAP. XXI.

cydonites noīe alio melites appellat, & ita fieri cōsuevit. Mala cotonea exēptis seminibus, frustatim rapi modo scinduntur, & duodeci minarū pōdo, in musti metretā triginta diebus demergūtur. Postea defæcatū vinū reponit. Alia faciēdi ratio. Oportet ad singulos mellis sextarios, denos succi cotoneorū tusorū pressorumq; adijcere, & ita recondere. Vinū hoc adstringit. Prodest stomacho, dysenterici, hepaticis, renum vitij, & vrinæ difficultati.

De Melomelite. CAP. XXII.

Elomeli, quod et cydonomeli nomināt, sic fit. Cotonea mala seminibus suis castrata, in q̄ plurimū mellis, quod demergi possint cōijciūtur. Id post annū mitescit, mulso nō dissimile. Præstat eadē quæ superior cōpositio.

De Hydromelo. CA. XXIII.

It hydromelon duabus mēsuris aquæ coctæ, & sub caniculæ sidus insolatæ additis ad vnā melomelitis facti ex cotoneis.

Vis huius eadē est. De Omphacomelite CAP. XXIII.

Omphacomelitis faciēdi ratio hæc est. Acerbæ vix immaturæ & tribus diebus insolatæ exprimūtur, & ad ternas succi partibus, mellis optimi despumati singulæ partes adijciūtur, & insolatū in vasa trāsfūdatur. Vim adstringēdi ac refrigerādi habet. Stomachicis cœliacisq; cōuenit. Vsus post annū est.

De vino Apijte. CAP. XXV.

It et pyris perinde atq; cotoneis vinū, apijtes noīe, sed ita ut pyra nō magnopere maturescāt, Ex filiquis etiā, mēspilis, sorbis simili modo tēperat. Oīa hæc genera acerba sūt, & adstringūt, atq; intestinas fluxiones cohibēt.

De Oenāthino CA. XXVI.

It elabrusca, hoc est vite sylvestri, quod vocat oenāthinū. Sic ci flores minis duabus musti metreta macerati, post triginta dies mutantur, mox collatū vinū reconditur. Facit aduersus stomachi imbecillitatē, cibifastidia, cœliacos & dysentericos.

De vino Rhoite. CAP. XXII.

It e punicis malis maturis quod rhoitē nomināt, succo expresso ab acinis eorū, quib⁹ lignosus nucleus abest, apyrina vocat, aut decocto ad tertias, & ita reposito. Efficax est cōtra fluxio-

nes iternas, & febrim cū alui profluuiū exortā. Stomacho vtile. Adstīgit aluū & vrinā mouet. De vino Rhodite. CAP. XXVIII.

r Rhodites sic fit. Rosarū ficcarū tufarūq; minā liteolo deligatā in sextarios octo musti demergito. Et post tres menses, defecātū vinum transfundēs, recōdito. Vtile ijs qui febris carent, & ad stomachi cōditiones, & dolores in fine potū, & cōtra humiditas aluos & dysenterias. Fit quoq; ex succo rosarū, addito melle quod rhodomeli vocāt quod arteriæ scabricijs cōuenit.

De vino Myrtite. CAP. XXIX.

m Myrtites fit baccis nigris post maturitatem tufis, & organo expressis. Aliqui ad tertias coquūt. Alij baccas prius sole torrēt, et quaternis sextarijs cōtufarū, ternas aquæ heminas adijciūt, et vini veteris parē modū. Postea exprimūt & seruāt. Magnopere adstringit. Stomacho vtile. Fluotionibus ventris ac stomachi prodest, & cōtra intestinas vlcerationes & profluuiā. Denigrat capillos.

Di vino Myrsinite. CAP. XXX.

m Myrsinites sic tēperatur. Rami nigræ myrti cum suis baccis & folijs tufi, decē minarū pōdo, in tribus musti cōgijs feruescūt, donec duo supersint, aut certe sesquicōgijs relinquať. Id vinū colatū ad vsus recōdit. Cōtra furfures, vlcera ī capite manātia, eruptio nes papularū, gingiuas, tōfillas, & purulētas aureis efficax est. Sudores sistit. De vino Lētiscino & terebinthino CAP. XXXI.

l Lētiscinū similiter vt myrsinites tēperatur. Nec secus terebinthinū. Nāq; bacciferi corū ramī sumi debēt. Similes insūt vires. Adstringūt. Stomacho accōmodant, & defluotionibus intestinorū, vesicæ, & stomachi, & sāguinis profluuiū. Vlcerā oīa fluotionibus obnoxia, forū ad cicatricē perducūt. Fluotiones vuluæ ac sedis, īfessione cohibēt. De vino Palmeo. CAP. XXXII.

p Almulas maturas quas vocāt chydæas, in vrscolū imo pertu tufū, & obstructū picata arūdine, demittito, lino foramē fit ob turatū, & quadragenis sextarijs ternos aquæ cōgios infūdito. Quod si ipsum ita dulce esse non libeat, quinq; congios infūdisse satis est. Post decē dies detracto ab arūdine linteo, assumito vinū crassū & dulce, et reponito. Suaue illud quidē, sed capiti noxiū. Contra fluotiones propter adstrictoriā vim efficax. Stomachicis, celiacis, sanguinē expuētibus cōuenit. Aliqui idem addita aqua iterū capiunt, & tertio, quarto, quinto, sextove, faciunt, quod tandem acore vitiatur.

De Vino Catorchite. CAP. XXXIII.

c Atorchites aliquibus sycites vocatur. In cypro fit, Ita vt pal meum. Sed hoc interest, quoniam pro aqua tantumdem hu

q .ij.

DE MEDICINALI MATERIA

moris adijciunt, in quo recenter pressa vinacea maduerint. Caricæ quæ chelidoniæ aut phœnicæ appellantur, præsertim nigre mace-
rantur, vti diximus, & post decē dies humor excipitur. Atq; iterū aut
tertio, idē modus aquæ in qua vinacea maduerint, infunditur. Simili
modo intercedētē spatio, quarto aut quinto assumitur. Demacerata-
rum liquor non secus acorem cōtrahit, & aceti vsum præbet. Id tenue
est. Flatus gignit. Stomacho aduersatur. Fastidium parit. Aluo tamē
prodest. Vrinā ciēt. Menses trahit. Lactis vbertatē facit. Vitiosum san-
guinē creat, & elephantiasin adfert, vt potio quā zethon appellamus.
Aliqui sex amphoris, decē salis sextarios adijciūt. Alij muricæ ampho-
ram, quod nō facile vitiatur & aluo idoneum fore censēt. Alij thymū
et fœniculū imo subijciunt, & caricæ superponunt & ita vicissim, do-
nec vas expleuerint.

De vino Sycomorite. CAP. XXXIIII.

It & e sycomoris eodē modo vinū. Sed in acetū acre degenē-
rat, qm̄ noīata præualet vis eorū, vt fluētis liquoris dulcedi-
nē retinere possit. De Vīno Refinato CAP. XXXV.

Refinatū vinū populatim facituri solet. Copiosum in galatia.
quoniā vinū illic coacescat, vna non maturescit. Ideoq; re-
frigerat, nisi picea refina temperetur. Refina autem cū corti-
cetū dicitur, & amphoræ, dimidiata hemina permiscetur. Aliqui vbi ef-
ferbuit excolant, separantes refinā. Alij relinquunt. Hæc vina vetu-
state dulcescunt. Omnia capitis dolorē & vertigines faciunt. Conco-
ctionem tamen adiuuant. Vrinam ciēt. Tussientibus ac destillatione
vexatis conueniunt. Itē cœliacis, dysentericis, mulierum mensibus, &
hydropicis, & fœminis fluxione vuluæ laborātibus. Altis exulcera-
tionibus infunditur. In hoc autem genere nigricans magis albo con-
stringit.

De vino Strobilite. CAP. XXXVI.

Trobilites fit maceratis in musto nucibus pineis, recentibus,
fractisq;. Præbetq; refinati effectus, si quis madefactas nuces pi-
ni musto decoquat. Potum cōuenit ijs qui tabitudine confis-
ciuntur.

De vīno Cedrino. CAP. XXXVII.

Edrinū, Iuniperinū, cupressinū, laurinū, pineū, aut abiegnū
simili ratione fiunt. Diuisos recenter ramos cū fructū ædunt,
aut soli, aut balneo, aut igni, admouere oportet, vti defudēt, cō-
gioq; vini minam vnā permiscere, & post duos menses trāsfundere. Et
anteq; recōdantur insolare. Fastidiorū vinorū vasa impleri debēt, nāq;
nō plenīs vasis, vina in acorem corrumpuntur. Medicata autē vina, re-
te valentibus insalubria. Omnia excalfaciunt. Vrinā ciēt, & subtrin-
gunt. Laurinū tamen vehementius excalfacit. Fit quoq; e fructu cædri

maioris vinum, congio musti, adiecta tusarum baccharum selibra, Diebus quadraginta insolari debet, & defæcatum in vasa transferri.

De vino Iuniperino. CAP. XXXVIII.

f. It etiã vinũ e baccis iuniperi, nõ aliter q̃ cedrites, & et ad eadẽ valens.

De Vino Cedrite CAP. XXXIX.

Edrites hoc modo fit. Cedriam dulci aqua lauãt, & singulas amphoras singulis cyathis diluũt. Et ita musto replẽt. Hoc genus vini excalfacit, extenuat. Tussi vtile sine febre, pectoris laterũq; doloribus, ventris & interaneorũ vlceribus, purulẽtis excretionibus, mulieribus vuluæ malo opportunis, hydropicisq;. Facit aduersus ventris tineas & rigores. Contra venenatos ictus auxiliatur. Serpentes necat. Aurium doloribus instillatum medetur.

De vino Picato. CAP. XL.

Icatũ ex liquida pice & musto tẽperatur. Picẽ autẽ primum marina aut muria tantisper eluere oportet, dum inalbuerit, et syncera maris aqua defluat. Mox aqua dulci proluẽda. Congijs octo musti, vncia picis vna aut altera adijcitur. Vbi efferbuerit & constiterit, in vasa diffunditur. Hoc genus vini excalfacit, concoquit, purgat, abstergit. Vtile doloribus pectoris, iocineris, lienis & vuluæ, si sine febre sint, veteri rheumatismo, exulcerationibus in altũ recedentibus, tussi, suspirijs, concoctionibus tardis, inflationibus, & luxatis, præsertim in succida lana impositum.

De vino Absinthite. CAP. XLI.

a. Absinthitæ faciendi ratio euariat. Aliqui enĩ duodequingaginta sextarijs italicarũ amphorarũ, ammistã absinthij pontici libram decoquunt ad tertias parteis, & vbi infuderint nonaginta acetis sextarios & absinthij selibrã, ac diligẽter permiscuerint, diffundũt in vas, dũq; cõquieuerit defæcãt. Alij absinthij minã in amphorã demittũt, tusamq; & raro linteo deligatã, in decẽ congijs musti macerãt, binis mēsis. Alij absinthij quadrantẽ, alij trientẽ, & nardi syriacæ, cinnamoni, casia, floris iunci odorati, calami, elatæ, palmarũ, singulos sextantes iniiciunt in metretã musti, & tũdentes prius pilã, obstrueto vasis spiraculo, binis ternisve mensibus dimittunt. Postea defæcatum vinum transfundunt ad vsus. Alij addunt in musti caddum, celticæ nardi drachmas quattuordecim, & absinthij drachmas quadragita liteo inuolutas, & post quadragessimũ diẽ elutriãt. Alij in viginti sextarios musti, absinthij librã, & ficcæ pini resinæ sextantem immittũt, et post decẽ dies excolant & recondunt. Vtile est stomacho. Vrinam cit. Tardã concoctionẽ accelerat. Hepaticis, regio morbo, & renũ vitijs auxiliatur. Fastidia discutit. Ijs prodest quibus q̃ .iij.

DE MEDICINALI MATERIA

Stomachus negociū exhibet. Valet contra longā præcordiorū distensionē, & inflationes, teretesq; ventris tineas, & remoratos menses. Contra hausta ixiæ venena q̄ plurimum potum & vomitionibus redditum auxiliatur. De Vino Hyssopite CAP. XLII.

Hyssopites e cilicio hyssopo maxie laudatur. Fitq; similiter foliorū hyssopi tusorū libra in amphorā musti cōiecta. Liteolo raro cū quibusdā lapillis folia inuoluūtur, vt degrauiatus pōdusculo fasciculus fidat. Vinum post quadraginta dies defæcatum elutriatur. Cōtra pectoris laterū & pulmonis vitia, veterem tussim, & spiria prodest. Vrinam cit. Torminibus & rigoribus febrium circuitu repentibus auxiliatur. Menses mouet.

De Vino Chamædryite. CAP. XLIII.

Imili modo chamædryites fieri solet. Excalfacit, discutit. Cōuulsis, regio morbo, vuluæ inflationibus, tardæ cōcoctioni, incipiēti aquæ itercutē, subuenit. Inueterascēs melius redditur.

De Vino Stichadite. CAP. XLIIII.

Stichadites nō secus tēperatur. Cōgijs sex stichadis minā ad dere oportet. Crassitie, inflationes, laterū, neruorūq; cruciatus, & perfrictiones discutit. Comitialibus cōmode datur, cū pyrethro & sagapenio.

De Aceto stichadico. CAP. XLV.

Ita eadē acetū e stichade hærba, vt paulo ante diximus acetum macerata. Quod eosdem implet effectus.

De Vino Cestrite. CAP. XLVI.

Ita vinū e Betonica, quā cestron psychotrophon appellant: Hærbā semine maturo prægnātem, cū suis ramulis minæ pōdo, congijs duobus musti macerant, & post septimū mensem transfundunt. Ad multa interaneorū vitia, vt frutex ipse pollet. Et vt in vniuersū dicatur, facticia vina, sibi misturarū vires adsciscūt. Quare non difficile fuerit, ijs qui illarum naturas norint, vinorum vires coniectura quadam consequi. Verumtamen vinorum vsus febricitantibus abdicandus. Fit etiamnum e betonica acetum ad eadem vitia vtile.

De Tragoriganite vino. CAP. XLVII.

Tragoriganites fit quaternis Tragorigani drachmis, in quaternos musti sextarios coniectis, & post tertium mēsem transfusis. Prodest torminibus, vulsis, ruptis, laterum doloribus, spirituum discursationi, ægris concoctionibus.

De Vino Bunite. CAP. XLVIII.

Napis fit vinum nomine bunites, drachmis duabus tusi napi in sextarios duos musti additis, & cæteris eodem modo fa-

LIBER QVINTVS.

124

dis. Prodest stomachicis & dimicatione aut longo equitatu fatigatis.

De Vino dictamnite. CAP. XLIX.

d I&amni drachmas quattuor macerato quaternis musti sexta
ijs. Facit duersus stomachi fastidia. Menses & purgamentum
a partu subducit.

De Vinoprasijte. CAP. L.

m Arubij adulti folia tundito, & sextarios octo in musti metre
tam demittito, & reliqua consimiliter facito. Conuenit hoc
vinum pectoris vitijs & omnibus quibus marrubium.

De Vino Thymite. CAP. LI.

t Hymi tusi & cribrati vncias duas linteo colligatas, in am
phora musti adijcito. Valet contra agras coctiones, fastidia,
dysenteriam, neruorum & precordiorum dolores, hibernos
horrores, & venenata animalia, quorum morsum frigus isequitur, aut
putrescit locus.

De Vino Thymbrite. CAP. LII.

f Imili modo e satureia vinum fit, quod eadem quæ thymites præ
stat.

De Vino Origanite. CAP. LIII.

f Ic quoque origanites ex heracleotico Origano conficitur. Fa
cit eadem quæ thymites.

De Calaminthite & Abrotonite vinis. CAP. LIIII.

e Calamintha, pulegio, & Abrotono vina sunt eodem quo thy
mites modo. Pro sunt stomachicis, cibum fastidientibus, & re
gio morbo, & vrinam moueant.

De Vino Conyzite. CAP. LV.

f It & item e conyza vinum, contra venenata ante alia efficax.

De Vino Aromatite. CAP. LVI.

a Romatites ita fit. Palmae, Aspalathi, Calami, nardi gallici,
singulorum quattuor sextarios sumito, Postquam contriueris mu
sto subigito, coactis ingentibus offis, & in sextarios duode
cim austeri musti deiectis, operculato vase, quadraginta diebus quiesce
re finito. Deinde ubi face expurgatum fuerit, recondito. Alia eius ra
tio. Calami vncia, phu drachmae septem, costi drachmae duae, nardi sy
riaci drachmae sex, casie vncia, croci drachmae quattuor, ammomi dra
chmae quibus, asari drachmae quattuor, omnia simul trita & linteo colli
gata in caddum musti demerguntur. Et postquam vinum deferbuerit trans
funditur. Facit ad pectoris et laterum et pulmonis dolores. Difficili
vinae, rigoribus, retardatis mensibus, atque ijs qui per frigora iter fa
ciunt, potum conuenit. Pituita crassitiem extenuat. Colorem alit. Som
num conciliat. Dolorem finit. Renum & vesicae vitijs auxiliatur.

q .iiij.

DE MEDICINALI MATERIA

De Vinea Piperis Myrrha & iride. CAP. LVII.

It & vinum ad destillationes, cruditates, tussim, inflationes, et si humor in stomacho coijt, myrrhæ duæ drachmæ, piperis candidi drachma vna, iridis drachmæ sex, anisi drachmæ tres. Omnia plenius tusa & linteolo inuoluta in sex vini sextarios cōijciuntur. Vinum post triduum colatur, & in lagena reconditur. Datur post deambulationem meraculum cyathi vnus mensura.

De Nectarite vino. CAP. LVIII.

It quoq; nectarites ex Helenio hærbæ, quam alij medicam, alij symphyton, alij Idæon Phlomon, alij Orestion, alij Nectarion vocant. Radice sicca pondo quinque drachmarum linteolo colligata, & in congios sex musti addita, & post tres menses effusa. Facit ad stomachi & pectoris vitia. Vrinam pellit.

De Vinea syriaca nardo celtica et malabathro. CAP. LIX.

Syriaca nardo & celtica, malabathroq; vinum facitatur, hac ratione. Singulorum selibram in binos musti congios mittito. Post menses duos colato. Datur cyathus vnus cum tribus aquæ. Hoc vinum efficax est contra vitia renum, hepaticos, reagiū morbum, & vrinæ difficultatē. Prodest stomachicis, atq; ijs quos palor decolorat. Alij bessem, aut sextantem acori, & celticæ nardi quadrantem, in musti amphoram adijciunt.

De Asarite vino. CAP. LX.

Sfari quadrantem in senos musti sextarios itidem demittito. Id vini genus vrinam ciet. Hydropicis, & regio morbo laborantibus, hepaticis, ischiadicisq; conuenit.

De Vinea syluestri nardo. CAP. LXI.

Adicis syluestris nardi recentis & tritæ cribratæq; bessem, in congiū musti conijcito. Duos menses quiescere finito. Vtile est hepaticis, difficili vrinæ, inflationibus, stomachicis.

De Daucite vino. CAP. LXII.

Adicis dauci contusæ drachmas sex in musti amphoram imponito, & similiter transfundito. Facit ad dolores thoracis, præcordiorum & vuluæ. Menses pellit. Ructus ciet, & vrinam. Prodest tussi, ruptis, vulvisq;.

De Saluiato vino. CAP. LXIII.

Aluiæ vnciam in musti amphoram, quod idem cū ceramio est, mittito. Valet cōtra renum, vesicæ, & laterum dolores, reiectiones sanguinis, tussim, rupta, vulva & suppressos menses.

LIBER QVINTVS

125

De Panacite vino. CAP. LXIII.

p Anacis vnciam in musti congiū mittito, & transfundito. Prodest ruptis, vulsis, fractis, orthopnœæ. Lienis crassitiē extenuat. Contra tormina, coxendicum dolores, efficax est. Tardas concoctiones accelerat. Menses & partus extrahit. Aquæ intercutem, & serpentium ictibus auxiliatur.

De Acorite vino. CAP. LXV.

v Ina ex acoro & dulci radice consimili modo fiunt. Oportet enim singulorum vncias in senos congios mittere, tribus mensibus macerare, mox in vas transferre. Faciunt ad pectus & latera. Et vrinam mouent.

De Selenite vino. CAP. LXVI.

f Eminis apij recentis, maturi, & cribrati drachmæ nouem in musti amphoram demittantur. Appetitum excitat. Stomachicis & difficili vrinæ auxiliatur. Oris halitum commendat.

De Marathrite & anethino vino. CAP. LXVII.

c X Foeniculo, anetho, & Petroselino, vina eodem modo fiunt, & ad eadem efficacia.

De vino e flore salis. CAP. LXVIII.

f It & e flore salis vinum multo ad purgandum efficacius, quàm vinum aqua marina temperatum. Fauces, vesicam, renes, & stomachum infestat. Quare neque in secunda neque aduersa valetudine prodest. Fit etiam vinum quod Phthorion vocant, quoniam partus necat, & abortus facit. Veratro aut scammonia, aut syluestri cucumere, iuxta radices vitium sato. Siquidem vites sibi illorum vires adfasciunt. Id vinum partus enecat. Datur ieiunis mulieribus quæ ante vomuerunt, cyathorum octo mensura, dilutum.

De Vino ethymelææ. CAP. LXIX.

r Amorū thymelææ cū suis folijs & fructu triginta drachmas mittito in congios tres musti, & leui igne coquito, donec congiij duo supersint, defæcatumque recondito. Aquosa purgat excrementa, & lienem absumit.

De Vino e Chamælææ. CAP. LXX.

c Hamælææ dum floret, cum folijs tusa, & cribrata decem drachmarum pōdere, in musti congiū additur. Post duos menses vinum in vas transfertur. Aquæ intercutem, hepaticis, & lassitudine confractis, efficax est. Item mulieribus quæ a partu ægre purgantur.

DE MEDICINALI MATERIA

De Vino Chamæpityino. CAP. LXXI.

Hamæpityinum simili modo fit, ad eadem cōueniens. Vri-
nam quoq; ciet.

De Vino Mandragorite. CAP. LXXII.

Ibrum radice concidito. Segmenta lino trajcito, quod seli-
brā æquat in musti cōgios decē demittito. Ibiq; esse finito ad
menses treis. Media potio hemina dimidiū. Bibitur, passo
in duplum addito. Aiunt heminam vini congio mistam, potu soporem
adferre. Cyathus vnus cū sextario vini potus, enecat. Mediocris vsus
eius, doloris sensum aufert. Fluctiones incrassat. Olfactu, instillatu,
potuq; idem præstat.

De Vino Helleborite. CAP. LXXIII.

N congiiū musti aqua marina diluti, drachmas duodecim ni-
gri veratri triti in linteo mundo, mittito. Dumq; efferbuerit,
in marinæ aquæ congios quatuordecim aut quindecim tran-
sfundito. Et vbi pleniusecule fregeris, inijcito. Post aliquot dies colato,
& vtitur. Dato cyathum vnum ex aqua in potu ad aluum soluendam
ijs qui euomuerūt a cœna. Alia ratio. Veratri drachmas viginti, iun-
ci odorati vncias duodecim, spicæ syriacæ vncias tridecim, cribratas
& linteo colligatas in septē vini coi sextarios, diebus quadraginta ma-
cerandas indito. Postmodum colato. Dabis in potu sesquiheminam.
Aliter. Decoctæ marinæ aquæ ex pelago petiti sextarios duodecim,
veratri candidi libras sex, quadagesimo die q̄ madefeceris, colato &
vtilor. Alia ratio. Veratri drachmas duodenas, & aphronitri quater-
nas in senis musti sextarijs diebus quinque denis macerato, mox colato,
& semestri exacto, vtilor. Id vini genus abortus facit, & partus necat.
Aut vuas in sole siccatas imposito in musti metretam, implet autē me-
treta congios decem, & gypsum in vinum mittito pondo drachmarū
viginti, & biduo residere finito, conijcito veratri nigri vncias trigin-
ta, iunci odorati, calami, singulorum drachmas triginta, baccarum iu-
niperi sextarios duos & heminā, myrrhæ et croci singulorū drachmā,
inuoluens linteolo diebus quadraginta appendito, postea colato, da-
bis heminas treis aut duas dillutas. Purgat a partu & abortu fœmi-
nas. Menses extrahit. Contra strangulatus vuluæ efficac.

De Vino Scammonite CAP. LXXIII.

Cammonites sic fit. Radicis scammonia per messes effossæ
tritæ & linteo colligatæ drachmas quinque, in vini cōgiū mit-
tito, ad dies triginta. Aluū purgat. Bilē & pituitā extrahit.

De omnibus metallicis & primū de Cadmia. CAP. LXXV.

X. Cadmiæ generibus optima est cypria, botryitis nomine, densa, modice grauis, & in leuitatem magis declinās, racemosa facie, colore spodij quæ fracta cinerulenta est, & æruginosa. Proxima habet foris cærulea, intus cādidior, internatis segminibus, onychitæ lapidi similis. Cuiusmodi sūt quæ e veteribus metallis effodiuntur. Quædam etiā placodes id est crustosa dicitur, lineis quibusdā perinde quasi zonis cincta, ob quod eā zonitin appellauere. Alia ostracitis nominatur, gracilis, & magna ex parte nigra. Sed quæ testaceam faciem habet, terram amplexa est. Improbatur candida. Oculorum medicamentis botryitis nomine, & onychitis, vtilis. Reliquæ ad emplastra & farinas quæ cicatricibus inducendis insperguntur. Ad eadem cypria prodest. Ex macedonia vero, thracia, et hispania delatæ improbantur. Cadmiæ effectus adstringere, caua explere, sordes expurgare, exiccare, corporis meatus infercire, excrescētia in carne coercere, crustas creare, & vlcera quæ cacoethe vocantur, ad cicatricem perducere. Gignitur cadmia ex ære in fornacibus candente, fuligine egesta flatu, et lateribus camerisq; fornacum applicata. Prægrandes autem ac ferreæ sunt fornaces, ab officinis appellatæ acestides, per summa nullo spiraculo relicto, concameratæ, vt quæ ab ære iactantur sursum corpuscula cohæreant, & inibi detineātur, quæ cum spissius infidēt, in corpus concreascunt, & modo genus vnum eius, modo alterū, modo omnia perficiunt. Extrahit & cadmia cremato lapide cui pyritæ cognomen est, monti soleo supereminente. In quo etiā quædam quasi venæ, chalcitis, mysios, soreos, melantheriæ cærulei, chrysocollæ, attramēti sutorij diphrygisq; inueniuntur. Nec defunt qui cadmiam in lapidum fodinis iuueniri tradant, falsi quadam lapidum cognatione. Reperitur et apud cumas lapis nullā sui vim ostēdens. Ij eo depræhēduntur q̄ sunt cadmia leuiore, nullumq; alienum mādentibus saporem exhibēt. Cōmanducatus autē lapis dentes offendit. Cadmia vtpote cū cedat, esum non respuit. Alio autem discerni possunt argumento, cadmia in farinā detrita, & aceto subacta, in sole se comprimit. Quod in lapidenūq; accidit. Item tritus & igni appositus lapis, profilit, et fumum igni simile eiaculatur. Cadmia vero quieta manet, fuliginēq; luteo colore aut æreo splendentem expuit, vario zonarum discursu. Insuper lapis ignem expertus, atq; refrigeratus colorē mutabit, ac leuior multo fiet. Sed cadmia nihil euariat, nisi quis eam aliquot diebus cremauerit. Fit & in argenti fornacibus candidior, ac minus ponderosa, sed viribus nequaquam comparanda ærariæ. Vritur cadmia superior carbonibus obruta, do-

DE MEDICINALI MATERIA

nec translucida spectetur, & ferrei stercoris modo bullet, mox extinguitur vino aminnæo. Sed quæ ad pforarū medicamenta præparatur, aceto. Alij hoc modo exustam conterunt in vino, rursusq; fidili crudo torrent, donec pumicosa videatur. Iterumq; trita ex vino, vrunt, donec in cinerem redigatur, nihil scabriciæ retinens. Hac spodij vice utitur. Lauatur in mortario trita, effusa subinde aqua, dū sordidum nihil emergat. Dein coacta in passillos reponitur.

De Pompholyge. CAP. LXXVI.

Ompholyx specie sola, non genere, a spodio distat. Siquidē
 p spodios nigricat, & plerumq; pōderosior est, palearum pilorumq; plena, quasi dera sum quiddam, ac detra ctum ab æraria rum officinarū pavimentis & fornacibusq; videatur. Pompholyx vero pinguis est, & candida, vsq; adeo levis, ut in auras euolare possit. Cuius duo fluxerūt genera. Vnum ad aeris colorem vergens, supinaque, alterum magnopere candidū, summamq; leuitatem nactum. Cā dida sit Pompholyx, quoties in perficiūdo ære, fabri præstatiorem facere volentes, detritam cadmiam cumulatius insparserint. Namq; tenuissima fauilla quæ effertur, in Pompholygē coit. Cæterū Pompholyx nō ex æris modo materia & fabili industria facitatur, sed ex cadmia quoq; ad gignendam ipsam eximie proflata. Cuius faciundæ ratio hæc est. In domo binis tectis operata, fornax extruitur, iuxta quam mediocris fenestra versus tabulatū a supernis partibus pateat. Domus cilij paries fornaci proximus, tenui foramine ad fornacem vsq; perforatur, ad excipiendam follis narem. Ostium mediocre habeat pro exitu ingressuq; artificis fabricatum. Domuncula altera coniuncta sit, in qua & folles & flator suo munere fungantur. Deinde carbonibus in camino succens, assidens artifex cadmiam particulatim fractā inspargit, a locis supra fornacis caput extru ctis. Idē negocium obit artificis minister, simulq; carbones adijcit, vsq; dum indita cadmiæ copia prorsus absumatur. Itaq; egesta suffitu, tenuis pars & levis materiæ in summam domum euolat, & parietibus tectisq; adhærescit, conflatum inde corpus, inter initia erumpentibus aquarum bullis simile prodit, postea maius incrementum capescens, elaboratis lanis simile redditur. Pōderosius autem in subiecta pedibus loca se recipit. Sed hoc fornacibus offunditur, illud domus pavimento cohæret. Quod tenuiore deterius existimandum est, ideo q; multum terræ collegerit, & spurcicia in acervatione referciatur. Sunt qui hoc modo tantum fieri spodiū arbitrantur, de qua antedictū est. Optima creditur cypria, quæ accepto aceto odorem æris præstat, colore aliquantum piceo, sapore luti horrido, & si fraudem non experta, flagranti carbone inferuescit, acreum colorem

contrahit. Antedictis autem notis, diligenter attendendum est. Si quis dem a nonnullis adulteratur taurino glutine, ouillo pulmone, aut mārino, aut crematis grossis, & quibusdam confimilibus. Quod facile cognitu fuerit. Quippe nihil in ijs probandis inuenietur eorum, quæ antedicta sunt. Pompholygem ita lauāri oportet, ligatam linteo mundo modiceq; raram, aut siccam, aut aqua respersam, in labellum demittito, quod imbrem contineat, & huc atq; illuc fasciculum deferens, immergito. Ita enim limosa pars eius ac dulcis effluet, & omne crassamentū in linteolo remanebit. Postea residere sinens, aquam cum cinere colis incernito, & nouam infundens, agitato, & effundito, mutata tantisper aqua & colata, dū arenosi nihil fidat. Demum aquam exprimito, & siccatum cinerem recondito. Alij quantum maxime fieri potest siccant, & manibus in aqua cōterunt, dum mellis crassamentū imitetur. Deinde linteo faucibus excepturi vasis obtento, aut laxius illigato, colant, & quo facilius transeat, infusa per linteum largiore aqua, cinerem conaturbant, mox spumofum quod traiectum est & supernatat vasi, concha excipiunt, & fictili nouo ad vsus recondunt. Quod vero resedit, et sensim cribratū, in aliud vas transfundunt, relicto harenoso quod pessum ierat. Rursus lapidosa fidere patiuntur, & in vās aliud excolant. Hoc identidem faciūt, donec cinis merus & harenæ expers inueniatur. Alij paulatim integrā in aqua respergunt, arbitrati arenas lapillosq; suo pondusculo degrauatos, pessum ire. Pilos autem & paleas leuitate sua in sublime attolli. Cæterum cinerem medium separant & in pillā coniectum vt cadmiam eluunt. Quinetiam lauatur vino chio marina aqua diluto, modis quos supra diximus. Et ita redditur adstringētior, q̄ aquis elota. Vis Pompholygis adstringere, refrigerare, explere, purgare, obstruere, & aliquantum exiccare. Inter medicamenta numeratur quæ sensim crustas obducunt. Quod si spodium torrere libet, diligenter tritam & irrigatam aqua, colliges in pastillos, fictiliq; nouo, subiectis leuibis prunis, orbiculos continuo versabis, dū afficati fuluescāt. Neq; ignorandū, ex auro, argēto, plumboq; fieri spodion. Verum post cypriam plumbea maxime commendatur.

De Antispodo. CAP. LXXVII.

Voniam Spodos sæpe numero desideratur, necesse est ostēdere, quæ simili virtute polleant, vt in spodij locum suffici possint, antispoda vocant, quoq; modo sumi debeāt. Folia itaq; myrti, cum floribus & baccis immaturis, in fictile crudum coniecta, inditoq; operculo cōtinua foramina habente vruntur fornacibus donec figlinum percoquatur. Iterum in fictile aliud crudum transferuntur, quod vbi perassatum fuerit, exempta lauantur ad vsus. Idem quoq;

DE MEDICINALI MATERIA

fit e termitē sylueſtris oliuæ, ſi habeatur, ſin ſecus, ſatiuæ cum ſuis flo-
ribus, aut malis cotoneis diſectis, & detractis offibus, aut gallis aut la-
ceratis linteolis. Item ex moris immaturis id eſt candidis, in ſole prius
arefactis, aut terebintho, aut lentisco, ænanthe, aut mollibus rubiſo-
lijs, vel e buxi coma, vel pseudocypero cum flore. Alij ficus in ſole an-
tea ſiccatas, eodem modo parant. Alij taurinum gluten. Alij ſuccidas
lanas aſperas, pice aut melle irrigatas. Quæ omnia in ſpondij vicem
uſurpantur.

De Aere viſto.

CAP. LXXVIII.

Es viſtū probatur rubrum, quod contritu colore Ciannaba-
a rim imitetur. Nigrum vero pluſq̃ deceat, exuſum eſt. Fit autē
e clauis ſolutarum nauium, ſi ſtili crudo compoſitis, ſubſperſo
ſulphure cum ſale pari, omnibus viciffim inſparſis, ſi ſtile circūlito figu-
lari creta ſpiramento, fornacibus inditur, donec ſiglinum percoqua-
tur. Quidem pro ſulphure & ſale alumen inſpargunt. Alij ſine ſulphu-
re ac ſale ſiſtili, aliquot dies vrunt. Alij ſulphure ſolo vtuntur, ſuliginē
tamen excutiunt. Alij oblitos ſciſſili alumine clauos, cum ſulphure
et aceto, ſiſtili crudo cremant. Alij in ænea olla aceto reſperſos, vrunt,
& iterum aut tertio idem efficiunt, poſtea recondunt. Principem locū
tenet, in memphide combuſtum, proximū in cyp̃ro. Adſtringit, exic-
cat, reſprimit, extenuat, attrahit. Vl̃cera purgat, & ad cicatricem perdu-
cit. Vitia oculorum emendat. Excreſcentia in carne conſumit. Nom̃as
cohibet. Vomitus ciet, cum hydromelite potum, aut cum melle delin-
ctum, ſillitumve. Lauatur vt cadmia, mutata quater in die aqua, donec
nulla prorſus ſordes emergat. Aeris recrementum, ſtercuſve, quam ſco-
riam vocant, eodem modo lauatur & eandem vim ſed imbecillioſiorem
habet.

De Flore æris.

CAP. LXXIX.

Loſ æris quem nōnulli clauorum veterum pſegma, quaſi ra-
f mentū, nominarūt. Optimus eſt, friabilis, in attritu fulueſcēs,
milij effigie, breuis, ponderoſus, modice ſplendens, atq; con-
ſtringens, qui delimatam æris ſcobem nō recepit, quaſi æpe adultera-
tur. Sed id facile depræhēditur cum denti um illiſu, dilatantur ramēta.
Fit autem cum æs fornacibus fuſum, in receptacula delabitur, per cola
fiſtularum ad ea pertinentium. Circa eas enim occupati, ſordes expur-
gantes, aquam clariffimam infundunt, refrigerare volentes. Ita q; repē-
tino concretu, ac addenſatione, expuitur & ſcatet antedictus flos. Ad-
ſtringit & excreſcentia coerct. Offuſam oculis caliginem emendat,
ſed magnopere mordet. Quaternum obolorū pondere datus, craſſum
humorem extrahit. Carnoſa narium vitia abſumit. Eruptiones papu-

larum cum vino cohibet. Contra diuturnas aurium grauitates tritus, in eas per fistulam flatu impellitur. Vuam tonsillasq; reprimat, farina eius cum melle admota.

De Squamma æris. CAP. LXXX.

Quāma æris excussa clauis, cyprio ære fabricatis, crassa quidē ipsa. Bona est quæ helitis nominatur. Sed ex malo ære aut cādido, vitiosa intelligitur. Quam utpote tenuem & inuolidam dānamus, maxime approbantes crassam, ruffam, præsertim si acetū resperfu rubiginem cōtrahat. Vim habet adstrictoriam, extenuātem, reprimentem, & erodentem. Nomas coercet. Vlcera ad cicatricem perducit. Pota ex aqua mulsa aquam trahit. Aliqui farina subactam, dant in catapotio. Additur ad oculorum medicamenta. Genarum scabritiā absumit, & fluxiones exiccat. Lauatur hoc modo. Sicca æris squammæ expurgatæ selibra, cum nitida aqua in mortario manu diligenter conturbatur, quousq; pessum ierit. Abijcitur quod emerit, et effusa aqua, hæmina cœlestis himbris adijcitur, & distenta manu, squamma quasi exiccāda sit, vehemēter cōfricatur. Dumq; lentorem emitte re cœperit, aqua sensim ad sex heminas vsq; superinfunditur, terendo valide. Squamma ad latus mortarij colligitur, ibiq; apprimitur. Quo facto, expressus humor pixide ex ære rubro facta, excipitur. Hoc est enim velut flos squammæ, valēs viribus, & ad ocularia medicamēta cū primis efficax. Inutile quod superest. Lauatur donec nullam prorsus lenticiam excernat, & linteo opertum biduo conuiescere finitur effusaq; extante aqua, ubi ficcātū erit, reconditur pixidicula. Alij ut cadium lauant, & reponunt.

De Squamma ex acie decussa. CAP. LXXXI.

Squammæ ex acie aut mucronibus decussæ quam vocant stomoma eadem vis. Lauatur modo simili, & reconditur. Sed ad moliendam alui deiectionem, inefficacior est.

De Erugine rasa. CAP. LXXXII.

Erugo rasa fit ijs modis. Super doliolum, aut aliud confimile vas acetū q̄acerrimi, æneum vas præsertim concameratum sin minus planum versetur, sitq; exterius, nullūq; habeat spiramentū. Exempto vase quo doliolum obturaueris, decimo quoq; die, infidēs ærugo deraditur. Aut æris lamina in caddis super acetū ita suspenditur, ne attingat, et totidem post dies raditur. Aut massulæ æris aut laminæ, vinaceis iam accrescentibus cōduntur, & simili modo versantur. Quinetiam ex delimata æris scobe æruginē facere licet. Nec non e laminis, quibus bractæ auri conclusæ maleo ducuntur. Si quis eas aceto respargat, & ter aut quater verset, donec æruginē contrahāt.

DE MEDICINALI MATERIA

Tradunt æruginē in cyprijs metallis gigni, lapidibus quibusdam nō nihil æris habentibus, quibus ærugo efflorescit. Adduntq; nonnumq; per caniculā æstus, e quodā specu manare. Sed hoc exiguū, & optimū esse, illud speluncis effluens, copiosū quidē, & boni coloris, sed vitiosum, quod lapides multos collegerit. Pluribus autē modis adulterant. Aliqui pumice, alij marmore, alij attramēto futorio. Sed depræhēdēmus pumicē aut marmor, pollice sinistra manus madefacto, & æruginis portiunculā in alterū atterente. Siquidē eā diffundi constat. Marmoris autem pumicisq; partes, coeunt non dissipatæ, demumq; tractatione crebra & humoris complexu dealbescunt. Quin & dentium appressu, Siquidem syncæra cedit, levis, sine asperitate. Attramētum vero futoriū igne coarguitur. Namq; si fictile, aut lamina, adulterata æruginē illinatur, etferuenti cinere aut carbonibus incalescat, mutabit colorem. Attramentum futorium rubescit, quod vstum suapte natura talem fortitur colorem.

De Aerugine scolecia. CAP. LXXXIII.

Eruginis quā vocant scoleciam, duo sunt genera. Quædam fossilis est, Altera facticia. In mortario cyprijaris dimidiam heminā aceti albi acrisq; pistillo cupreo conterito, donec strigmenti crassitudinem imitetur. Deinde aluminis rotundi, salis fossitij, translucentis, aut marini q̄albissimi, solidiq; drachmam vnam, aut certe cum nitri pari pondere terito in sole, æstuosissimis diebus, sub sidus caniculæ, donec colore æruginēum, & coagmēto strigmentosum fiat. Vbi autem se in vermiculorū speciem contraxerit, recondito. Efficax & boni coloris redditur, si duas parteis vrinæ veteris, cum vna aceti adieceris, & alia quæ dicta sunt peregeris. Sunt qui æruginē rasile, quæ in apparatu non respondit, gummi misto digerant in formas, & ita vendant. Quod genus, vt vitiosum improbatur. Fit & quædā ærugo ab aurificibus, mortario & pistillo cyprijaris, cum vrina pueri impubis, qua aurū ferrumināt. Antedicta æruginū genera, vsto ari correspondent. Sed magis effectu valent. Sciendum fossilem scoleciam præstantissimam esse. Derasam sequi, postremo loco facticiam. Mordacissima tamen est & magis adstringens. Aurificum autē ærugo rasæ correspondet. Aerugines omnes adstringunt, extenuant, excalfaciunt. Oculorū cicatrices emendant. Lachrymas cient. Nomas sistunt. Vulnura ab inflammatione tuentur. Vlcera ex oleo cæraq; ad cicatricem perducunt. Callos & sordida vlcera purgant, cum melle coctæ. Callum fistularū erodunt, cum ammoniaco, collyrij modo in eas adaptæ. Ad gingivarum autem excrementas, & extuberationem vtilis. Magnopere extenuant genarum crassitiem, cum melle illitæ. Verum post illitionē spon-

gia ex aqua calida locus fouendus est. Resina terebinthina excepta cū
 are & nitro lepras abigunt. Vritur particulatim fracta, in fidili patina,
 flagrantibus prunis superposita. Versaturq; donec se mutet, & colore
 subcinerefcet. Postea refrigerata reponitur. Sunt qui cruda olla eam
 vrant, vti dictum est, sed non prorsus eundem colorem cremata con-
 trahit.

De Rubigine ferri. CAP. LXXXIIII.

Ubrigo ferri restringit. Sistit fœminarum profluvia admota.
 Potuq; præstat ne concipiant. Illita ex aceto ignibus sacris,
 & papularum eruptionibus, medetur. Perquam utilis ad sca-
 bricias genarum, paronychia digitorum, & reduuias. Condyloma-
 tis prodest. Gingiuas firmat. Podagras illita lenit. Alopecias replet.
 Vinum aquave, in qua candēs ferrum sit restinctum, potu cœliacis, dy-
 sentericis, lienosis, cholera laborantibus, & dissolutis stomacho auxi-
 liatur.

De Stercore ferri. CAP. LXXXV.

Tercus ferri quam scoriam vocant, eadem potest quæ rubi-
 go, sed inefficacius. Aconito ex hydromelite potum opitula-
 tur.

De Plumbo eloto. CAP. LXXXVI.

Otura plumbi sic fit, in mortarium plumbeum aquam injici-
 ens, pistillo plūbeo terito, donec nigrescat aqua, & succi mo-
 do crassefcet, aut cœnosa reddatur. Linteolo deinde colato,
 aquam infundens, quo facilius quidquid est resolutum incerni possit.
 Hoc facito vsq; dum satis habuisse videaris. Vbi confederit, priorem
 aquam effundens, nouamq; adijciens, vt cadmiam lauato, donec
 nulla extet nigricia. Postea in pastillos cogens reponito. Quidam sco-
 bem mundi plumbi lima quæsitam, mortario lapideo pistilloq; terunt,
 aut manibus cum aqua paulatim adiecta fricāt, donec nigrescat. Mox
 vbi crassamentum pessum ierit, colligunt in pastillos. Nam tritum ve-
 hemēter, cerusæ simile redditur. Alij elinata scobi modicam plumba-
 ginem adijciunt. Affirmantes ita elotum plumbum præstantius esse.
 Potest refrigerare, adstringere, obstruere, mollire, explere caua. Sistere
 oculorum fluxiones, & vlcerum excrementia. Sanguinem suppressit.
 Prodest contra sedis vlcera, condylomata, & hæmorrhoidas ex rosa-
 ceo. Item ad ea quæ ægre cicatrice ducunt. Et in totum spodij effectus
 præbet. Nisi q; non obducit crustas. Integrum plumbum affricu, ma-
 rini scorpionis draconisq; plagis auxiliatur.

r. j.

DE MEDICINALI MATERIA

De Plumbo vsto. CAP. LXXXVII.

v Ritur Plumbum sic. Super q̄tenuissimas plumbi laminas, fictili nouo inditas, sulphur inspargito, additisq̄ rursus laminis, interiecto semper sulphure, vsq̄ dum vas expleueris, succendito. Flagrante autem plumbo, ferrea rude versato, donec perfecte redigatur in cinerem, nihilq̄ non vstum hæserit. Tum demum obstru-ctis naribus, eximito. Alioquin halitus plumbi noxius sentitur. Aut climatam scobem in olla cum sulphure vrito. Alij laminas in fictili crudo, vt dictum est, imponunt fornaci, aut foco, et circumlinentes operculum, dato exili spiramēto vrunt. Alij pro sulphure cerusam aut hordeum inspargunt. Alij integras laminas imponentes, acri igne vtuntur, & rudicula ferrea cōtinue mouent, dum in cinerem soluantur. Sed difficilis huiusmodi vstio. et si vehementius vratur, contrahit spumæ argenti colorem. Magis placet nobis prima. Plumbum vstum lauatur vt cadmia, & reconditur. Eisdem effectus habet, quos plumbum elotum sed multo acriores.

De Recremento plumbi. CAP. LXXXVIII.

r Ecrementum plumbi quod scoriam vocant, optimum est desum, fractu cōtumax, cerusam plane repræsentans, nihil plumbosi habēs, quod ad mali colorem accedit, & vitri splendorem imitatur. Eadem quæ plumbum exustum potest, sed magis adstringit. Lauatur in mortarijs iufusa aqua, & refusa summa aquæ parte, quæ luteum colorem duxit. Idq̄ sæpius, dum recrementum absumatur. Dein quod subsidit crassamentum, aqua effusa, digeritur in pastillos.

De Molibdoide lapide. CAP. LXXXIX.

m Olibdoides lapis a plumbi similitudine dictus. Correspondentem recremento vim habet, & eodem modo lauatur.

De Stibio. CAP. XC.

f Timmi optimum quod splendidissimum est, modoq̄ nitedularum emicat, contractu crustosum, nihil terræ aut sordidi habens, friabile, quod stibi appellarūt, alij platyophthalmon, alij Larbason, alij Gynæcion, alij Chalcedonion. Vis eius adstringere, obstruere, refrigerare, excrementa in carne cohibere, vlcera ad cicatricem perducere, sordes & vlcera oculorū expurgare. Sistit & sanguinem cerebri membrana profluentem. Et vt in vniuersum dicatur, vis vsto plumbo similis est. Priuatim ambusta igni, in crustas erūpere non patitur, cum adipe recenti illitum. Crustosas exulcerationes ad cicatricem perducit, cum cæra & exigua cerusa. Torretur adipe circumlitum &

carbonibus obrutum donec carbunculetur adeps. Exemptumq; res-
stinguitur mulieris lacte, quæ marem peperit, aut vetere vino. Vritur
etiã carbonibus succensis efflatum, quoad flagret. Si enim paulo ma-
gis concremetur, plumbum fit. Lauatur vt cadmia & æs. Sunt qui vt
plumbi recrementum eluant.

De molibdæna seu plumbagine. CAP. XCXI.

Olibdæna optima est flaua, argenteæ spumæ æmula, modice
splendens, cum teritur ruffa. Cocta cum oleo iocineris colo-
rem trahit. Vitiosa est, quæ aerem aut colorem plumbeum re-
fert. Gignitur ex auro & argento. Est etiam quædam fossilis, iuxta se-
bathiã & corycum inuenta. Quo in genere probatur quæ lapidosa nō
fit, aut recrementosa, sed nitens & flaua. Vim habet spumæ argenti, aut
recremento plumbi similem. Vritur lauaturq; eodem modo. Miscetur
conuenientissime medicamentis, quæ liparas vocant, atq; emplastris
minime mordentibus. Carnem recreat, & vlcera ad cicatricem perdu-
cit. Glutinantibus tamen medicamentis, aut abstergentibus non con-
uenit.

De Recremento argenti. CAP. XCII.

Recrementum argenti quod scoriam vocant, aut helcysma, aut
encauma, molibdæna vim habet. Quare emplastris quæ phæ-
as appellant, additur, ac medicamentis quæ cicatricem obdu-
cunt, vt pote cum adstringat, extrahatq;.

De Spuma argenti. CAP. XCIII.

Spuma argenti quædam gignitur ex harena, quam molibditin
vocant in fornacibus conflata, donec perfecte incandescat.
Altera ex argēto. Tertia ex plumbo. Probatissima est attica.
Secunda hispaniensis. Has sequitur quæ fit dicæarchiæ id est puteolis,
baijs, in campania, & Sicilia. Plurima enim hijsce locis e flagrantibus
laminis plumbeis gignitur. Quæ flauo colore splendet, chryfitis ap-
pellatur, melior cæteris. Quæ in Sicilia, argyritis. Quæ ex argento, ca-
labritis. Vis autem adstringere, mollire, explere caua, excrescentia in
carne reprimere, ad cicatricē ducere, refrigerare, & occludere. Vritur ar-
geti spuma, cōfractis partibus ad magnitudinē iuglādii, ita accēsa fol-
libus. Abstergitur inlidēs spurcicia, & recōditur. Aliqui quater aceto
aut vino restiguētes, iterū vrūt & eadē prosequuti, reponunt. Lauatur
vt cadmia. Vt argyritidi nominatæ, aut si desideretur, alteri candor de-
tur, ea in parteis magnitudine fabarū cōfracta, chœnicis atticæ mēsurā,
r. ij.

DE MEDICINALI MATERIA

fictili nouo superfusa aqua, adiectis candidi tritici quattuor sextarijs,
 priuatimq; pugillo hordei, linteolo raro auribus vasis alligato, coqui-
 tur, donec hordeum fractum dehiscat. Deinde omnia in nouum crates
 rem oris ampli transfunduntur. Triticum abijcitur. Spuma argenti
 vehemēter manibus affricando, aqua lauatur, assiccataq; in thebaico
 mortario teritur, affusa feruēte aqua. donec dissoluatur. Excolata aqua,
 iterum tota die teritur, & vespere infusa calida aqua finitur. Mane co-
 lis excernitur. Alia infunditur atq; ter die excolatur. Id septē diebus
 fieri solet. Postea additis ad singulas minas spumæ argenti, quinis sa-
 lis fossilis drachmis, infusaq; calida aqua, ter in die teritur, & addita
 aqua excolatur. Cumq; in albuērit, calida infunditur, dum nullā pror-
 fus falsedinem respiciat. Demum ardentissimo sole siccata, eiecto prius
 humore, reconditur. Sin minus, mina spumæ argyritidis diligenter te-
 ritur, addito sale fossili trito, triplicato pondere, in fictile nouum con-
 ijcitur. Aqua infunditur ita vt superemineat. Mouetur quotidie ma-
 ne et vespere, aquaq; superinfunditur, priore nequaquā effusa. Hoc fit trigē-
 ta diebus. Nāq; nisi moueatur crassescit, vsq; induriciē testæ. Post hæc
 effusa leniter muria, in thebaico mortario spuma argenti teritur, conie-
 ctāq; in fictile aquam continens, manibus diligenter agitur, mutata
 subinde aqua, donec nullum falsedinis inditiū præbeat. Deinde quod
 ex argenti spuma candidum apparet, in vas aliud transfertur, & reda-
 ctum in pastillos, plumbea pixide conditur. Alij spumam argenti in
 fabarum magnitudines contractam, in ventre suo illo crudo ex aqua co-
 quunt, dum viscus eliquescat, exemptamq; cum sale pari terunt, & vt su-
 pra dictum est lauant. Sunt qui salis libram vnā, & spumæ argenti
 tantundem, in sole terant, aqua continue mutata, dum candor ei detur.
 Alia ratio: Sumito quantamuis argenti spumā, vbi lana candida in-
 uolueris, fictili nouo indita aqua, cum pugillo fabarum recentium re-
 purgatarūq; decoquito. Cumq; fabæ disruptæ fuerint, lanaq; dealbue-
 rit, exemptam argenti spumam, & altera lana inuolutam, iterum coqui-
 to. cyathum aquæ & parem fabarum modum adiiciens. Eadem tertio
 quæ supra, facito. In summa tantisper, dum lana iam non inficiatur. In
 super transfundens in mortarium, ad singulas salis fossicij libras, adijci-
 to octogenas spumæ argenti drachmas atticas, & terito, intermittensq;
 nitri q̄albissimi cum aqua diuisi, drachmas, xlvij, indito. Iterum te-
 rito, donec satis candoris contraxisse videatur. Ita autem fundēs eam
 ex alto in fictile oris āpli, adiecta largiore aqua, vbi cōsidere defuerit, co-
 lato. Vicissim eadē proseguere, dū pura aqua dulcisq; effluat, & nullam
 falsedinem præseferat. Postremo in fictile nouum translata, cola-
 to sensim omni humore, soli quadraginta diebus, sub caniculæ fidus

LIBER QVINTVS.

131

exponito, & siccata vtitur. Elotam autem constat ad oculorum collyria prodesse, & ad cicatricum fœditates tollendas, ad rugosas facies, & cicatricosas, laceratasq; et macularum plenas.

De Cerusa.

CAP. XCIII.

Erusa fit hoc modo, infuso in vrsuum oris lati aut fistile label
 c lum q̄acerrimo aceto, laminam plumbeam supra fistilis spiraculum, subiecta prius arundinea tegete, firmato, superie
 risq; velaminibus, ne halitum expiret acetum, vbi resoluta fuerit, de
 fluēsq; deciderit, humorem purum ad summa delatum colato. Crassa
 mentumq; transfundito. Debet quoq; siccari in sole, mox trusatili mola
 teri, alioquin tritum cribrari. Postea quod superest duri, in tenues par
 tes redigendum, cribrandumq;. Vicissim eadem tertio quartoq; fa
 cienda. Melior quæ primo cribrata est, & medicamentis oculorum as
 sumenda. Secundum locum tenet sequens, & reliquæ suo ordine. Nec
 defunt qui ligneam rudem, in medio vase appendant, & supra cratem
 plumbū imponant, ita vt acetū nō contingat, inditoq; operculo circū
 linentes dimittunt. Post dies aliquot, laxato obturamēto visunt. Cūq;
 resoluta materia fuerit, reliqua vt supra diximus exequuntur. Si autem
 quis in pastillos velit digerere, aceto acri subacta diuiditur, in pastillos
 qui in sole siccantur. Aestate tamē supradictū opus obeūdū est. Ita enī
 cādida atq; efficax redditur. Quinetiā hyeme paratur, vrsis supra fur
 nos, balnea, aut fornaces impositis. Ascendens enī calor, idē quod sol
 præstat. Laudatissimam fieri putāt rhodi, & corinthei, aut lacedemone.
 Proximā puteolis. Torretur hoc modo. Flagrantibus igni carboni
 bus, fistili nouo maxime attico, trita cerusā iponito, & assidue versato.
 Cūq; cinereū colorē traxit, eximens refrigerato, & vtitur. Est & aliud
 vrendi genus. Trita patinis supra prunas imponitur, & ferulacea ru
 de mouetur, donec similis sādarachæ fiat. Extractaq; ad vsus ministra
 tur. Quæ vero ita parata est, sandyx a quibusdam dicitur. Lauatur ce
 rusa cadmiæ modo. Vis ei adstringere occludere, emollire & explere.
 Insuper excrementa reprimere, & ad cicatricem perducere. Miscetur
 cæratīs & emplastris quæ liparæ vocantur, pastillisq;. Est autem leta
 lis eius potus.

De Chrysocolla.

CAP.

XCIV.

Chrysocolla laudatissima Armeniaca, colorem porri q̄ simil
 c lime reddens. Secundum locum sibi vendicat macedonica
 & proximum cypria. Quo in genere præfertur pura. Damna
 tur quæ terram aut calculos collegerit. Ratio lauandi hæc est. Tusam
 infusa aqua, mortario expassa manu ad pilam vehementer fricato,
 r. iij.

DE MEDICINALI MATERIA

& statim q̄ confederit colato. Alteram infundens aquam, rursus teri-
to. Hæc vicissim prosequere, donec pura syncæraq̄ spectetur. Dein
ficcato in sole, & ad vsus recondito. Quod si vrere volueris, ex ea tes-
rēs quod satis esse videbitur, patinis supra carbones adponito, & alia
facito quæ supra diximus. Dos chrysocollæ ad purgandas cicatrices.
Excrecentem carnem coercet. Adstringit, purgat, excalfacit, & modice
corpus mordendo exest. Inter medicamenta intelligitur, quæ vomiti-
ones concitant, & necem inferre possunt.

De Armenio lapide. CAP. XCVI.

a Rmenius lapis præfertur læuis, colore cæruleo, perq̄ aquas
bilis, calculo carens, & friabilis. Eadem quæ chrysocolla
præstat, sed inefficacius. Quinetiam vsus habet ad pillos in
palpebris alendos.

De Cæruleo. CAP. XCVII.

c Aerulei origo ex ærarijs metallis in cypro. Copiosius ex ha-
rena littorali, secundū quosdam sub cautos specus maris in-
uenitur, quod magis probatur. Eligi debet merum. Vritur
vt chalcitis. Lauatur vt cadmia. Vim habet reprimentem & modice
erodentem. Crustas gignit, & exulcerat.

De Indico. CAP. XCVIII.

i Ndici duo genera, vnum sua sponte nascitur, tanquam spu-
ma germinatione, indicis harūdinibus exiens. Alterum in
sectoriæ dant officinæ. Et est spuma purpurea innatans corti-
nis, quam detractam artifices siccant. Optimum existimatur, quod cæ-
rulei speciem præbet, succosum, & læue. Inter medicamenta est quæ ve-
lociter adstringunt, & inflammationes tumoresq̄ rumpunt. Purgat &
reprimat vlcera.

De Ochra. CAP. XCIX.

o Chram leuissimam, & vehementer luteam eligere oportet, me-
ram & aliena materia vacantem, non lapidosam, friabilem, na-
tione atticā. Vritur hæc, & lauatur cadmiæ modo. Vis eius
adstringere, erodere, collectiones & tubercula dissipare. Excrecentia
in carne reprimat. Caua cum cærato explet. Et articulorum tofos com-
minuit.

De Cinnabari. CPA. C.

h Allucinantur qui cinnabarin minio eandem esse existimāt.
Minium enim in hispanijs ex ladiqe quodam argentæ hære-
næ permisto, temperari solet. Alioqui nō dignoscitur. Fornaci-
bus autem in florentissimum flagrantissimumq̄ colorem permu-
tatur. In metallis vero strangulantes halitus eruat. Itaq̄ facies

incolæ vesicis obuelant, vt per illas speðent, nec respirando noxium aerem attrahant. Ea pictores ad sumptuosa parietum honestamēta vtūtur. Cinnabaris quæ ex Aphrica defertur, magno cōstat. Hactenus inuenitur, vt vix versicoloribus pictorū lineis satisficiat. Densū nec dilutum colorem reddit. Quare quidem sanguinem esse draconis existimauerūt. Vim habet cinnabaris hæmatitæ lapillo eandem, verum efficaciorē. Cōuenit ad oculorum medicamenta. Magis enim adstringit, & sanguinē cohibet. Ambustis igni, & papularum eruptionibus cærato excepta medetur.

De Argento viuo. CAP. CI.

Argentum viuū fit ex minio, quod abusiue cinnabaris dicitur. Patinis fistilibus, imposita ferrea concha cinnabarin continente, & calice cooperta, argilla superlita, carbonibus succendunt. Siquidem deterfa fuligo, quæ calici insidet, refrigerata in argentum viuū coit. Quinetiam inuenitur in argenti fodinarum reſtis, stillatim concretum. Alij per sese in metallis inueniri tradunt. Seruatur in vitreis, aut plumbeis, aut stagneis, aut argenteis vasis. Siquidem aliam materiam omnem exedit, & defluere facit. Potum vim perniciosam habet. Suo enim pondere interna exest. Remediū est lac multum, subinde potum, & vomitionibus reiectum, aut vinum cū absinthio, aut apij decoctum, aut semen ormini, aut origanum, vel hyssopum cum vino. Auri limata scobs, idest ramētum q̄tenuissimum eorum, mirabili est auxilio.

De Rubrica seu minio sinopico. CAP. CII.

Inium sinopicum maxime probatur graue, densum, ad iocineris imaginē vergens, calculorū expers, cōcolor, in resolutione succosum. Effoditur in capadocia speluncis quibusdā, expurgatumq; defertur in sinopen urbem, in qua vānditur. Vnde cognomentum accēpit. Vim habet exiccatoriam, quasi inducendo obstruentem, & adstrictoriam. Quapropter vulnerarijs emplastris, & pastillis exiccantibus, & adstrictorijs commisceri solet. Aluum fistit, in ouo sumptum, aut clystere infusum. Datur iocineris vitio laborantibus.

De Rubrica fabrilī. CAP. CIII.

Rubrica fabrilis, ad omnia sinopide inferior est. Optima ægyptia. & cartaginensis, lapidum expers, friabilis. Gignitur in Iberia quæ ad occidentem speðat, ochra exusta, & degenerāte in rubricam.

r. iij.

DE MEDICINALI MATERIA

De Lemnia terra. CAP. CIIII.

Lemnia terra, cuniculoso in specu nata e Lemno insula, palus-
tri loco defertur, inibi electa, & caprino sanguini permista.
Quam incolæ cogunt in pastillos, & imagine capræ signant.
Vnde & sphragida appellauere. Vim antidoti habet, contra pernicio-
sa venena singularem. Pota cum vino & præsumpta euomi venena
cogit. Contra idus morsusq; animalium, quæ exitiale virus eiaculan-
tur, prodest. Antidotis familiaris. Sunt qui hac ad sacrificia vtantur.
Est & dysenteria vtilis.

De Attramento futorio. CAP. CV.

Attrementum futorium genere quidem vnum & idem est, molle
& concretum. Sed in specie differentias treis habet. Vnum
namq; humoribus stillatim in cuniculos quosdam colatis, cō-
crescit. Quare ab ijs qui cypria metalla perficiunt, stalaðis appellatur.
Petesius ipsum pinarion vocat, alij stalaðicon idest stillaticium, alij
peðon, Ephthon, Araðon, Lonchoton. Alterum simplici ratione fit
in speluncis. Postea transfusum in excavatos scrobes, concrementum
capessit. Quod peðon, id est concreticium, proprie nominatur. Ter-
tium dicitur coctile, & in hispania fieri solet. Sed inutile, ac inualidissi-
mum esse constat. Ratio paradi hæc est. Aqua madefactum decoquit,
mox in piscinas trāsfundunt, & residere patiuntur. Hoc certis diebus
coalescit, in complureis formulas digestum, tesserarum speciem reddē-
tes, quæ racematim inter se cohærescunt. Optimum esse creditur, cæ-
ruleum, graue, concretum, trāslucens. Cuiusmodi stillaticium est. Ab
alijs lonchoton nominatum. Proximum concreticium. Coctile vero
ad insectus & denigrationes, aptius cæteris esse cōpertum est. Sed ad
medicinæ vsum inualidius esse, experimenta docent. Valet adstringe-
re, calfacere, & crustas inducere. Latas ventris tineas necat, drachmæ
pondere deuoratum, aut cū melle linðū. Vomitus ciet. Aduersus hau-
sta fungorum venena, ex aqua potum auxiliatur. Purgat caput aqua di-
lutum, & in vellere naribus instillatum. Vritur vt paulopost in men-
tione chalcitis ostendemus.

De Chalcite. CAP. CVI.

Chalcitis præfertur similis æri, friabilis, nec lapidosa, nec inue-
terata, intercurrentibus oblongis venis, splēdētibusq;. Huic
abstersoria vis inest, excalfaciens, & crustas vlceribus obdu-
cens. Purgat quæ oculis & eorundem angulis hærent. Ad ignem sa-
crum, & vlcera quæ serpunt, efficax est. Sanguinem e vulua & naribus
erumpentem, cum succo porri sistit. Carunculam gingiuis enatam, de-
pascencia vlcera, tonfillasq; eius farina compescit. Vsta & cū melle tri-

ta, oculorum medicamentis longe vtilior redditur, Callū genarum & scabriciam absumit, abstergetq̃. Fistulas tollit collyrij modo, in eas adaſta.

De Pſorico.

CAP.

CVII.

It ex ea medicamentum quod pſoricon vocant, duabus chalcitis partibus, cum vna cadmiæ additis, & ex aceto tritis.

Oportet autem in fiſtili, obruere fimo, diebus quadraginta per caniculæ ardores, ſic enim fit acrius. Idem quod chalcitis poteſt. Alij pares vtriuſq̃ portiones in vino terunt. Vritur chalcitis fiſtili nouo, viuſ carbonibus ſuperpoſito. Modus autē vſtionis in humidioribus, eſt dum ipſa chalcitis bullas excitare deſierit, & perfecte inſaruerit. In reliquis vero dum mutata in floridum colorem fuerit, & ſanguineum aut miniatum colorem contraxerit. Tum demū eximenda eſt. In ſidens autē ſpurcicia ſtatu expellenda. Mox reponēda. Torretur etiā nū perſtatis carbonibus, vſq̃ dū luteo colore paleſcat. Aut fiſtili ſubditis candentibus prunis, ſubinde verſata, donec conflagret & colorem mutet.

De Miſy.

CAP.

CVIII.

Iſy aſſumendum natione cyprium, auri ſimile, durum, quod friando auri colorem imitatur, & ſtellæ modo ſplendet. Vim habet & vſtionem cum chalcitide eandem, citra pſorici compositionem, exceſſu deſectuq̃ differēs. Aegyptium autem cæteris præſtat, vt pote quod efficacius habeatur. Sed ad ocularia medicamenta multo ſupradictō inferius.

De Melanteria.

CAP.

CIX.

Elanteria geminæ eſt originis, quædam in faucibus cuniculorum quibus æs eruitur, ſalis modo concreſcit. Alia vero in ſumma facie ſupradictorū locorū coit, quæ terrena eſt. Quin etiam inuenitur in Cilicia, & alijs quibuſdā regionibus, ſoſſilis quædam. Præſtat quæ ſulphuris colorem trahit, læuis, pura, æquabilis & quæ cōtactu aquæ conſeſſim nigreſcit. Vim caſticam obtinet miſy ſimilem.

De Sory.

CAP.

CX.

Ory exiſtimarūt aliqui melanteriā eſſe, aberrātes. Siquidem ſui generis eſt ſory, ei nō abſimile. Verū ſory virus ineſt graue, & nauſeā mouens. Inuenitur etiam in ægypto, & alijs quibuſdā regionibus, vt in libya, hiſpania, & cyp̃o. Præfertur ægyptiū quodq̃ frianti nigrius apparet, ſpōgioſum, ſuppingue, inſuper adſtringens, & olſactu deuorationeq̃, magnum virus olens, ita vt ſtomachus in vomitiones effundatur. Quod autem friatum ſcintillas, miſyos mo

DE MEDICINALI MATERIA

do non emittit, & alterius generis esse, & inualidū censendum est. Vim & vstionem supradictis similem habet. Dolori dentium, cauernis inditum medetur. Labantes firmat dentes. Ischiadicis ex vino infusum auxiliatur. Illitum cum aqua varos extinguit. Medicamentis ammiscetur, quæ capillos denigrant. Hæc autem fere omnia quæ vstionem experta non sunt, perustis validiora esse existimantur, præter salem & vini fecem, nitrum, calcem, & confimilia, quæ cruda remissiora sunt. Cōbusta enim viribus efficaciora redduntur.

De Diphryge.

CAP.

CXI.

d Iphrygis tria genera esse creduntur. Quoddam enim metallum cum est, quod in cypro sola gignitur. Lutosum namq; deferatur, ex luto cuiusdam inibi regionis, postea delatum, sole siccatur, mox circūpositis sarmentis vritur. Diphryges ideo vocatū est, q̃ & a sole & a sarmentis vratur, arefcat, & ferme torreatur. Alterum perfecti æris, quasi subsidens fex est. Siquidem post frigida aquæ offusionem, vt supra retulimus, cum de flore æris differeremus, sublato ære fornacum ima parte cohærens id genus inuenitur, & adstrictionem & gustum æris habens. Tertium sic fit. Lapidem pyriten vt calcem cremant, in camini aliquot diebus, cumq; colorem rubricæ contraxerit, eximentes recondunt. Quidam tradunt ex sola materia lapidem æris gignēte fieri, quoties in dictis areis assata & in scrobes trāslata peruratur. Tunc enim ambientem scrobis locum compræhendit, & exemptis lapidibus æquale nihil inuenitur. Præfertur quod saporem æris reddit, rubiginosum, adstringens, & linguam vehemēter exiccans. Quod sibi exusta ochra nō vēdicat, quæ cremata diphrygis vice vānit. Vis eius adstringere, perpurpare, excrementia consumere, vlcera serpentia & quæ cacoethe vocant, ad cicatricem perducere. Suppurationes terebinthina aut cærato exceptum discutit.

De Auripigmento.

CAP.

CXII.

a Vripigmentum in eisdem metallis, quibus sandaracha, gignitur. Optimum existimatur crustosum, aureo colore micans, nulli materiæ permistum, fissile. Quale mysiæ & helespontō nascitur. Huius duo genera fluxerunt. Vnum supradictum est. Alterum glandis effigie, pallidum, & colore sandaracham imitans, glebosum. Ex ponto & cappadocia defertur. Secundum locum tener, has naustum dotes. Torretur in testa noua viuus carbonibus subiectis. Assiduusq; versatur, donec igne flagret, & mutet colorem. Deinde refrigeratum, tritumq; reconditur. Vim habet adstrictoriam & erodētem. Cruas cum vehemēti punitione excitat. Reprimit quæ excrecunt, & capillos euellit.

LIBER QVINTVS

De Sandaracha.

CAP.

CXIII.

f Andaracha probatur ruffa, & aliena materia vacans, friabilis, cinnabaris colore, sulphuris virus redolens, Dos eadem & vftio, quæ auripigmento. Explet alopecias, refina excepta, Scabros vngues eximit. Contra phthiriasin ex aceto efficax est. Tubercula cum adipe discutit. Prodest ad narium orisq; vlcera, & cæteras papularū eruptiones cum rosaceo. Item condylo mata. Datur ex mulso purulenta extussientibus. Suffitur quoq; cū refina, aduersus veterem tussim, rapto per fistulam nidore. Vocem expedit, cū melle delicta. Suspiriosis cum refina in catapotio, optime datur.

De Alumine.

CAP.

CXIII.

o Mne aluminis genus fere in ægypto, & eisdē metallis inuenitur. Est enim, scissile quoddam, quasi flos sudorve eiectionis terræ. Gignitur & in alijs quibuscūq; locis, in melo, in macedonia, in Liparis, Sardonis, Hierapoli Phrygiæ, Aphrica, Armenia, & plerisq; alijs regionibus, rubricæ modo. Plurimæ eius species, verū ad medendi vsum, scissile, rotundum & liquidum expetuntur. Optimū est scissile, præsertim recens, candidissimum, gustu perq; adstringens. Calculorum expers, nec glebulose aut assulose compactū, sed figillatim in capillamenta quædam canescentia dehiscens. Quale est quod trichitis, quasi capillare nominatur, in ægypto natum. Reperitur quoq; lapis huic alumini persimilis, qui gustus iudicio dignoscitur, qd nō adstringat. Damnatur in rotundi genere, quod manu cōfictum est. Sed ex figura depræhenditur. Assumendum autem suapte natura rotundum, bullis turgens, albo proprius, atq; validius adstringēs. Præterea non nihil paloris cū quadam pinguedine præseferens, sine harenis, friabile, natione ægyptium, aut ex insula melo. Liquidī probatio, vt sit lymphidū, lacteum, æquale, & semper succo madēs, sine lapidibus, atq; quædam caloris igniculum expirans. Vim habent excalfaciendi, stringendi, sanandi, & expurgandi, quæ caliginem pupillis oculorū offundūt. Genarum carnem, cæterasq; excrescentias extenuant. Scissile rotundo efficacius intelligitur. Vri & torrerī chalcitidis modo debēt. Putrescentia vlcera compescunt. Sanguinis fluxiones inhibēt. Gingiuas humore prægnantes comprimunt. Motus dentium cum aceto & melle firmant. Prosunt cum melle vlceribus oris, eruptionibus papularum, & fluxionibus aurium, cum sanguinalis hærbæ succo. Lepris conueniūt cum brassicæ folijs aut melle cocta. Item pruritui & vnguim scabrics, pterigijs & pernionibus, aspersa cum aqua. Valent cum aceto, fæce & galla, pari pondere cremata, ad phagedænas vlcerum, & cū salis duabus partibus, ad vitia quæ pascunt. Furfures cum eruo & pice

DE MEDICINALI MATERIA

illita abstergunt. Ad lentes, pediculos, ambusta, cum aquæ illita auxilio sunt. Contra tumores, & graue alarum inguinumq; virus, illiniuntur. Ex melo autem aduectum mulieribus præstat ne concipiant, ante coitum ori vuluæ inditum. Partus quoq; extrahit. Gingiuus si caro excreuit, vuæ, ac tonsillis, accommodantur. Auribus et verendis cū melle illinitur.

De Sulphure. CAP. CXV.

Sulphur optimum existimatur viuum, quod apyroni vocāt, nitedulæ modo splendidum, perlucens, minime lapidosum. Probatum in genere sulphuris ignē nō experti, quod virescit, ac præpingue spectatur. Plurimū in melo & lipara gignitur. Supradictū sulphur calcit, discutit, & celeriter concoquit. Prodest tussibus, suspuriosis, purulenta extussientibus, in ouo sumptum, aut suffitum. Præterea partus, vti nidore extrahit. Lichenas, scabros vngues, cum resina terebinthina mistū, aufert. Cū aceto autē, illitū ad lepras efficax est. Vitiliginis tollit. Scorpionis ictibus addita resina medetur. Cū aceto vero, draconis marini scorpionisq; plagas sanat. Pruritus toto corpore erūpentes, cū nitro deteritū sedat. Regiū morbū emēdat, in paritū fronti cochlearis mēsurā, aut in sorbili ouo sumptū. Facit ad grauedinē, & destillationes. Sudores quoq; cōspersum inhibet. Podagricis cū aqua et nitro illitū, conducit. Grauitatē auditus, suffiti nidore raptim per fistulam hausto, sanat. Lethargicos suffitu excitat. Eumpentem vnde cunq; sanguinem sistit. Fractis auribus cum vino & myrrha illitum medetur.

De Pumice. CAP. CXVI.

Pumicis probatio, vt magnopere leuis, spongiosus, teri facillius, nec harenosus, item fragilis, & cādīdus. Crematur flagrantissimis carbonibus obrutus, & vbi canduerint, extractus, vbi nō restringitur odorato. Iterūq; incensus extinguitur, & tertia vltione exemptus & per se refrigeratus, ad vsus conditur. Vis eius adstringere, gingiuas abstergere. Purgat cum calfactione, quæ caliginem pupillis offundunt. Explet vlcera & ad cicatricem perducit. Excrescentia cohibet. Fit ex farina eius dentifricium. Corpori crustam obducit. Auellendis capillis aptus. Theophrastus author est, si quisq; in bullientem vrsēum vini pumicem iniecerit, feruorem statim sedari.

De Sale. CAP. CXVII.

Alfossilis efficacior est, cōmuniter si est candidus, calculis vacans, & perspicuus, densus, æquali compage. Peculiariter ammoniacū genere laudatur, si modo findi facile possit, rectisq; segminibus diduci. In marino sale eligendus est candidus, æqualis,

Probatissimus in cypro fit & salamine cypri, & megaris, in Sicilia & Africa. Sed inter dicta salis genera lacustris præfertur, sed multo validissimus est phrygius, noie tapeus aut tritaus aut gantaus. Salis natura. In cōmune perq̃ utilis est. Adstringit, absterget, expurgat, dissipat, reprimat, extenuat, & crustas inducit. Sed hoc interest, q̃ alius alio sit præstator. Quin & a putredine vīdicat. Ammiscetur medicamētis pforas abstergētibus. Excrescētia in oculis reprimat, & pterygia cōsumit. Cæterasq̃ carnis extuberationes tollit. Clysteribus infunditur. Discutit lassitudines ex oleo illitus. Cōtra hydropicorū tumores auxiliatur. Dolores in saccis fotu mitigat. Et pruritus sedat, ex oleo & aceto infriētus, donec ad ignē sudent. Itē lichenas, lepras, pforasq̃. Anginā ex melle, aceto, & oleo illitus leuat. Tonsillis vuæq̃ cū melle tostus, vlceribus in ore manantibus, gingiuis quas humor vexat, & phagedænis vlcerum cum polenta crematus illinitur. Aduersus scorpionū iētus cum lini semine. Contra serpentium morsus cum origano, melle, hyssopo. Aduersus cerasen cum pice aut cedria aut melle auxiliatur. Contra scolopendræ morsus cum melle & aceto. Aduersus vesparum iētus, & crabrones, albidasq̃ capitis pustulas, thymos, & tubercula cū seuo vitulino. Furunculos cum vua passa, aut suillo adipe, aut melle discutit. Testium tumores cum origano & fermento maturius concoquit. Crocodilorū moribus auxiliatur, tritus in linteolo & intinctus aceto, ita vt vinculis loca constringantur. Prodest ad bestiarum morsus, sugillationes in facie, ex melle. Contra haustum opium & fungos, cum aceto mulso bibitur. Luxatis imponitur cum farina & melle. Ambustis igni cum oleo impositus, pustulas erumpere nō patitur. Podagricis itidem imponitur, & aurium doloribus cum aceto. Ignis sacros & vlcera quæ serpunt cum aceto aut hyssopo illitus sistit. Vritur fidei, diligenter opertus, conditusq̃ prunis, vsq̃ dum efferuescat. Aliqui fossilem subactō polline, obliniunt & carbonibus subijciunt, vsq̃ dum pollen exuratur. Solet & sal communis eodē modo vri. Sed aqua semel abluitur & ficcatus in ollam coopertam mittitur, subdito igne, moueturq̃ donec iam non exiliat.

De Spuma salis.

CAP. CXVIII.

h Alos achne spumosi salis ramentum, in exilibus petris inuentum, cui vis eadem quæ sali.

De Muria

CAP. CXIX.

m Vria effectus salis præbet. Abstergitq̃. Dysentericis infunditur, etiam si nome intestina corripit. Ischiadicis veteribus ad fotys, aquæ marinæ vsum præstat.

DE MEDICINALI MATERIA

De Flore salis.

CAP. CXX.

f Los salis flumine nilo defluit. Lacubus tamen quibusdam innatat. Assumendus qui crocei coloris est, odore ingrato, ceu gari. Interdum longe magis virus olet, gustuq; mordacior, et pinguius letus. Fucatus autem rubrica, aut scrupulosus, improbat. Præterea syncærus nō nisi oleo resoluitur. Adulteratus nonnulla ex parte, etiam aqua diluente fastidium colorem. Ad vlcera quæ cacoethe vocantur, & phagedænas, genitalium nomas, & purulētas aureis, effica-
c x est. Oculorum hebetudines, cicatrices, albuginesq; tollit. Empla-
s stris vnguentisq; coloris causa, vt rosaceo, miscetur. Sudorem cit. Al-
u uum turbat in vino aut aqua sumptus. Stomachum male habet. Addi-
t tur acopis & smegmatis, quæ albandi capilli gratia componuntur. Et
i in vniuersum acris est, & leuientis naturæ vt sal.

De Nitro.

CAP.

CXXI.

*Humores transferri qui aliis
responderent.*

p Rafertur nitrū leue, roseo colore, aut candido, in foramina dehiscens, perinde quasi spongiosum quiddā. Quale ex illy-
r rico affertur, a buniorum ciuitate. Humores transfert qui ali-
c cubi concreuerunt.

De Spuma nitri.

CAP.

CXXII.

f Puma nitri optima esse putatur, leuissima, glebosa, friabilis, colore pene purpureo, aut spumosa, & mordens. Qualis ex philadelphia lydiæ defertur. Secunda est ægyptia. Quin & in magnesia caria gignitur. Vim & vñionem salis habet, tam nitrum q; spuma eius. Præterea nitrum tormina sedat, si tritum cum cumino bi-
b batur, in hydromelite, aut sapa, aut aliquibus quæ inflationes discute-
r re possunt, vt ruta vel anetho. Febribus circuitu redeuntibus illini-
t tur, ante suspectam accessionem. Miscetur emplastris, quæ extrahunt, & discutiunt, extenuant, & lepras abstergunt. Cum aqua autem calida aut vino infusa inflationes, purulentas aureis, & sonitus earundem sanat. Sordes expurgat, cum aceto instillata. Canum moribus ex ali-
n nino adipe aut suillo medet. Resinæ admista furunculos aperit. A quæ inter cutem cum fico illinitur, opisthotonisq; iam remissioribus & luxa-
t tis cum carato. In resolutione linguæ, panis cōmode permiscetur. Ali-
q qui supradicta carbonibus vrunt subiecta prius testa noua, donec incā-
d descant.

De Fax.

CAP.

CXXIII.

L igenda fax maxime a vino veterē, italico, sin minus ab alio
c confirmili. Fax aceti viribus longe acrior est. Crematur vt al-
c cyonium ante diligēter ficcata. Sunt qui noua testa igni lar-

go, vrant, vsq̃ dum penitus incandescat. Alij viuis carbonibus facis glebam obruunt, & idem opus prosequuntur. Experimentum est legitima visionis, vt aërio nitore inalbescat, linguamq̃ tactu vrere videatur. Eadem vrendæ facis aceti ratio. Vis eis supra modum vrens, & abstergens. Vlcera ad cicatricem perducit. Vehemēter exest, siccaturq̃. Sed recenti vtendum est, quoniam celeriter eximatur, aperta, & nullo vase cōdita. Lauatur vt Pompholyx. Quæ visionem experta non est, tumores & per sese, & cum myrto cohibet. Ventris stomachiq̃ flutiores illita sistit. Muliebri profluuium, imo ventri aut genitalibus imposita, mitigat. Panos discutit, nōdū exulceratos, & tubercula. Turgescentes mamas suisq̃ lactis impatientes, cum aceto peruncta extinguit. Cum resina vero ambusta & scabros vngues aufert. Addito lentiscino oleo illita nocte tota, ruffat capillum. Elota oculorum medicamentis vt spodos adijcitur. Cicatrices & eorum caligines eadem abstergit.

De Calce.

CAP.

CXXIIII.

Alx hoc modo fit. Marinorū buccinorum testas igni condito, aut feruenti clibano nocte dimittito, postera die si candidissima fuerit, extrahito. Sin aliter, iterū vrito, vsq̃ dū vehemēter inalbuerit. Dein vbi in aquam frigidam immersa fuerit, in fictile nouum conijcito, et exacte pannis operiens, noctem vnā conuiescere finito. Mane eam extrahens, si ad intentum finem perducta est, recōdito. Fit & e glebis lapidum crematis, necnon e vili marmore, quæ cæteris præfertur. Vis omni calci in commune ignea, mordens, adurens, & crustas inducens. Quibusdam alijs immista vt adipi, oleo, concoquendi vim assumit & dissipat. Vlcera ad cicatricē perducit. Efficacior existimatur recens nec aspersa aquis.

De Gypso.

CAP.

CXXV.

Gypsum vim habet adstringendi, obstruendi. Sanguinis eruptiones sudoresq̃ cohibet. Sed potū strangulat, quodam suffocationis modo.

De Sarmenticio cinere.

CAP.

CXXVI.

Armentorum cinis vrendi vim habet. Cum axungia autem vel aceto illitus, fractis nervis, articulorum collisionibus, & neruorum nodis prodest. Cū nitro & aceto excrementias carnis in scroto reprimat. Serpentium canumq̃ moribus illitus ex aceto medetur. Crustas obducentibus medicamentis ammiscetur. Fit ex eo lixiuium contra præcipitationes, & fungorum venena, cum aceto sale & melle.

De Alcyonio.

CAP.

CXXVII.

Alcyonij quinque esse genera compertum est. Vnum enim spissum, acerbisaporis, spōgiosa facie, Item tetri odoris, ponder

DE MEDICINALI MATERIA

rosus, & piscem olens, quod plerumque in littoribus inuenitur. Alterum pinnulae oculorum aut spongiae simile, fistulosum, & leue, odorem algae referens. Tertium vermiculi forma, & colore, magis purpureum, quod milesium vocant. Quartum succidis velleribus non dissimile, spongiosum, leue. Quintum figura fungi, sine odore, asperum, parte interna quodammodo punicosum, foris laeue, acre. Quod plurimum in propolis iuxta insulam besbicon appellatam gignitur. Patrio nomine haec los achnen vocant. Duo priora, in foeminarum sinegmata assumuntur. Contra lentigines, lepras, vitiligines, nigricias, & maculas in facie reliquoque corpore. Tertium ijs qui difficili urina vexantur, aut harenulas in vesica colligunt, idoneum est. Item renibus affectis, aquae inter cutem, leni. Vsum autem & ex vino illitum alopecias replet. Postremum de albandis dentibus aptum est. In alia absterforia, psilothraque assumitur cum sale mistum. Si quisquam alcyonium cremare velit, in crudum fistile mittat, & oblinens vasis spiraculum luto, ita fornaci mandet, & cum figlinum percoquetur, extrahens ad vsus recondat. Lauatur ut cadmia.

De Adarche. CAP. CXXVIII.

Ita in cappadocia quod adarches appellatur. Est autem concretum f. ta salifrago, humidis & palustribus locis siccitate emergens, & harundinibus ac haeribus agglutinata, colore flori lapidis asiatici similis, & omni forma molli alcyonio, & aliquantum cauo proxima, tanquam lacustre alcyonium esset. Ad euellendas lepras, lentigines, lichenas, & vicia cutis in facie, accommodatur. Et in summa vis ei acris. Humorem euocat qui in aliqua parte concreuit & ischiadicis prodest.

De Spongijs. CAP. CXXIX.

Spongijs alias mares appellauere, tenui fistula, spissas, quarum e. duriores tragos nominarunt. Foeminas autem quae contrarias dotes habent. Vruntur eae ut alcyonium. Recentes sine pinguitudine vulnerariae sunt, & tumores reprimunt. Recentia vulnera ex aqua poscave conglutinant. Veteres sinus ex decocto melle iungunt. Vetulae autem inutiles. Aridae & ligatae lino, si penicilli modo adigantur, occlusa vlcera, callosque laxant. Recentes & vacuae senilia vlcera, & quae fluxione laborant, aut cuniculatim exedunt, imposito siccant. Sanguinis profluuium sistunt. Crematarum cinis ex aceto, aridae lipititudini auxiliatur. Et ubi quid abstergere aut adstringere opus est. Vtilius, in oculorum medicamentis lauare cinerem. Omnium cinis cum pice crematarum, profluentem sanguinem sistit. Candidae cura fiunt, e molliissimis recentes, per aëlium tinctae salis spuma, quae petris cohaerent.

LIBER QVINTVS.

137

ret, insolantur in uersæ, hoc est parte caua sursum spectate. & qua adhæ-
sere, deorsum. Si vero æstiuâ serenitate ad lunam sternantur, perfusæ sa-
lis spuma, aut maris aqua, maximum candorem referent.

De Corallio.

CAP.

CXXX.

Oralliū quod aliqui lithodēdron appellarunt, marinū esse
e fruticē cōstat, qui imo extractus duratur statim atq; emergit,
tanq̃ offuso aere protinus concreseat. Plurimū inuenitur sy-
racusis, in promontorio cui pachyno nomen est. Laudatissimum ru-
bens, colore hastulæ regiæ, aut sandycis meri, nec secus terēti facile cea-
dens, æquabili vsque quaq; cōcremēto, rursus algæ aut fuci marini odo-
re, q̃ramosissimum, cinnamomi æmulum, formā fruticis. Quod autem
in lapidis duritiā coit, scrupulosum, inane, & lacunosum, vitiosum
existimatur. Adstringit & mediocriter refrigerat. Excrecētia coeracet.
Oculorum cicatrices abstergit. Vlcera caua, & cicatrices explet. Cō-
tra sanguinis reiectiones magnopere efficax est. Vrinæ difficultati au-
xiliatur. Quin & potum ex aqua lienem absumit.

De Antipathe.

CAP.

CXXXI.

q Vod antipathes vocant, corallium esse arbitrantur, specie tā-
tum distās. Est autem colore nigro, arboris figura, ramosum
magis, Vires supradicti habet.

De Phrygio lapide.

CAP.

CXXXII.

p Hrygius lapis quo infectores in phrygia vtūtur, a qua nomē
accepit. Nascitur in cappadocia. Optimus habetur palli-
dus, modice grauis, inæquali compage corporis, intercedētis
bus albis segmētis, vt in cadmia. Vritur autē vino optimo perfusus,
viuisq; carbonibus obrutus perflatur assidue foliis, donec mutato
colore rufescat. Rursus eodem vino restinguitur. Hoc iterum & ter-
tio faciendum. Attendendum tamen, ne minutim confringatur, & in
fuliginem euanescat. Vis crudo vstoq; adstrictoria, expurgans. Vlceri-
bus crustas quadamtenus inducit. Ambustis cum cærato medetur. La-
uatur vt cadmia.

De Asio lapide.

CAP.

CXXXIII.

a Sius lapis assumi debet pumicosus, leuis, fungosus, item fria-
bilis, scissiles venas melini coloris ad imū actas habēs. Eius
flos, salugo subflaua est, sūmo lapide infidēs, cōpage tenui, co-
lore in aliquib⁹ albo, ī alijs pumici simili, ad luteū vergēte. Admotus li-
guæ aliquatū mordet. Vim habet vterq; adstrictoriā, et modice erodētē.

f. j.

DE MEDICINALI MATERIA

Ammistus liquidæ pici, aut terebinthinæ, tubercula discutit. Lōge validior flos existimatur. Cæterū siccatus flos, vetera vlcera & cicatrici repugnātia sanat. Excrescētia cohibet. Tetra vlcera & fungis similia, cū melle expurgat. Vlcerū caua explet, depascentiaq; cū carato fistit. Fit cataplasma ex eo podagris, misto fabæ lomento, & lienosis ex aceto & calce. Prodest phthificis linctū. Podagrici iuuantur pedibus in folio ex eo lapide excauato inditis. Fiunt quoq; oculi, qui corpora erodunt, & luxuriantem carnem, & corporum crassitiem absumunt, vice nitri in balneo. Si lauare libet, cadmiæ modo lauatur.

De Pyrite lapide.

CAP. CXXXIIII.

Pyrites lapidis genus est, a quo æs extrahitur. Eligi debet æris similitudine, facile scintillas ædes. Vritur sic. Melle irrigatus molli pruna continuo flatur follibus, donec ruffescat. Alij in carbonēs igni candelentes, lapidem melle perfusum deiiciunt, et vbi ad fuluū colorē vergere cœperit, extrahūt. Efflatoq; cinere, rursus madefactū cremāt, donec æquabili tenore assicatus, friabilis reddatur. Siqui de sæpe facies summa solū vritur. Ita crematus siccatusq; reconditur. Si eloto opus sit, lauari debet vt cadmia. Tā crudi quā vsti vis est, excoalfacere, abstergere, offusam oculis caliginem expurgare, duricias concoquere, & concoctas discutere. Refina exceptus excrecētia in carne cohibet, sed calorem quemdam & adstrictionem parit. Ita vstum nonnulli diphryges appellant.

De Hæmatite lapide.

CAP. CXXXV.

Hæmatites optimus habetur friabilis, puro colore niger, durus in se & æqualis, nulla forde ammistā, nulloq; zonarū discursu. Vim habet adstringentē, & excoalfactoriā aliquantum. Oculorum cicatrices & scabriciam cum melle purgat. Cum lacte autē muliebri, lippitudini, collisionibus, & oculis cruore suffusis conuenit. Bibitur contra difficultatem vrinæ, & fluxiones mulierum in vino, et ab ijs qui sanguinem reiecerunt, cum succo punici mali. Fiunt ex eo coctes & collyria oculorū vitijs apta. Vritur vt phrygius, vino tantū subtrato. Modus vstionis est, vt modice leuis fiat, & bullis quibusdā inturgescat. Sunt qui hæmatiten ita adulterant, densam glebā rotundāq; schisti lapidis, cuiusmodi sunt quæ radices vocantur, vase figlini operis, quod feruentem cinerem contineat, condunt, paucaq; interiecta mora eximunt, experiunturq; si trita ad cōrem hæmatitæ colorem

reddat, q̄ si ita res se habet, reponūt, sin minus, iterum obruūt, & subinde conspicientes periculum faciūt. Siquidem in cinere diu dimissus colore mutato dissipatur. Coarguitur male cōfictus, scissilibus venis. Quippe in rectos venarum discursus refringitur, & longe secus se in colore habet. Namq̄ floridum reddit. Hæmatites vero sanguineum t̄q̄ cinnabarin imitantem, Inuenitur in sinopico minio. Fit & e magnetē lapide, vehemēter ambusto. In ægypto sponte naturæ cum metallis enascitur.

De Schisto lapide. CAP. CXXXVI.

Chistos lapis in Iberia Hispaniæ cōtermina gigniur. Probat^r maxime, quæ croci colorē æmulatur, friabilis, suapte natura fissilis, concremētō & serie cohærentiū venarum, ammoniacō sali similis. Vim exhibet hæmatitæ, sed ad omnia infirmiore. Quin & caua replet muliebri lacte perfusus. Ad procidentia, rupta, itē genarum crassitiem, & vnas oculorum, magnopere efficax est.

De Gagatē lapide. CAP. CXXXVII.

In Gagatarum lapidum genere, præferendus qui celeriter accenditur, & odorem bituminis reddit. Niger est communi ex parte, squallidus, crustosus, perq̄ leuis. Vis ei molliendi & discutendi. Depræhendit fonticum morbum suffitus. Recreatq̄ vuluæ strangulationes. Fugat serpentes nidore. Podagricis medicaminibus, & acopis additur. In Cilicia nasci solet, qua influens amnis in mare effunditur, proxime oppidum, quod plagiopolis dicitur. Vocatur autem & locus & amnis gagas, in cuius faucibus ij lapides inueniūtur.

De lapide Thracia. CAP. CXXXVIII.

Iapis thracias dictus, nascitur in flumine quodā scythiæ, cui ponto nomen est. Vis ei gagatæ. Traditur aqua accendi, & oleo restingui. Quod in bitumine accidit.

De Magnetē lapide. CAP. CXXXIX.

Magnetis lapis optimus est, qui ferrum facile trahit, colore ad cæruleum vergente, nec admodum grauis. Datur cum aqua mulsâ, trium obolorum pondere, vt crassos humores eliciat. Sunt qui magnetem crematum pro hæmatite vëndant.

De Arabo lapide. CAP. CXL.

Arabus lapis elephāti maculæ similis. Is tritus illitu hæmorhoidas exiccat. Eius cinis dentifricio optimus.

f. ij.

DE MEDICINALI MATERIA

De Galactite. CAP. CXLI.

g Alactites appellatur q̄ lacteum reddat. Cinerei tamen est coloris, ac gustu dulcis. Ad oculorum fluxiones conuenienter illinitur. Oportet autem in aqua tritum, pixide plūbea redere, propter vim glutini, quod obhæret.

De Melite. CAP. CXLII.

m Elitites omnia galactitæ similis. Hoc tantum interest, q̄ dulciorem succum remittit. Eiusdem vt galactites effectus.

De Morochtho lapide. CAP. CXLIII.

m Orochthus lapis quem aliqui galaxiam, aut leucographida vocauerunt, in ægypto nascitur, quo vtpote molli, & facile liquefcente, linteones dealbandis vestibus vrūtur. Spiracula corporis obstruere videtur, conueniens ijs qui sanguinem expuunt, cœliacis, & vesicæ doloribus, cum aqua potus. Idem fluxionibus vuluæ, impositus velleri. Mollihus oculorum collyrijs miscetur. Explet enim caua, atq̄ delachrymationes sistit. Idem cærato exceptus, vlcera quæ fiunt in teneris partibus corporis, ad cicatricem perducit.

De Alabastrite lapide. CAP. CXLIIII.

a Labastrites vocatus onyx, crematus, resina aut pice assūpta duricias discutit. Stomachi dolores cum cærato leuat. Gingiuas comprimit.

De Thyite lapillo. CAP. CXLV.

l Apis nomine Thyites, in æthiopia gignitur, subuiridi colore iaspidem imitatus. Liquefscens tamen lacteum succum reddit. Vehementer mordet. Tenebras quæ pupillis obuersantur expurgat.

De Iudaico lapide. CAP. CXLVI.

i Vdaicus lapis in Iudæa nascitur, glādis effigie, candidus, scitata admodum configuratione, discurrentibus lineis quasi industria detornatis. Solutus nullā qualitatem manifestā gustui repræsentat. Potest ciceris magnitudine tritus ad cotem, vt collyrium, cum calidæ aquæ cyathis tribus, potu difficultati vrinæ auxiliari, & calculos in vesica comminuere.

De Amianto. CAP. CXLVII.

a Miātus lapis in Cypro nascitur, scisso alumini similis, quo vtpote flexili, pannos tantū ostentationis gratia texunt, qui ad

LIBER QVINTVS.

139

ignes cōiecti ardent quidem sed flammis inuicti splendidioresexeunt.

De Sapphiro.

CAP. CXLVIII.

f Apphirus lapis, percussis a scorpione potu, prodesse existimatur. Contra intestinas exulcerationes bibitur. Excrescentia in oculis vnaq; & pustulas inhibet, & ruptas membranas cogit.

De Memphite.

CAP. CXLIX.

m Emphites in ægypto iuxta Mēphin inuenitur, calculorum magnitudine, verficolor. Tradunt trito & illito, quæ vrenda aut secanda sunt, sine periculo obstupefcere, ita vt non sentiāt cruciatum.

De Selenite lapide.

CAP.

CL.

f Elenites lapis quem aliqui aphroselenon appellarunt, quoniam noctu plenus, crescēte luna reperiatur. Nascitur in Arabia, candidus, traslucens, leuis. Huius ramenta comitialibus in potu dari iubent. Eo ad amuleta mulieres vtuntur. Arbores ad alligato eodem frugifera redduntur.

De Iaspide lapide.

CAP.

CLI.

i Aspidum quædam smaragdum imitatur, alia chrySTALLUM, similis pituitæ, alia non dissimilis acri, ob id vocatur aerizousa, alia veluti fumo infecta, quæ capnias ex argumento vocatur. Quædam lineis albis & resplendentibus præcingitur, assyrios appellata. Alia therebinthinæ similis, quæ terebinthizusa dicitur. Alia colore calaida gemmam æmulatur: Omnes amuleta esse traduntur, & accelerare partum fœmoribus appensa.

De Aetite lapide.

CAP.

CLII.

a Erites lapis est veluti prægnans, cum quatitur alio in vtero sonante. Grauidis continet partus, cum lubricæ sunt vuluæ & parum tenaces, sinistro brachio adalligatus. Sed parturientibus e brachio amoueatur & fœminibus alligetur, vt sine doloribus pariant. Furem depræhendit, si quis in pane conditum offerat. Fur enim mansum deuorare non poterit. Quinetiam concoctus, furem coarguit. Quippe decocta cum eo, deuorare non poterit. Tritus & carato exceptus, ciprino, aut gleucino, aut alio excalfaciēte, comitiales magnifice iuuat.

f .iiij.

DE MEDICINALI MATERIA

De Ophitelapide. CAP. CLIII.

Phitæ genera multa. Quidā grauis est odoris, niger. Alter cinereo colore spectatur, punctis distinctus. Tertius lineis quibusdam candidis intercinctus est. Omnes contra capitis dolores, & serpentium ictus prosunt. Feruntur qui lineas habent, lethargo & capitis doloribus auxiliari.

De Lapidibus spongiarum. CAP. CLIIII.

I Apides in spongijs inueniuntur, qui vesicæ calculos rumpunt, in vino poti.

De Lithocolla. CAP. CLV.

I Ithocolla glutinum, quo lapides coniunguntur. Fit autem ex marmore, lapide pario, & taurino glutine. Potest candente specillo admotum, incommodos oculis pilos replicare.

De Ostracite. CAP. CLVI.

O Stracites testæ similitudinē habet, glebosus, & in laminas fissilis, quo mulieres ad detrahendos pilos, pro pumice vtruntur. Menses drachmæ pondere potus, ex vino sistit. Si quattuor diebus a coitu bibatur sicilici pondere, scæminis præstat ne concipiāt, Cum melle autem impositus, mammarum inflammationes lenit, & notas cohibet.

De Smyride. CAP. CLVII.

f Myris lapis est, quo annularij scalptores lapides expurgant, ad erodendum, & vrendum utilis. Gingiuis quas humor vexat, prodest. Dentifricio commendatur.

De Harena. CAP. CLVIII.

b Arena e littoribus sole feruefacta, hydropicorum tumores exugit, si capite tenus, in ea obruantur. Torreri solet ad aridos fatus, pro milio aut sale.

De Cote. CAP. CLIX.

c Cotenaxia, quod exacuendo ferro deteritur, illitū alopecias ad pilum reducit. Virginum mammas cohibet, nec incrementum repatitur. Potum ex aceto lienem absumit.

De Lapide Geode. CAP. CLX.

g Eodes lapis, adstringit, siccatur. Caligines oculorum discutit. Illitus autem ex aqua, testium mammarumque inflammationes sedat.

LIBER QUINTVS.

140

De Terra.

CAP.

CLXI.

- o Mnis terra ad medendi vsum recepta, summam & primam vim habet occludendi. Sed specie distant, cū alia adiunctis quibusdam, ad alia sit vtilis.

De Erethriade.

CAP.

CLXII.

- e Rethriæ due sunt, vna vehementer alba est, altera cinericia. Optima habetur ad cinereum colorem vergēs, perq̃ mollis quæ si per æramenta tractim ducatur, lineam violaceam refert. Lauatur vt cerusa, aut hunc in modū. Teritur ex aqua, & vbi perfumierit, humor leuiter excollatur. Siccata solibus iterū teritur, interdiu adiecta aqua, vt vespere confidat. Antelucanis colo excernitur & demū in sole trita si fieri potest, digeritur in pastillos. Quod si tosta desideretur, pastilli magnitudine ciceris in fictile perforatum conijciuntur, oreq̃ vasis diligenter obturato, supra carbones continenter foliis bus perslantur. Vbi vero cinis in fauillas se conuertit, aut æreum colorem contraxit, exempti reconduntur. Vim habet adstringentem & refrigeratorem, leuiter mollientem. Caua explet & sanguinolenta cōglutinat.

De Terra samia.

CAP.

CLXIII.

- f Amia præfertur candida, leuis, tangenti linguæ glutinosa, mollis, succosa, friabilis. Cuiusmodi est quā aliqui collyrion, & vocarunt & vocant. Duæ enim species eius. Vnam antediximus. Altera aster appellatur, crustacea, & cotis modo prædensa. Vritur ac lauatur vt erethria. Vimq̃ cōsimilem habet. Sanguinis reiectiones sistit. Fœminis fluctione vuluæ laborantibus, cum flore sylvestris punici datur. Testium & mammarum inflammationes illita ex rosaceo & aqua refrigerat. Sudores arcet. Contra serpentium morsus & venena pota ex aqua auxiliatur.

De Samio lapide.

CAP.

CLXIII.

- f Amius lapis, in samia terra inuenitur, quo aurifices vtuntur polliendo auro vt resplendeat. Probatur candore & duritia. Vis ei adstrictoria, & refrigerans. Prodest stomachicis potus. Sensus hebetat. Verum ad lachrymationes oculorum & vlcera cū lacte efficax est. Partus, vt tradunt, adligatus accelerat, & conceptus fœminarum custodit.

De Chia terra.

CAP.

CLXV.

- c Hia eligi debet candida, vergens ad cinereum, samia similis. Est autem glebosa, albaq̃. Sed ficticijs formis differēs. Vis eadem quæ & samia. Extendit faciem, & erugat, atq̃ splendida reddit. Colorem in facie & corpore toto cōmēdat. In balneis pro ni

f. iij.

DE MEDICINALI MATERIA

tro deterget.

De Selinufia terra.

CAP. CLXVI.

Adē præstat selinufia. Maxime laudatur quæ vehemēter resplendet, candida, friabilis & aqua dilui celerrima.

De Cimolia.

CAP. CLXVII.

Imoliæ duo genera, cā dida, & ad purpureū inclinans, Optima existimatur quæ innatam habet pinguitudinem, tactuq; frigida sentitur. Vtraq; aceto diluta parotidas, & alia tubercula discutit. Ambusta igni si statim cimolia oblinatur, pustulas non sentient. Testium duricias, & totius corporis collectiones cohibet. Igni sacro imponitur. In summa vtraq; multum in medicina commēdatur, si incorruptæ originis, nec spuria assumatur.

De Pnigite terra.

CAP. CLXVIII.

Væ pnigitis dicitur, colore erethriæ similis est, grādiioribus tantum glebis. Manum si quis admoueat, refrigerabit. Tactu linguæ, vsq; adeo glutinosa, vt pensilis hæreat. Cui effectus idem qui cimoliæ, paulo tamen infirmior. Hanc aliqui pro erethriade vændunt.

De Testis.

CAP. CLXIX.

Ornaceæ testæ vehemēter tostæ, crustas vlcerebus obducūt. Quare prurigini & papularum eruptionibus medētur. Podagricis prosunt. Strumas discutiunt, cærato exceptæ.

De Terra fornacum.

CAP. CLXX.

Ornacum terra, quæ retorrida fuluescit, eiusdem cū testa effectus.

De Melia terra.

CAP. CLXXI.

Elia colore cineream erethriam imitatur, aspera tactu. Ea digitis friata, de rasi pumicis modo crepitat. Vim habet aluminosam, sed remissiusculā, id quod gustu depræhēditur. Modice linguam ficit, purum corpus reddit, & colorem cōmendat. Pilos extenuat. Vitilignes & lepras abstergit. Piætoribus vsum præbet vt colores diutius perennent. Emplastris quæ chloræ dicūtur, efficaciter inferitur. Ex omni Melia terra & omni alia in vniuersum, eligi debet, recens, mollis, non lapidosa, friabilis, quæ cum humorem attrigerit facile resoluatur.

De Ampelitide terra.

CAP. CLXXII.

Xampelitide terra quæ pharmacitis nomine, in seleucia iuxta syriam nascitur, laudatur in primis nigra, picæ carbones referēs, assulosa, æquabili splendore, quæ detrita, accepto oleo statim eliquescit. Vitiosa censetur candida, & cinerea, quæ in liquorem

LIBER QVINTVS

147

non resoluitur. Vim dissipandi & refrigerandi habet. Ad calliblephara additur, tingendis capillis idonea. Vfus eius ad illinendas vites sub germinationis tempus. Vt pote cum innascentes vermiculos enecet.

De Fuligine pictoria. CAP. CLXXIII.

Vlgo qua pictores vtuntur, ex vitrarijs officinis colligi solet. Siquidem ei palma tribuitur. Vis ei ad adstringendum et erodendum efficax. Fraeta cum rosaceo carato ad cicatricem perducit.

De Attramento librario. CAP. LXXIII.

Attramentum quo scribimus, fuligine e tedis coacta colligitur. In singulas libras gummis, ternæ fuliginis vnciæ adijciuntur. Fit etiâ e resinæ fumo, & pictoria fuligine, de qua paulo ante diximus. Assumitur autem fuliginis mina, gonus sesquilibra, glutinis taurini, attramenti sutorij, singulorû sesquicia. Additur cõuenienter erodentibus medicamentis. Ambustis ex aqua cõmode illinitur. Sed nõ ante soluatür q̃ cicatrĩ cẽinduxerit. Sanatis siquidẽ vlceribus, sua spon te decedit. Cæterũ habes amicissime ari abũ de, quæ tradenda duximus, non pro operis modo, quem destinaueramus, sed pro materiæ & auxiliorum medicina-
lium copia.

Pedacij Dioscoridis Anazarbei De
medicinali materia, Ioan-
ne Ruellio Sueffionẽsi
interprete Quin-
tilibri

F I N I S

PEDACII DIOSCORIDIS
 PEDACII DIOSCORIDIS ANAZARBEI
 DE VENENIS, QV OQVE MODO
 ARCEANTVR, VITEN-
 TVRQVE, LIBER
 SEXTVS.

S Vperioribus amicissime Ari libris, tra-
 didimus de aromatibus, oleis, vnguena-
 tis, arboribus, & eorundem fructibus, la-
 chrymisq; Item animalibus, melle, lacte,
 seuo, frumentis, oleribus, herbis, radicia-
 bus, liquamentis, vinis metallisq; In hoc
 vero totius operis vltimo, facultates eo-
 rum recensuimus, quæ prodesse nobis, aut officere possunt. Vitantes
 itaq; nomenclationis cædia, ad institutū reuertemur. Huiusmodi au-
 tem tractatus, cum bifariam distributus sit, in partem venena præcauē-
 tem, ita vt ne fallant sumentes, aut si quando per imprudentiam den-
 tur, vt tum quoq; innoxia fiant, irritaq; Et in partem auxiliatricē. Pri-
 mum disseram de præcauendi modo, quem esse difficillimū pleriq; ma-
 iorum arbitrantur, q̄ dantes clam venena, ita insidias tēperāt, vt peri-
 tissimum quemq; decipiant. Siquidem venena sua amaritudine, permi-
 stis dulcibus spoliant, & graue odoris virus mistura odoramentorū
 eximunt. Aut medicamenta immiscunt, quæ leuandæ valetudinis gra-
 tia dari solent, et præsertim quæ infirmioribus, vt absinthiū, tragoriga-
 num, cunillam, aut hyssopum. Quinetiam thymum, irim, organū, ca-
 storium, aut siquid medicamentis, cognatum habere saporem videan-
 tur. Aut potionibus inserunt, aut vinis, aut iuribus, aut passo, aut mul-
 sæ aquæ, musto, succis, lenti, polētis, aut medicaminibus. Aut concin-
 nantes ipsi, edulij admiscunt. Quare qui in ea suspicione sunt, condita
 edulia vitare debent, omniq; intensa saporis qualitate, dulcium, aut sal-
 sorum, aut acrium, abstinere, nec sitibundi astatim bibere, aut esurientes
 voraciter comesse, semperq; ad saporem ehtatorum diligenter attende-
 re, præsertimq; bibentes, frigidam aquam præsumere. Satiato enim ap-
 petitu qualitates ægerrime concoquuntur. In infirmis quidem faci-
 le vitare possumus potiones auxiliij gratia dari solitas, quas offerunt
 improbi, qui beneficia moliuntur. Itaq; ob id laborantes morbo, non
 perinde audētium iniurijs patent. Et hæc quidem ne facile, seducti ho-
 mines capiātur dolis veneficorum, occasio est & facultas. Sed alia ex-
 peditior, vt suspiciosi aliqua præsumant, quæ venenorum vires hebe-
 rent & inefficaces irritasq; reddant, cuiusmodi caricæ sunt cum iuglan-

dium nucibus manducata, & quæ cedromela vocant idest citriâ, semi-
 nis napi drachma cum vino. Item folia calaminthæ, aut terra quæ lema-
 nia sphragis appellatur, pondere pari cum vino. Aut rutæ folia & nu-
 cis iuglandis nucleum aut caricas duas & salis callum ieiuni sumant,
 & nullo veneni genere lædentur. Antidota ex vino sumpta eundem ef-
 fectum præbent. Inter quæ intelligitur magnum metridatium, quod
 scinco & sanguine temperatur. Quin & sæpe venenis obsistunt pecu-
 liares affectus in corporibus certo quodam modo constitutis, & qua-
 dam cibi potusque qualitate, aut vini copia, ita temperatis vt cum ve-
 nenis dissentiant. Siquidem ingesti veneni vires frangunt, atque iam
 priore alimēto fartis præclusis meatibus, obstant ne mēbratim per
 digestionem infinuetur. Verumenimvero, quoniam fortunæ temeri-
 tas interdum similia discrimina, peregre agentibus affert, absque ullis
 insidijs hominū, nō nihil differēdū michi de hac re necessariū duco. Iā
 primum igitur culinam apparare loco subdiali conuenit, cibosque & po-
 tus in huiusmodi loco struere. Si id fieri commode nequit, secunda
 erit conditio hæc, apparandi apponendique sub tecto. Sed tum dilige-
 ter laquearia animaduertenda. Frequenter enim a superioribus conta-
 bulamentis animalia decidunt, exigua quidem, sed quæ non modicam
 perniciem moliatur, vt phalangia, stelliones, & alia quædam reptilia.
 Porro vinaria vasa diligenter intueri oportet. Namque reptilia odore
 vini illiciuntur, quæ interdum sorbentia, noxium virus eructant, inter-
 dum vero delapsa immersaque moriuntur, & exitij causas haurientibus
 afferunt. Sed hæc hætenus dicta sint, cauti & prouidi insidijs ne pa-
 teant. Quod si qui sua sponte, aut ex quorundam insidijs sumpserunt,
 auxiliari primo quoque tempore oportebit. Siquidem dum comites sin-
 gulorum venenorum notæ expectantur, immedicabile fit venenum,
 & paulisper neglectum, medicamētis ægre cedit. Quare si qui compo-
 tes mentis, se virus sumpsisse fateantur, aut eorum qui aderant testimo-
 nio constet, protinus ad idonea remediâ transeuntes, facile peculiari na-
 tiuæque constitutioni, restituemus. Neque enim ijs assentimur, qui prorsus
 auxilia in huiusmodi, frustra adhiberi contendunt. Quo enim
 modo vitia, quorum causæ corporibus insident, medicinam ad-
 mittunt, & quæ forinsecus incurrunt venena, medendi rationem asper-
 nantur. Aequè vero omnes morbi pro causarū ingruentiū magnitudi-
 ne, aut pristinis affectionibus, qualitatibusque, quibus sit opportunū cor-
 pus, vel medicabiles sunt, vel nullis cedunt medicamētis. Quod si qui
 forsitan obmutescentes, aut temulēti, aut nolētes alioqui venenū egeri,
 nullā nobis eius cognitionē præbeant, tum protinus accedendum ad
 ea quæ cōmuniter epotis quibuscūque venenis opitulari consueuerunt.

PEDACII DIOSCORIDIS

Atqui nullum magis in omnia valens auxilium dari potest, quod ut proximo loco virus foras exhauriatur, priusque inualescat. Quare sine mora, calidum oleum ex aqua, aut seorsum, ut vomitare cogantur, dari conuenit. Aut si oleum natura loci negat, butyrum cum aqua calida, aut malua, aut lini semine, aut trago, vrtica, fenogrecum, aut halicæ decocto, vicem eius exhibebit. Hæc enim non modo vomitionibus exigent vi illa sua laxatrice, aut nauseam ciente, sed aluum quoque subducunt, & corporum inanitione ita aduersabuntur, ut acrimonias eorum hebetent. Id quod euidenter huiusmodi argumento depræhendere licet. Esto ut quisquam viua calce, vel vini facie, aut cantharidibus, aut alio quouis acri, corpus exulcerare statuerit, is si ipsum oleo leniter illinat, exulcerationem non accipiet. Atqui neque vehementer adstringi corpus neque refrigerari poterit, si antea perungatur. Quinetiam vomitus non ob id modo quod vacuet, & noxium humorem excernat, iuuamentum adfert, sed quod assumptum virus nonnumquam odore, coagulatis globulis, aut colore, prodat. Quippe cum odore & amaritudine, meconium colore, cerusam gypsumve, globulis lac aut sanguinem animalis recens iugulati ostendat. Nam grauis odor regestorum, leporis marini, aut rubetæ veneficia depræhendit. Ita ut nonnulla ab ijs remedia peti possint, ad idonea singulorum auxilia transeuntibus. Oleo, maluæ decoctum ammiscetur, aut glaucium, aut adeps anserinus, aut pinguium carniū iura, lixiuium lignorum cinere factum. Vbi vero vomitus diligenter citatus fuerit, ne quid in vêtre coierit, quæ hæserunt intestinis reliquæ clystere acri deuocentur. Facit & nitrum tritum & cum hydromelite sumptum. Vina vetera liberalius epota, gallinacea iura, præpingues pisces, vetustæ carnes pinguesque, & quæ adipe aut recenti butyro parantur. Aluum namque subducunt uti diximus, & stomachum resolutionia, proniorem ipsum ad vomitionem reddunt. Et venenorum acrimonias hebetant, atque meatus obstruentia, celerem virium penetrationem inhibent. Quinetiam medicamenta dantur, quæ communi dote prosunt, ut lemnia terra, agaricum, abrotonum, irio, radix eringij, semen pastinacæ & calaminthæ, nardum gallicum, castorium, ferulæ virentis medula, flos rhododendri, succus marrubij, laser aut laserpitium, sagapenum, peucedani succus, aut panacis, & radix quam magudarium appellant, aristolochia longa, syluestris rutæ semen, & betonicæ quam cestron nominant, folia. Singula cum vino drachmæ pondo sumi debent. Effectum præbet polij decoctum, & fesceli, & liquida pix linctæ. Magnifice ferunt operæ, antidota quæ in calce operis scripta reliquimus. Communis ratio præstandi auxilij, ita se habet. Cæterum ab ijs quæ consueuerunt euenire, communia remedia sumptitari possunt. Fere enim vires venenorum

quam plurimorum, in affectus confimiles, corpus tandem redigunt. Quam ob causam plerisque, communia conducunt auxilia. Per multa enim venenorum genera, communes tamē nec multi iisdem affectus oriuntur. Neque fieri potest, ut omnia quæ contingere solita sunt, vnum venenum sequantur. Alioquin superuacaneus esset venenorum tractatus, singillatim remedijs ab authoribus traditis. Neque vero in vno eodemque promptum est inuenire, ut stomachi, iecoris, renū & vesicæ dolore vehementer crucietur, ut singultuat, erodatur, contremiscat, refrigeretur, obmutescat, conuellatur, pulsus elanguescat, veterno prematur, caligent sensus, stranguletur, sitiat, sanguis erumpat, febre confusetur, ægrotiū reddat, torminibus vexetur, crebro vomiter, nausea prematur, rubescat, liuore suggilletur, palleascat, desipiat, stertat, viribus deficiatur, & pleraque alia eueniant. Vnumquodque venenum in generales affectus diducitur, ut pauca numero & communia demonstrentur, quæ euenire consueuerunt. Quare in singulis quæ supra diximus non facile fuerit deuoratum virus cognoscere. Nam stomachi & linguae erosio, ventris ac renum inflammatio, vehemens urinæ difficultas, & interdum cruoris exitus, laceratio, & in plurimis partibus quiddam adustionis sensus, non in cantharidibus modo potius reperiuntur, sed in erucis quoque pinorum, & bupreste, & salamandra. Porro eos qui meconium hauserunt, non modo veterno aut sopore premi, stertere, liuore sugillari, torpere, refrigerari, stupefcere, sensu priuari constat. Sed eos etiam qui mandragorā aut cicutam deuorarunt. Deliriū non hyoschamus tantum infert, verum etiam quæ toxica appellantur. Itidem aconitum, & mel quod in heraclea pontica gignitur. Strangulatio non minus in fungis quam in sanguine taurino, lacte, aconito, cerusa, gypso conspicitur. In summa difficile vnum vni veneno proprium inuenire signum, quod haustum virus prodere possit. Maxime quæ hæc cæterorum etiam vitiorum quæ in corpore exoriuntur communia sequi solent. Cæterum in his quæ celeriter enecant, adnotari fortasse, quod inspectū fuerit licet, ut postea trademus. Sed ijs qui ad longas ægritudines spectant nihil ad medendi rationem difficile, dumtaxat quod pertineat ad indicia noxæ, utpote cum venena statim atque præsentaneam vim illam perdiderunt transmutata in longos affectus communia reliquorum vitiorum remedia, compositionesque flagitent. Cum venefica proprietas non amplius insit. Si vero longa sit affectio, in aliquod diuturnorum morborum genus recidet, a quibus facile fuerit medendi rationem assumere. Sed de ijs quæ generaliter auxiliantur, hætenus. Consequenter quæ priuatim singulis profunt, scriptis mandabimus, si prius simul exposuerimus, quæ ex singulis ordinibus exitialem aut maleficā

PEDACII DIOSCORIDIS

vim fortiuntur, ut medicinae studiosi intra observationē cauti, quibusdā eorū medicamentorum misturis utantur quae memoriae literarū tradita sunt & ab authoribus descripta. Imprudentia enim magnas adfert noxas, & saepe continuo usu eorū, homo in perniciē agit. Proinde animalia quae exitiosam vim habent, haec sunt. Cantharides, Buprestis, Salamandra, pinorum eruca, Lepus marinus, rubeta, & rana palustris muta, deuoratae hirudines. Semina sunt, hyoscyamus, coriandrū, cicuta, gith, mādragora, psyllion. Liguamēta, meconiū, opocarpason, thapsia succus, elaterium. Radices quas mittit chamaeleo, aconitum thapsia, veratrum, ixia, agaricum nigrum, ephemerū, quod aliqui colchicum vocant, quod in colchide nascatur. Herbae oleraeque, similax quam aliqui thymion appellant, romani taxū, solanum manicum, quod et doricionium dicitur, sardonis herba quae ranūculi genus est, corniculatum papauer, phtharicum, toxicum, ruta sylvestris, fungi. Ab animalibus taurinus sanguis recens, coagulatum lac, mel heracleae in ponto genitum. Metalla gypsum, cerusa, calx, auripigmentum, duo sandarachae genera, spuma argenti, adarce, plumbum, & quod argentum viuum dicitur. E vitibus vinum abunde post balneas potum, aut passum & frigida aqua similiter.

De Cantharidibus. CAP. I

Vibus datae sunt cantharides, signa eueniunt grauissima. Ab ore enim ad vesicam usque, cuncta erodi sentiuntur. Picem aut simile quiddam cedriae resipiunt. Dextra praecordia inflammantur. Vrinam aegre reddunt. Et subinde cum lotio sanguinem emittunt. Strigmenta non secus atque dysentericis, aluo deferuntur. Fastidia urgent. Animoliquuntur. Obortaque vertigine concidunt. Postremo mente abalienantur. Ergo antea quod tale non nihil accadat, dato oleo, aut supradictorum aliquo, vomere cogantur. Mox ubi vomitione plurima reiecerunt, halicæ aut oryzae, tragi aut ptisanæ cremor, aut decoctum maluae, aut seminis lini, aut foenigræci, aut radicum altheae, quam latinus sermo ebiscum appellat, clystere infundatur. Praeterea nitrum eisdem dandum, ex hydromelite, ut quae stomacho adhuc aut intestinis adherent, lingendo excernantur, ac descendant. Quae nisi intercidantur, ingesta ex nitro aqua mulsa, vacuari debent. Detur deinde vinum aut passum, in quo pineoli nuclei, aut cucumeris semina contrita sint, aut ex lacte, aut mulsa, aut anserinus adeps in passo liquefactus. Inflammatae autem partes, hordei farina aut mulsa perungantur. Ab initio admodum cataplasmata nocent, quod citatus ab eis calor, illapsus virus ita remoratur, ut in principes se partis insinuet. Ipsa tamen interiecto tempore, molestissimis inflammationibus opitulatur. Vtpote quae dolo-

LIBER SEXTVS

144

res & permulceant & leniant. Quo tempore corpus calfaciente oleo, quo facilius introeat, eluere par est. Cæterum omnibus medicina, vt noxium virus per summa corporis excernatur. Deiectiones multifariam moliri oportet, ne affectus infigatur, & stabilitatem capeſſat. Galinaceis carnibus & hædinis, aut ſuillis, catullis, maxime pinguibus, & tenerimis veſci debent. Siquidẽ aluum crient, atq; venenorum acrimonias hebetant. Vinũ dulce liberalius ebibatur. Prodeſt thuris cortex, & ſamia terra quæ aſter appellatur, ſi quaternæ ſingulorum drachmæ cum paſſo ſumantur. Item pulegium ex aqua tritum. Irinum aut roſaceum cum rutæ decocto, recentes vitis ramuli, cum paſſo detriti. Longe omnium potentiſſime, antidota auxiliantur, in quattuor drachmis aquæ mulſæ pota.

De Pinorum eruca. CAP. II.

i Is qui erucas pinorum hauſerunt, illico dolor in ore & palato exoritur. Vehemẽs alui, linguæ ac ſtomachi, inflammatio torquet. Intestina dolor excruciat, ita vt pruriginem ſentire videantur. Corpus totum exæſtuat, faſtidium vrget. Quibus eſt ſuccurrendum, remedijs, quæ deuoratis cantharidibus dantur. Peculiariter tamen pro ſimplici oleo & irino, melinum quod e cotoneis pomis & oleo temperatur, accipiemus.

De Bupreſte. CAP. III.

q Vi bupreſtin biberunt, non diſſimile nitro virus ſapiunt. Stomachi ventriſq; vehemens dolor inſequitur. Tã venter q̃ ſtomachus mirũ in modũ vt in aqua intercutem diſſlatus, inturgelcit. Vniuerſa corporis facies contẽditur. Vrina ſupprimitur. Quibus eadem quæ potis cantharidibus auxiliantur. Priuatim poſt vomitus & vacuationes quas clyſteribus molimur, aridæ ficus proſunt. Itẽ earum decoctum, ex vino. Vbi vero iam fere pericula inclinantur, thebaicarum palmularum cibo, aut earũdem tritarum in mulſo aut lactis potu, iuuantur. Pirorum etiamnum omne genus eſſe, et lac humanũ bibere, conuenit.

De Salamandra. CAP. IIII.

f I Salamandrã hauſerunt, linguæ inflammatio conſequitur, mens præpeditur. Tremor cum torpore aut horrore quodam ac exolutione accedit. Partes nonnullæ corporis liuoribus circumquaq; ſuggillantnr. Sæpeq; diutius immorante veneno, putreſcentes deſcunt. Quibus præſtabimus cuncta quæ potis cãtharidibus. Peculiariora vero remedia, refina pinus, aut galbanum ex melle linctum & triſaginis decoctum, in quo nuclei pinei conterantur, vrticæ quoq; folia, cum lilijs & oleo decocta. Proſunt etiam oua teſtudinis marinæ

PEDACII DIOSCORIDIS

aut terrestris, cocta. Item ranarum ius cum quibus eringij radix incocta sit.

De Ephemero. CAP. V.

Vimpto ephemero, quod aliqui colchicon, aut syluestrem bulbum appellant, pruritus in toto corpore excitatur, non secus atq; ijs qui vrtica aut scylla laceffuntur. Interna rosione sentiunt. Stomachus cum ingenti gravitate exæstuat. Cæterū inualescen-
te morbo, cruor strigementis amixtus, per aluum exigitur. Quibus vt ijs qui salamandram hauserunt, vomitione aut clysteribus auxiliari conueniet. Sed antea q̄ venenum inualescat dandum est decoctum frondium quærquus, aut glandium, aut florum mali granatæ. Lac bibere prodest, in quo serpyllum sit decoctum. Item succum sanguinalis hærbae, aut ramorum vitis, aut rubi, aut medullæ recentis ferulæ, aut myrti. Baccæ autem myrti tusæ tritaq; et aqua macerata, vt liquor inde sumatur, opem ferunt. Medius sardoniarum glandium liber, simile effectū præbet, si crudus in aliquo supradictorum succo sumptitetur. Origanum quoq; cum lixiuo eorum. Eximie iuuantur asinini lactis aut bubuli potu, etiam si in ore contineant. Ita vt quibus copia lactis huius adsit, non aliud desideretur.

De Dorycnio. CAP. VI.

Orycnion quod & aliqui manicon solanum appellant, epotum lactis saporem in gustu refert. Vehementes singultus ciet. Humor linguam vexat. Sanguis subinde reijcitur. Strigementosa quædam perinde quasi dysentericis, aluo egerunt. Itaq; anteq̄ aliquid ex ijs eueniat, auxilio sūtātedicta, vomitus, clyster, & quæcunq; potum venenū expellere possunt. Priuatim ijs opitulatur aqua multa, lac caprillum, aut asininum, dulce vinum quod tepidū cum aniso bibatur, nuces amaræ, gallinacea pectora decocta. Quinetiam conchylia omnia, tam cruda quam tosta, esse salutare est. Conueniunt & locustæ marinæ & gammari, & pota eorumdem iuscula.

De Aconito. CAP. VII.

Conitum statim in lingua inter bibendum, cum adstrictione quadā dulcescit, gustatibusq; maxime cū exurgere conantur, vertigines offundit. Lachrymas ciet. Gravitationem pectori & præcordijs adfert. Simulq; crebri spiritus deslantur. Quare venenum vomitione abigi, aut clystere per aluū egeri opus est. Vitimur inter arcetes potus, origano, ruta, marrubio, vel absinthij decocto, cum vino absinthite, vel seperiuiuo, vel abrotono, vel chamælaea, aut trifagine. Prodest etiamnum opobalsami drachma, cum melle aut lacte, cum castorio, pipere, & ruta, æquis ponderibus ex vino. Coagulū hædi, leporis, aut

hinnuli, cum aceto. Ferri quoque stercus. Item vinum in quo aurum, ferum, argentumve candens restinguatur, potum. Lixiuiamque cum gallina & vino decocta, aut carniū præpinguium iura cum vino sumpta. Feruntur & aiuga priuatim ipsis subuenire.

De Venenato heracliae melle. CAP. VIII.

El heracliae in ponto, vbi aconitum gigni solet, athenis ionia, euboice siderites nominatur, quod qui edunt bibuntve non secus affliguntur, quam qui aconitum ebiberunt. Ijs eadem quae poto aconito conueniunt. Adiuuantur in primis continuo vini multi potu, cui rutae folia sint adiecta.

De Coriandro. CAP. IX.

Oriandrum ob odorem latere non potest. Epotum autem densam vocem facit. Insaniam adfert, a temulentis non abhorrentem. Qui sumperunt pudenda dictu blaterant, totiusque corporis odore venenum latentur. Quibus post vomitionem irino oleo concitata, vti retulimus, merum & per sese, & ex absinthio potum auxiliatur. Item oleum. Nec secus oua in eodem exinanita, si liquefacta in muria sorbeantur, & epota muria & ius salsum ex gallina & anseris. Passum quoque cum lixiuia sumptum.

De Psyllio. CAP. X.

Syllion epotum, corpori toti frigus & torporem cum exolutione et morore quodam affert. Cui omnia quae exhausto coriano auxiliantur.

De Cicutâ. CAP. XI.

Icuta pota vertiginem excitat, oculisque caliginem offundit, ita ut eminus non cernatur. Singultus ciet. Metus turbat. Extremi artus gelantur. Denique conuulsi suppresso arteriae spiritu, strangulantur. Quare inter initia, vti in reliquis, cicutam vomitu excutiemus. Postmodum deiectionem moliemur, ut quod ad intestina prolapsum sit, excernamus. Tum demum in meracam potionem, quae maximo est auxilio, deueniemus, dantes non nihil intermissionis, in qua proderit lac bubulum potui datum, aut absinthium cum pipere, & vino castorio ruta menta cum vino, aut amomi cardamomi aut styracis vncia, aut piperis cum semine vrticae & vino, aut lauri folia. Item laser ex oleo & passo. Passum per sese largius potum proficit.

De Taxo. CAP. XII.

Milax a quibusdam thymion, a Latinis taxus appellatur. Frigiditatem vniuerso corpori, strangulatus & celerem interitum infert, cui eadem quae cicutae conueniunt.

tj.

PEDACII DIOSCORIDIS

De Carpasi succo. CAP. XIII.

c Potus carpasi succus soporem, citamq; strangulationem adducit. Adiuuantur autem qui hauserunt, epotæ cicutæ remedijs.

De Sardonia hærba. CAP. XIII.

f Ardonia ranunculi hærbae generi assignatur, quæ vescentibus mentem adimit, & quadam nervorum distentione labia in risum contrahit, ut risus speciem præbeant. A qua quidem affectione, de sardonio risu adagium, in vulgus aperte manavit. Post vomitum peculiariter convenit aqua multa liberalius epota, lac, irrigatio, perunctioq; a pinguibus totum corpus excalfaciunt. In calidam aquam oleumq; descendant. Sed tum multum perfricare & inungere expedit. Et in summa, curam omnē quæ convulsioni nervorum adhibetur, exequi oportet.

De Hyosciamo. CAP. XV.

h yosciamū potum aut comestum similem ebrijs ab alienatione movet. Sed facile medicamentis cedit. Auxiliatur aqua multa copiose data, lacq; præsertim asininum, si id desideratur, caprillū, vel bubulū, vel aridarum ficuum decoctum. Faciunt ad id etiam nuclei pinei, aut cucumis semen ex passo sumptum, & vinum salsum cum adipe suilla recenti passoq; itidem vrticæ semē, aut nitrū ex aqua, & intubus erraticus, & sinapis & nasturcium, radix capæ & allium. Et hæc singula cum vino sumantur, post conquiescant, ut vinum concoquatur.

De Mandragora. CAP. XVI.

m Andragora si bibatur, confestim sopor insequitur, exolutio, ac vehemens veternum, nihil temere distans a lethargo. Cui anteq; aliquid ex ijs accidat, vomitus ex aqua multa proderit. Postea nitrū & absinthium, ex vino dulci aut passo sumantur. Caput rosaceo & aceto perfundatur. Proficit excitatio & motus corporis, & olfactus eupatorii, & piperis, sinapis, castorij & rutæ, tritorum in aceto & liquidæ picis, & odor e lucernarum extinctu. Quod si ægre ijs reuocentur, sternutamenta mouere alijsq; communibus auxilijs uti conueniet.

De Meconio. CAP. XVII.

c Poto papaueris succo, quem meconion vocant, consequitur veternum, cum perfrictione & pruritu vehemēti, ita ut sæpe inualecente veneno tanta erūpat prurigo, ut hominē excitet. Corpus id medicamentū olet. Post citatā oleo vomitionē, acres clysteres auxiliantur, acetūq; multum cū sale potum, aut mel cū rosaceo calido, merū cū absinthio aut cinnamomo copiosum, aut calidū per sese

acetum, nitrū ex aqua, & origanum cum lixiuia aut passo, & rutæ syl-
uestris semen cum pipere vino & panace, piperq; cum castorio & ace-
to mulso vel cum satureia aut origani decocto cum vino. Ij olfactili-
bus excitādi. Ob enatam pruriginem in balneas descendāt & fouean-
tur. Post lauacrum prodest iurium pinguium vsus, cū vino aut passo.
Medulla etiam ex oleo pota.

De Corniculato papauere. CAP. XVIII.

q Vod corniculatum papauer appellant, & potu & cibo eadem
inferre cōsuevit, quæ papaueris succus. Nec alijs expugnatur
auxilijs.

De Pharico. CAP. XIX.

q Vod pharicon vocāt, sapore syluestre nardum imitatur. Re-
solutionem neruorum potum affert, cum conuulsione & deli-
rio. Oportet autem post vacuationes vinum absinthiten po-
tui dare, cū cinnamomo, aut myrrha, aut nardo gallico, quod serinen
aliqui vocauerunt, aut spicæ nardi duas drachmas, & myrrhæ totidem
obolos, cum passo, iri, & rosis ex vino. Derasumq; caput illinire hor-
deacea farina cum aceto, & trita ruta.

De Toxico. CAP. XX.

t Oxicum ex eo nominari videtur, q barbarorum sagittæ eo il-
linebantur. Qui biberint, labiorum & linguæ inflatione tor-
quetur. Incoercitus furor varias ijs imagines obuersat. Qua-
re vix medicinæ locus est, raroq; qui hauserūt, euadent. Vinculis ergo
cohibendi, vt vinum dulce cum rosaceo bibere, & reuomere cogantur.
Rapi semen bibedū. Priuatim ijs cōuenit, quinquifolij radix, & hira-
cinus sanguis, aut caprillus, eodem modo sumptus. Roboris, fagi, aut
illicis cortex cum lacte tritus. Malaq; cotonea trita esse, aut cum pule-
gio & aqua bibere, cōueniet. Amomum & balsami semē ex vino. Sed
qui periculis defuncti sunt, diu lecticis decūbūt, et vbi surrexere, stupi-
di reliquum vitæ tempus degunt.

De Ixia. CAP. XXI.

i Xia quæ vlophonō appellatur, interpotādū aliquid ocimo
simile redolet. Vehementem linguæ inflammationem excitat.
Mētē mouet. Omnes excrementorū exitus supprimit. Strepē-
tū cū animi deliquio ciet. Ijs intestina latrāt, ne secedit quicq;. Post vo-
mitionē aluumq; resolutam auxiliū præstat, aqua in qua absinthiū ma-
duerit, ex vino largiore, aut aceto mulso pota. Rutæq; syluestris semē
t. ij.

PEDACII DIOSCORIDIS

aut laseris radix. Item tragorigani decoctum, cum aliquo supradicto-
rum, aut lacte, aut refina terebinthina, aut nardo, aut castorio, aut la-
serpicio, quorū singuli oboli cōueniūt. Quin & nuces iuglandes, cum
refina, castorio, & ruta tritæ, ita vt singula drachmæ pondus æquent.
Itidem chamelææ aut thapsiæ aut ablinthij succi ficilicum cum aqua
mulsa, & acetum calidum potum.

De Cerusa

CAP. XXII

Erusa suo colore proditur. Quippe palatum, gingiua, lin-
c gua, & commissuræ denti, candamore quodā inficiūt. Sin-
gultus, tussim ac linguæ ariditatem excitat. Ijs extrema fri-
gescunt. Mens labat. Membra torpescunt. Quibus dare conuenit
aquam mulsam, aut ficuum aut maluæ decoctum, aut lac calidum, aut
selamam ex vino tritam, vel lixiuiam ex sarmentis factam. Amaraci-
num oleum aut irinum, persicorum ossa cum lilij decocto. Columbi-
na oua cum thure, aut hordei decocto, aut prunis, aut gummi quod
vlmus plorauit, aut humore quem vlmea folia reddiderunt, cum te-
pida aqua. Sed tum quoq; vomant. Conuenit etiam thapsiæ succus,
aut scammoniæ cum aqua mulsa potus.

De Fungis.

CAP. XXIII.

Vngorum alij genere, alij copia lædunt. Omnes tamen strā-
f gulatus suspendio similes concitant. Quibus confestim suc-
currendum. Communiter ex oleo vomere cogendi. Mirifi-
ceiuuat lixiuia ex sarmentis aut pyrastri furculis, epota cum sale, po-
sca, & nitro. Pyra aut folia pyrastri cum fungis decocta, strangulan-
tem illam vim auferunt, mansaq; eisdem auxiliantur. Aduersus fungos
gallinacea oua cum posca proficiunt, adiecta aristolochiæ drachma.
Item ablinthium cū vino melleq; sumptum & ex aqua potum. Apia-
strū ex nitro. Panacis radix in vino. Fæx vini cremata cū aqua. Acris
flos ex aceto. Radix sinapis & nasturcium esu profunt.

De Gypso

CAP. XXIII.

I Apidescens gypsum strangulationem creat. Quare eadem
proferenda sunt, quæ manis fungis auxilia. Inter quæ ha-
betur maluæ decoctum, quod etiam olei vicem pensat. Vt
pote cum pingue sit, euomendoq; lubricitatem inducens, deradi cor-
pora non sinit. Quod vbi duratur in lapidem, efficit. Quinetiam pro-
dest oleum ex aqua mulsa, aut ficorum decocto. Lixiuiæ ficulneo
cinere aut sarmentis facta cum vino copiosiore pota. Origanum aut

LIBER SEXTVS.

147

thymum cum lixiuia aut aceto aut passo. Loca decocto malua pro-
luenda.

De sanguine tauri.

CAP. XXV.

t Auri recens iugulati sanguis epotus, spiradi difficultate strā-
gulatumq; concitat. Faucium meatus cum neruorum disten-
sione præcludit. Lingua rubescit. Cruore dentes inficiuntur.
Quædam concreti sanguinis vestigia, inter eorum commissuras restāt.
Quare vomitum vitabimus, Sanguinis enim globi per extractionem
eleuati, magis stomacho inculcantur. Dari ergo opus est quæ concretū
sanguinem discutiunt, aluum subducunt. Grossi lacteo succo turgentes
ex posca, & nitrum per sese auxiliantur. Nec secus coagulum omne cum
aceto & laserpitij radice, aut lasere. Itidē & brassicæ semen, cinisq; ficul-
neus. Conyzæ folia cum pipere, et rubi succus ex aceto. Aluus resoluē-
da. Seruatis fluida per sedem ingeri consueuerunt. Stomachum aluūq;
hordeacea farina ex aqua mulsa perungere oportet.

De Coagulato lacte.

CAP. XXVI.

c Os qui coagulatum lac hauserūt, frequens strangulatio inua-
dit, q; in globulos quosdam lac coalescat. Quibus pro antido-
to iuuandis, coagulum ex aceto damus. Et bibere sæpius co-
gimus. Damus & calaminthæ folia arida, item succum. Aut laserpitij ra-
dicem, aut laser cum posca. Thymūq; ex vino & lixiuiam. Sed nulla sal-
silago obijciatur, quoniam magis lac coiret, & in caseum densaretur.
Neq; illos vomere conuenit. Siquidem concretum lac sese in stomachi
angustias insinuans, strangulat.

De argenti spuma.

CAP. XXVII.

i Puma argenti pota, stomacho, ventri, & interaneis grauita-
tem cum magnis torminibus adfert. Et nonnunq; pondere
suo intestina vulnerat. Vrinā suppressit. Corpus intumēt, plū-
beamq; deformitatem concipit. Quibus subuenit secundum vomitio-
nem, potum syluestris hominij semen, myrrhæ drachmæ septem. Ab-
sinthium, hyssopum, apij semen, aut piper, aut ligustri flos ex vino.
Aridum palumbis fimun, cum nardo & vino.

De argento viuo.

CAP. XXVIII.

a Rgentum viuum potum eadem quæ spuma argenti infert.
Eisdemq; vtēdū auxilijs. Lac copiose potum auxiliari constat,
sed postea euomant, qui hauserunt.

t. iij.

PEDACII DIOSCORIDIS

De Calce, sandaracha, et auripigmento. CAP. XXIX.

alx, sandaracha, & auripigmentū, pota aluum et intestina cū
vehementi erosione excruciant. Præbenda cuncta quæ suffrenare & soluere possunt, & facilem lubricamq; aluum reddunt. Cuiusmodi maluæ succus est. Dandum decoctum seminis lini, vel fructus Tragi hærbae, vel Orizæ, lacq; cū aqua mulsa copiosum, iura pingua, & boni succi.

De Lepore marino

CAP. XXX.

Vileporem marinum biberunt, piscium virus olent. Intercedente aliquo tempore, aluus dolore afficitur. Vrina sistitur. Et si quādo eā reddere cōtingat, purpureū colorē referet. Omne piscis genus auersantur, & odio habēt. Fœtido ac graui sudore manāt. Biliosus vomitus interdum sanguini promiscuus subsequitur. His dādum lac asininum, vel passum continue, aut radice maluæ foliorumq; decoctum, aut trita cyclamini radix cū vino, aut veratri nigri, aut scamoni, drachma cum aqua mulsa puniciq; mali acinis. Cedria contrita cū vino efficax est. Anserinus sanguis vt tepebit potus. Sed cum pisces omnes respuant, aspernēturq; solis fluuiatilibus cācris velci possunt. bibūtq; eos admisto vino, adiutiq; precoquunt. Cumq; comesse pisces cœperint, suæ salutis indicium est.

De Rubeta.

CAP. XXXI.

Vbeta aut rana palustris assumpta tumores ciet. Pallor corporis vehementer decolorat, vt plane buxum spectetur. Spirandi difficultas torquet & grauis halitus oris, singultusq;. Inuita genituræ profusio consequitur. Adiuuantur secundum vomitionē multo meri potu, et harundinis radice binis drachmis, aut cyperi. Breuiter cogendi sunt vt exercitationi & cursui se credant ob torporem quo corripuntur. Quinetiam quōtidie lauandi sunt.

De Hirudine.

CAP. XXXII.

Euorata cū aqua hiruīdines, si ori ventri adhærent, tractione partium, nonnullam suctionis imaginem præbent. Eo enim argumento hausta hirudo depræhēditur. Has muria sorbitione excutit, & syrenæicus succus, aut laserpitij folia, aut betæ, cum aceto, aut pota niuis glebula, cum posca. Nitrum ex aqua gargazetur, aut attramentum futurium aceto dilutum. Si faucibus hæreant, iniecta lupinorum farina, aqua frigida ore contineatur & ad eam hiruīdines exsiliant. Prouidendum etiam ijs, quæ & si ferendi auxilij gratia tradantur, non minora tamen cæteris venenis pericula sæpius adferunt. Quælia sūt albū veratrum, tapfia, elaterium, agaricum nigrum. Siquidem ea strangulatus concitant. Aut immodicas deiectiones mouent.

Quibus ea medentur quæ in fungorum mentione & similibus retulimus. Nimios autem deiectionum impetus, medicamentis quæ excrementa supprimunt coercerimus. Neque negligenda quæ gliscente sensum nocumento, pericula ingerunt. Quo in numero sunt sylvestris ruta, gith & nouæ glacies.

De Axe.

CAP.

XXXIII.

a Xos flos est spinæ eiusdem nominis. Eos qui vescantur sola vomitiorecreat.

De Aqua frigida.

CAP.

XXXIIII.

a Qua frigida habunde pota, aut meracum vinum liberalius epotum, aut passum, præsertim a balneo, aut cursu, aut vehementi exercitatione, strangulatus, & dolores infert. Vbi sanguinis missio protinus, & vacuatio imminetia soluunt pericula. Sed de notis veneficiorum remedijs, & cauendi modo, hætenus dicta sint. Subiungeremus etiam antidota necessaria quæ præclare auxiliatur, quibus vtitur, quales metridatium est præsertim quod sanguine & scincho temperatur. Verum quoniam alijs in locis diligentissime scripta sunt, hic ab eorum descriptione superfedemus.

F I N I S

t.iiij.

PEDACII DIOSCORIDIS
PEDACII DIOSCORIDIS A
NAZARBEI DE VENENA
TIS ANIMALIBVS ET
RABIOSO CANE
LIBER.

D E bestijs quæ virus eiulantur, et exitalibus vene
nis, vt circuitus medicinalis ad vmbilicū perueniat,
sermonē facere proposuimus, et quidem cæteris nō
minus necessariū, ijs qui medicinæ artem exercent.
Vt pote cū adminiculo eorum quæ in eo traduntur,
doloribus, periculis, et cruciatibus, homines libera
ri cōueniat. Hic tractatus in summas parteis duas,
sicuti ab initio relatū est, distribuitur. Nam qui deferis virus inspuen
tibus differit, theriacus dici solet. Qui vero de amoliēdis veneficijs, ale
xipharmacus, de quo cum commētabimur, simul quæ sequi consueue
runt, quæq; nō nihil auxilij ferunt, explicabimus. Omnia in promptu
et ad manum artificem habere oportet, propter vrgentem sepe numero
necessitatem. Siquidem pauca e venenis et virulentis animantibus, tar
da et grassantia sensim pericula ciēt, ita vt dillationem admittāt. Ple
raq; vero præsenteā perniciem afferunt. Hominum autē partim ma
le alteris cogitantes, ingenita prauitate maleficium ita temperare statue
runt, vt spatium curanti liberum non relinquunt. Partim tristi aliquo
euentu oppressi, hausto spōte veneno, mortem sibi cōciscere conātur.
Qui postea depræhensi, aut respiciētes, et vitæ cupidi, præsenteā opē
poscunt. Non desunt qui hostiles sagittas illinentes, aut fontes aqualq;
puteanas hac labe poluētes, citam aduersarijs perniciem moliūtur. In
quibus ipsis maleficiū nō subito, sed aliquāto post respōdere natura sua
cōparatū est, tū nisi primo quoq; tempore coerceatur, et remedijs sub
inde excipiat veneficiū, frustra postea succurritur, occupatis iā cor
poribus exitiali vi veneni. Proinde non vulgari industria diligentiaq;
in ea re vtēdū est, vt quod in alijs incōmodis ars cōsuevit, in his quoq;
salutē mortalibus præbeat. Quin et apud priscos modus hic vnus exi
stimabatur eius partis. Sed recentiores ipsum discreuerunt, nominan
tes præcautionem et modum præcauētem, salubris sanantisq; medium
statuentes. Qui parua et leui supramodum persuasione freti, magno in
errore versantur. Siquidē treis in humanis corporibus constitutiones
esse contendunt. Vnam qua sani degimus. Alteram qua sinistra valetu
dine corpora laborāt. Tertia mediū inter vtramq; locum sibi vēdicat.

In qua positi, sanitatem specie mētuntur facileq; in morbos & pericula cōcidunt, propter mortiferam vim quæ in eorum corpus incumbit. Quemadmodum in ijs videre licet, quos excādescens rabie canis mor morderit, necdum tamen aquam horrent. In ijs quoq; qui cantharidas hauserunt, sed nōdū vrinæ tormēto cruciantur. Tripartito igitur artē digeri tripliciq; constitutioni respondere tradunt. Salubrē partē esse volunt, quæ sanitatem tuetur. Præcauentem eandemq; prohibentem, quæ obstat quo minus in morbos incidāt. Et in sanātē, qua vitia discutitūtur. Quibus ita respōderi potest. Quod primū per illud additamētū nō treis corporis tantū, sed quattuor haberi constitutiones fatendū esset. Quippe vt aliqui sunt, qui necdum morbo laborant, morbo tamē maxime ob impendentem causam sunt obnoxij, ita sunt qui iam priore morbo defuncti, nondū tamē secūdæ valetudini restituti sunt. Id quod a morbo proximo sese recolligentibus cernere licet, qui virium recreationē et robur desiderāt. Sed quemadmodū ægrotantiū cura ad partē medicamentariā pertinet, ita quod morbos amolitur, eidem subijci par est. Ad arcēdas enim valetudines vehemētibus vtimur auxilijs, altiore scarificatu, vstionibus, āputatione, derodētibus epithematis, potius nibus pernicipi occurrētibus, & plerisq; alijs. Verūenīvero sūt vsq; eorudes nonnulli, vt ne remedia quidem appellent, quæ morbos arceant. Cuius sententiæ inire rationem haud promptum est. Etenim cum verbum ipsum præcauere tum opus præcauentis, modum omnino auxilia rem remediariūq; præ se ferunt. Mirum vero, nisi etiam sua illa distributione partium, eos complectuntur qui in pestilentis cæli statu morbo nōdum correpti sunt, pesti tamē propter obuersantis aeris occasiōnē, opportuni et in morbū proni reddūtur. Dicere forsitan quis posset salubris institutionis alimētaria præcepta non aliud esse, q̄ arcendorū morborū rationē. Quippe cum firma reddere corpora, et minus vitij obnoxia nitamur, vt in offensa valetudine degāt, nec morbis confliētur. Neq; id silentio prætereundum, quod peculiariter ad rem pertinet, non oportere medicinæ partium distributionem, totidem corporis cōstitutionibus respondere, sed naturas peculiaribus vniuscuiusq; notis conijcere, vt suis locis ostendimus. Cum ijs igitur non pluribus agendum. Illud magis adnotare conuenit, affectus qui a virulentis animalibus venenisq; contrahuntur, cæcos vocari. Quin & ea quæ eisdē auxiliantur, nulli sūt addicta causæ. Quapropter quæstionibus obseruatoriæ artis, quæ ratione fulciatur, annumerari solent. Neq; ex se verū deprehenditur affectus huiusmodi cæcos esse. Nam quod semper se protrahit & nullum in quibusdam necessarijs vsum exhibet non facili cōiectura colligi potest. Et si secundum proprietates proflus cæcos eos

PEDACII DIOSCORIDIS

affectus concedimus, quia ab exitiis venenis & animantibus quæ
 virulento morfu læuiunt, contrahuntur, nō tamē quod ad opus nōnul-
 lum vsum præbet datq; medendi occasionem, aut imperceptibile, aut
 cæcum nullive causæ obnoxium reputatur. Sed magis ab ipso quis
 impulsus, fidē quā habet & opinionē de abditorum cognitione con-
 firmare poterit. Nam etsi sæpe minora sunt q̄ vt sensibus percipian-
 tur, euidenter tamē ex alijs correspōdentibus depræhendūtur. Diocles
 autem in eo commentario quem Plislarcho dicauit, satis modos per-
 strinxit, ad hanc verborum sententiam scribens. Nōsse quis hoc potest
 cum in alijs non paucis, tum in viperis & scorpionibus, & reliquis id
 genus, secum animo reputans vt quamuis exiguo sint corpore vixq;
 conspectui subijciantur, magnorum tamen discriminum ac dolorum
 causas inferunt. In quibus nihil præter quandam corporis exiguita-
 tem vehementiamq; præ cæteris animantibus datam illis, facile fue-
 rit spectare. Quanta enim scorpij magnitudo aut corporis moles existi-
 mari potest si ad eius idum cōparauerimus aut reliquorū id genus car-
 ne perimentium. Quorum aliqua vehemētes cruciatus excitant. Alia
 erodunt, & putredines cient. Nec desunt quæ præsentaneā perniciem
 moliantur. Nonne quod a phalangij morfu virus ingeritur, vniuer-
 sum corpus excruciat? At neq; quis vehementiam ipsorum a mole
 depræhendere posset, cū prorsus exiguo corpore cōsistat. Ergo q̄ hæc
 ad affectus referantur, constitit inter omnes. Verum q̄ exacte depræ-
 hēsum sit, vitiā quandam ipsis inesse mortiferam, quæ permixta cor-
 poribus molestiarum quæ exoriuntur causa sit, in confesso est, & om-
 nium consensu defenditur. Nec quisq; offendi posset vsq; adeo con-
 sentionis studio flagrans, qui aliunde exoriri molestias asseueraret, q̄ a
 materia mortifera partem corporis attingēte. Porro id fuit quod inter
 vtilia artis opera dicere cogit, nos nihil prorsus lædi ab incōpræhēsi-
 one per proprietatem communis causæ, cum euidenter tum indicari
 possit cum depræhensa est. Ideo Erasistratus empiricorū pertinaciam
 graui cauillatione incessens, cæcis affectibus causas assignauit. Inficia-
 tus communem causā quæ morbis accessit, esse incompræhensibilem.
 Et hanc in eo quem de causis scripsit commentario aptissime pro-
 didit. Nec ferendos eos esse censuit, qui se dicant in quibusdam, vt
 in venenis, serpentium ictibus, & cæteris id genus, trita meden-
 di ratione contentos esse. Observatio igitur compræhensionis cau-
 sarum, nobis perfecte diuidētibus satisfaciet. Primum enim per genus
 compræhendi non possunt. Quod autem sit lætifera vis corporaq;
 permutans, ita vt perimat, ex ijs quæ per genus, non per speciem vagā-
 tur, medelam scribit, qua hæc hebetare, & prorsus expugnare liceat.

Quando subiunxit. Ad aquā dulcem & potui idoneā venit quis, & āte
 obseruationem in vomitum, propter ferientis vehementiam, & demor
 sę partis fracturam. Cucurbitulas adfixit. Vrentia medicamēta, aut
 ea quę vim eandem adipiscuntur admouit, postremo partem am
 putauit. Secum reputauit medicamina, quę ad summa cutis adijci
 untur, immisę ad intima pernicię repugnare. Hęc itaq; quę pro
 posuit Erasistratus, veritati consentanea sunt, nec arti refragantur.
 Sed methodicos demirari licet, qui mortiferam vim corporibus
 illapsam negociorum quę ipsa facessit, esse causam diffiteantur. Verum
 rudiuscule nomini attendūt. Nam apud ipsos palam immisa vis φθορο
 ποιός id est mortifera nominatur, φθοροποιός δὲ autē aliquid esse volunt,
 quod nulli rei sit causa. Aiūt hęc nomina μάστιγος & ἀρακάλιπτεϊρ
 esse reliquis omnibus similia, in quibus partes quędam dictionum nō
 pro virtute, sed nuda prolatione compræhēduntur. Enimvero quem
 admodum in his vocibus μάστιγος & ἀρακάλιπτεϊρ partes, vernacu
 los & præcedētes nō retinent significatus, sic in hoc verbo φθοροποιείρ
 partes productionis gratia nō pro virtute coalluerūt. Hinc ad causarū
 differentias trāseunt. Affirmātq; causarū aliquas euidētes esse, quę dū
 aduersam valetudinem crearūt, separantur. Cuiusmodi sunt frigus, la
 bor, insolatio, æstus, et similia. Quasdā cōtinētes, quę permanēt postq;
 morbū excitarūt, hoc est, cū præsentēs sūt, et effectus eorū adsūt, cū in
 crescūt, effectus augētur, cū decrescunt, minuuntur, et cum desinūt, fini
 untur. Quin per se prodeuntes effectus, alicuius finis gratia esse pos
 sūt. Tales quidem probatissimę sunt causarum differentię, quarum
 nulli pthoropœon subijci potest. Euidens enim causa non est, quo
 niam morbus ipse permanet, nec corpore separatur. Nec continens
 causa dici potest, cum magna ex parte hęc adsit. Quemadmodum
 accidit, ijs qui a rabioso cane sunt demorsi. Quod si neq; euidens causa
 neq; cōtinens fuerit, neq; ad finem coadiuuatē causam referri potest.
 Si vero a nulla causarū differentia pthoropœon deducere possumus,
 causam non esse fatebimur. Quod autem asserunt, nomina quędam in
 se non habere parteis rerum significatiuas, sed nuda & simplici prolati
 one ficta esse, fateri necesse est. Verum non omnia sed perpauca talē nā
 cisci conditionem existimandū est. Nanq; ποιείρ in hoc nomine φθορο
 ποιός, perinde atq; adsumpta profertur. Sed peculiarissimā vsurpat
 significationem. Quęadmodum enim φθορά id est corruptionis nomē
 mutationem in peius significat, sic hoc verbum ποιείρ sumi debet, vt
 nihil in dictione φθορά sortiri se declaret, neq; proflō id significat quod
 omnes audiunt, & hinc simile redditur, παῖδά τέχειρ διψός. Si dant a

PEDACII DIOSCORIDIS

corruptione salubrē fieri morbū, cōcedūt utiq; vi huiusce verbi ^{τοῖς},
 nisi quid corruptionem efficiat. Omne autem quod aliquid efficit, ostē-
 ditur per singulas causas quæ corporibus subijciuntur, præsertim in
 immissis venenis. Verum non nihil subiacere causarum differentijs pro-
 dūt. Quinetiam aberrarūt nō exactam diuisionem assumentes. Qui ve-
 ro se dogmaticos profitētur, causam esse partim præparantem, partim
 continentem asserunt, ut inguinum vlcus & inguinariam febrem, quod
 effectui tum assistant, tum etiam separentur, ut a fractis præcipitatio.
 In summa quoties quidpiam suapte natura causa fuerit, nec vlla diui-
 sione compræhēditur, vitiosum est, neq; causæ adscribitur, eorum quæ
 idem genus sortiūtur. Sed quod phthoropœon id est mortifetū causa
 fit, nomen ipsum argumento est, & in ijs quæ cōtingunt apertius ostē-
 ditur. Quid aliud causæ arbitrantur esse post impressum a serpentibus
 ictum, q̄ ex animante vim & illapsum in corpora virus. Neq; enim
 frigus, neq; æstus, neq; cruditas, neq; aliud quicq; causari possunt.
 Verum quoniam causarum differentijs gaudent, & aliquas continen-
 tes, alias euidentes appellant, ipsis dicēdum, altero istorum modorum
 euidentem dici causam, q̄ effectum præcedit, & corporis compagem
 occupat. Continentem vero q̄ morbis præsentibus adest, qua sepa-
 rata recedunt, quæ cum ipsa euenerant. Sed de ijs hætenus. Fatendum
 itaq; mortiferā vim intrinsecus manifestissimam esse causam. Ipsamq;
 principem facere scopum oportet. Et anteq; morbis considentur,
 varijs modis est certandum, donec vis tota corporibus excutiat.
 Modo in loco præsertim principatum non obtinente, ante coercea-
 tur, q̄ altius irrepens viscera tangat. Aut eius pernicies eluatur,
 aut iam membratim peruagatura suffrenetur. Itaq; venena si hausta
 sunt, crebris vomitionibus, si morfu impressa, scarificatione, affixis cu-
 curbitulis, exuctu, carnis circumscriptione, nonnāq; amputatione ex-
 tremæ partis, euocantur. Clysteribus, & imposito medicamentorum
 acrium cohibētur. Hæc simul utiq; arcere virus & eluere possunt. Re-
 stinguntur meratiore potu, aut passo nulla aqua diluto, vel contra-
 riorum esu, quæ acrimonia sint prædita. Postremo deiectione alui, euoca-
 tus sudor, & alia quædam in commune quæ membratim demonstra-
 bimus, auxiliantur. Verum enim uero non latiferam modo materi-
 am, sed & magnitudinem, & tempus efficere scopum & propositum
 oportet. Etenim ab ijs remedia q̄ plurimum discriminē capeſſunt. A ma-
 gnitudine quidē, cum nōnulla ex venenis, & virosis animalibus peri-
 cula minantur. Alia putredines altas aut exteriores excitāt. Alia vehe-
 mentissimos dolores aut cæcos cient. Alia vix medicamenti cedunt,
 & magis minusve molestias excitant. Oportet autem ea quæ pericula

ferunt euincantibus auxilijs expugnari, & minus infesta mitioribus. Quippe absurdum fuerit in maioribus, tardiore medicamentorū vsu homines in discrimē asserre. In minoribus vero vehementiū auxiliōrū iniuria laceffere. Finitio a temporibus in promptu est, aut enim subito in pericula & præsentes molestias adducit, aut sensim & dillatas in tēpus. Itaq; præsentibus multa simul auxilia repræsentrari oportet. Reliquis paulatim. Hæc quadam artis formula breuiter definita sint. Iam membratim procedamus.

Signa rabiosi canis & demorforum ab eo. CAP. I.

E rabiosi canis morfu sermonē alijs præposuim⁹, q̄ id animal domesticū ac frequēs esse cōsuevit, et rabie sæpius corripit, ac perit, ab eoq; cauēre difficile. Inde periculū inuitabile hominē manet, nisi multis vtiat auxilijs. Canis plerūq; flagrantissimis aestibus in rabie efferatur. Interdū quoties frigora incesserūt. Rabiosus autē potū & escā auersatur. Largā spumantēq; pituitā narib⁹ et ore proijcit. Torue & solito tristius intuef. In omnes passim sine latratu irruit. Aequē feras hominesq; tā familiares q̄ ignotos mordet. Nec protinus infestū quicq; infligit, nisi vt vulnus dolorē. Exinde morbus ille qui ab aquæ metu hydrophobicus graia est voce appellatus, contrahitur. Euenit autē cū distentione neruorū, totiusq; corporis rubore, præserti faciei cum sudore & lāgore quodam. Aliqui auræ splendorem fugiūt. Alij sine vlla doloris intercapedine vexantur. Sunt etiā qui canū morlatratus ædant, interuenientesq; morfu adoriuntur, ac mordentes simili vitio labefaciunt. Nisi forsitan narratione vnum aut alterum euasisse audiamus. Siquidem Eudemus superasse quendam affirmat. Themisonem aliqui demorsum in idem vitium incidisse & euasisse fatentur. Alij amico aquam expauescenti morem gerentem & officiū exhibentem, quadam naturarum concordia similem subiisse affectum. Sed post multos tandem cruciatus seruatum extitisse. Molestissimum itaq; genus morbi, a quo multos anteq̄ ipsum experirentur vindicauimus. Et complures ab alijs medicis seruatos nouimus.

Remedia demorforum a cane rabioso. CAP. II.

Atio medēdi duplex. Vna communis qua vtendū in omnes morfus, quos virulentæ animantes impresserunt. Alia peculiaris priuataq; eorum duntaxat quos rabiosi canes momorderint. Quæ nonnullis quidem summam opem ferre consuevit. Alijs vero inutilis, maxime qui ex multo iam tempore, ictum accēperunt. Quæ ad hanc pertinent, primum exponemus. Deinde cursim perstrin-gemus, quæ ad communem medendi rationem pertinent. Cancros itaq; fluuiatiles cum sarmentis albæ vitis cremare oportet, & cinerem

PEDACII DIOSCORIDIS

eorum q̄ minutissime tritum habere reconditum. Itidem gentianæ radicem tulam cribratāq̄ reponere. Quoties autem canis rabiosus morsum intulerit, in quaternos cyathos vini bina cineris cancrorum cochlearia vnūq̄ gentianæ conijciātur. Hæc in polētæ madefactæ modū subacta, quadriduo bibantur. Inter principia medicamentum hoc modo detur. Atqui si ab illato morfu duo aut tres dies fluxerint, curationem auspicabimur a triplicato pondere, supra id quod ab initio retulimus. Optimum hoc aduersus rabiosorum morsus auxilium, quod & multis vnum satisfecit, eoq̄ cum fiducia vti licet. Sed vt alijs etiam nū auxilijs cōtra inuitabile periculum muniamur, nihil cæteris vti prohibet. Satiū autem multo fuerit medicamentorum sæuitiam tolerare, q̄ propter negligentiam in discrimen adduci. Nec ita in demorsis a rabioso animali maiora vulnera vereri oportet, vti minora, & vlcusculis cutis similia. Quippe maiori vulnere copiosus sanguis emanans, potest nō nihil virulenti liquoris exhaustire, quod in minoribus non accidit. Quin a maioribus abscedentes carnes hinc auferre, & labia acie scapelli circumscribere, & præhensam hamo carnem amputare oportet. In vtriusq̄ circumstantia loca altioribus vlcusculis scarificanda, vt sanguinis vacuatio resistat, ne venenum membratim insinuetur. Cucurbitulæ cum multa flamma agglutinatæ id iuuamenti præstant, vt veneni vis extrahatur.

De Visione.

CAP.

III.

Ontra virulentos idus, vltio expeditissimum est auxilium, vt pote cum ignis cætera viribus præstet. Simul quod virus domet, & ferri penitus non patiat, simul q̄ pars ignem experta deinceps non vilem nec indecoram loci instaurationem efficiat, manente diutius exulceratione. Anima duertendum ex eo tēpore cum crustæ decident, ne vlcus oræ coalescāt, & cicatrice induāt, sed si fieri potest ad præfinitū tempus vlcerationes & sordidas adhuc et inflammationē minantes, prorogari conuenit. Quod inditum ijs salsamentū optime præstabit, et sylvestre alliū detritū. Itē capæ succusq̄ præsertim cyrenæicus, aut qui medicus aut parthicus appellatur. Tritici granæ tam mansa q̄ non mansa imponantur, siquidē subacta pistave ob perfusionem vulnera dilatant. Sunt qui a mandentium ieiunio, sibi aliquid asciscere arbitrentur, quod suapte natura resistat. Verum tamen id non constat. Cæterum tempestiue his vtendum. Si vero quod persæpe accidit, ante dies præfinitos cicatrices coirent committerenturq̄, manū postulabunt. Namq̄ eas diducere carnemq̄ scapello circinare, aut iterum inurere expedit. Vbi vero propositum tēpus præterijt, vlcus ad cicatricem ducendum, & emplastro quod e salibus cōficitur locus cō-

præhendendus. Nec multo post sinapismo vendum.

De Ratione victus in morfu rabiosi canis. CAP. IIII.

Væ ad partem istā pertinent præsidia, ita se habent. Cæterū
 q victus rationē ex ijs quæ veneno aduersantur, cōiectura qua-
 dam colligere oportet, simul vt veneni vires hebetet restin-
 guatq, simul vt arceat, quominus ad itima pernicies illabatur. Etenim
 assūpta perniciosarū viriū penetrationi resistūt. Quorū utrūq, præsta-
 re potest vini meratoris passi & lactis potus. Quippe qui hæc omnia
 capiūt ad curā, nōnihil veneno obijciūt, quod omnē eius acrimoniam
 obtūdat. Simili modo aliorū pororū cæparūq, cibus, q, ea difficulter
 cōficiātur & aboleātur. Nā multos dies huius cibi qualitates remanēt,
 quo tēpore nec euincuntur nec permutātur a mortifera vi. Cōtrarijs il-
 la vis expugnatur. Cui rei antidotorū vsus accōmodatur, & theriacæ
 metridatij & eius quod eupatorio tēperatur, deniq, omniū quæ magnā
 aromatū partē sibi vēdicāt. Quippe aromata omnia viribus & substā-
 tia ægre permutātur. Quare in corporibus euincunt. Victus ratio hoc
 modo se habet. Nōsse cōuenit pauorē aquæ nō statō definitoq, tēpo-
 re exoriri. Plurimū tamē ad quadragesimū vsq, diē neglectis differri
 cōsuevit. Post semestre etiā nōnullos inuadit. Quēdā post annū aquā
 horruissenobis præsertim cōpertū est. Narrāt & aliquos post septēniū
 aquæ metu fuisse tētatos. Inter principia demorsorū d canerabioso cu-
 rādi ratio talis est. Verūenimvero si ea quæ retulimus auxilia primis
 dieb⁹ prætermisssa fuerint, nec scalpro carnē circinare, nec vstionē expe-
 riri operæpreciū est. Nō enī quod iā pertrāsijit satis euocare possent.
 Nulla utiq, adiectionis vtilitas, sed incassū corpora doloribus sternē-
 tur. Alter vero curationis modus accedat. Deiectio magnū præbet iu-
 uamētū, vt pote cū mouēdo, corporis habitū trāsmuter. Et quæ colo-
 cyntidē recipit hiera, item lac scistum quod simul deiectionem moueat
 & venenū domare possit. Cibi acres & meraculi potus, quibus vis ve-
 neni vehementer retunditur, quotidie sumi debent. Cæterum sudores
 ante cibos & post etiam ciendi. Dropacismi sinapismi q, particulatim
 per corpus totum adiijciendi. Sed longe omnium efficacissimum auxi-
 lium heleborismus cognoscitur, quo cum fiducia non semel atq, iterum
 sed frequentius ante quadragesimū vel post hoc tēpus vti licet. Tana-
 tam enim vehementiam hoc auxilium habere fertur, vt quidam qui
 iam aquæ metum sentirent, sumpto heleboro, simulac primum morbi
 impetum experirentur, fuerint seruati. Nam & iam vitio tentatos neq,
 parum adiuuare potest. Itaq, primum curam cōtra rabiosi canis mor-
 bus breui sermone exposuimus. Iā ad alia quæ venenatis moribus sæ-
 uire consueuerūt, transendum. Notas vno prætextu, deinde commu-

PEDACII DIOSCORIDIS

nem medendi modum, qui omnibus convenire possit, explicabimus. Cursum postremo subiungemus ea, quæ sua proprietate nonnullis auxilium præstare possunt. Subnectemus etiam venenata quæ nullis cedunt remedijs.

Pedacij Dioscoridis Ana-
zarbei de venenatis ani-
malibus & rabioso
cane Septimi
Libri

F I N I S

PEDACII DIOSCORIDIS ANA-
ZARBEI DE NOTIS EORVM
QVI A VENENATIS DE-
MORSI SVNT, LI-
BER OCTA-
VVS.

De Phalangijs. CAP. I.

D • Emorsis a phalangijs locus quidē ipse, quasi ab im-
pacto aculeo rubet, non intumescens, nec per ambi-
tum calidus, sed mediocriter subrubens. Vbi vero
contrariorum occursum refrixit, consequitur corpore
toto tremor, distentiones circa poplites & inguina,
convulsionibus non dissimiles. In lumbis collectio
exoritur. Perpetua vrinæ libido lacessit, multaq;
reddendis excrementis colluctatio. Vniuersa cute frigidus sudor ema-
nat. Collachrymant oculi, offusisq; nebulis caligant.

De Scolopendra. CAP. II.

f I scolopēdra aut dicta ophiōtēne, morsum intulit, locus per
ambitū liuore sugillatur et cōputrescit, iterdūq; licet raro, sæ-
culētus atq; ruber cernitur. A morsu ipso exulcerari locus in-
cipit. Vlcus id negotium exhibet, sere remedijs inuiatū. Præterea
toto corpore prurigo sentitur.

De Scorpione. CAP. III.

f Corpionis morsu inflammari statim incipit locus, & indu-
rescit, ac intentus rubet, vicissimq; dolore premitur. Modo si
quidem exæstuat, modo frigore occupatur, labor repente fa-
tigata, liquando meliuscule habet, aliquando recrudescit. Consequitur

fudor, horroꝝ sensus et tremor. Extremæ corporis partes refrigescūt. Inguina extolluntur. Tubercula in sede proflunt. Capilli erigūtur. Pallor mēbra decolorat. Dolor tanq̃ ex pūgente acu, per vniuersam cutem sentitur.

De Pastinaca marina. CAP. IIII.

I marina pastinaca percussit, protinus accidūt molesti dolores, assiduæ cōuulsiones, labor, & ibecillitas. Mēs percussis labat. Postea obmutescūt. Oculi calligāt. Percussus autē locus in ambitu cū vicinis partibus denigratur, & ita obstupescit, vt tāgentem non sentiat. Hunc si quis premat, atra sanies, crassa & male olens excernitur.

De Mure araneo. CAP. V.

Mure araneo percussis, circa morsum in orbem inflammatio exoritur, nigraq̃ pustula diluta sanie turgens exurgit. Proximæ partes liuent. Rupta pustula, deuorans vlcus, nō ei dissimile quod serpit occupat. Intestinorū quoq̃ tormina, difficultas vrinæ, & humoris offusio consequuntur.

De Vipera. CAP. VI.

I vipera momordit, corpus intumet, vehemēter arefcit, subalbidumq̃ colorem concipit. Sanies a vulnere profunditur, suppinguis, mox cruenta. Pustulæ adustis similes erumpūt, & antea depascens vlcus, quod in proxima repens non summa modo corporis, sed intima quoq̃ corripit. Gingiuæ ijs cruore suffunduntur. Inflammatio circa iecur erumpit. Tormina & biliosi vomitus sequuntur. Sopor & vrinæ difficultas accedit, & frigidus sudor offunditur.

De Amphibana. CAP. VII.

Onsimilia eueniunt ijs qui ab scytala nomine, aut amphibana demorsi sunt. Eademq̃ fere auxiliantur. Quare hoc venenū priuatam descriptionem sortitum nō est, quis non eidem generi assignandum sit.

De Druino. CAP. VIII.

Druino morsus pustulæ molestiq̃ dolores incidūt, præsertim qua dilutæ saniei emissariū subest. Quinetiam erosio torminaq̃ consequuntur.

De Hæmorrhoo. CAP. IX.

B Hæmorrhoo idis vehemētes cruciatus accidūt, qui breuē strigofamq̃ prorsus raritatem ex continuo dolore præbent.

Ex plaga copiosus cruor effluit. Et si qua cicatrix corpore nonnūq̃ adfuerit, frangetur, & sanguine manabit. Excrementa per aluum cruenta eiiciūtur. Profluensq̃ sanguis in globos coijt. A pulmo

PEDACII DIOSCORIDIS

ne sanguinem extussiunt, & nullo deniq; remedio euomunt.

De Dipfada.

CAP.

X.

Vos dipfas percussit, intolerabilis ardor premit. Sitisq; vsq;
 q eo pertinax, vt satiari nō possit, ac sine vlla intercapedine ex-
 cruciet. Et si potū affatim trahāt, illico in eamdē sitim relabū-
 tur. Is vero qui per initia potum non hauserunt simile quiddam pror-
 sus accidit. Quare propter continuam sitim & prester & caupon aut
 dipfas appellatur.

De Hydro.

CAP.

XI.

a B hydro demorsis vlcus dilatur, & liuidum ac ingens eua-
 dit. Sanies ex eo multa & atra & male olens nō secus atq; ijs
 quæ serpunt vlceribus expuitur.

De Cenchro.

CAP.

XII.

c Enchri morsum, qui viperino ictui similis est, putridū vlcus
 sequitur. Carnes antea vt in aqua inter cutem prætumide de-
 fluūt. Letargo corripiūtur, et veterno pressi somnos captāt.
 Erasistratus eos iocinere, vesica, coloq; confictari author est. Quippe
 difectis ipsis omnes fere partes corruptæ reperiuntur.

De Ceraſte.

CAP.

XIII.

a Ceraſte percussis locus attollitur, cum duricia pustulosus.
 E plaga sanies profluit, modo atra, modo pallidior, sed circa
 concrementum totum rutileſcit, genitale intenditur, mens la-
 bat, oculorū caligo exoritur, deniq; rigore neruorum distenti cōmo-
 riuntur.

De Aspide.

CAP.

XIII.

a B aspide ictis, vulnus exiguum prorsus, quasi ab adaſta acu
 citra eleuationem conspicitur. Sanguis exiguus ille qui
 dem sed ater destillat. Caligo velox oculos obnubit. Labor
 in totum corpus multiplex, omnino leuis & non sine voluptate con-
 sequitur. Ideo Nicander perpulchre cecinit. At vir perit absq; labore,
 discolor atq; virens. Aliquātulus cordis æstus afficit. Frons perpetuo
 reuellit. Genæ contremiscunt, quasi sine sensu in somno vacillent.
 Hos mors tollit ad diei trientem non dillata.

De Basilisco.

CAP.

XV.

e Rasistratus in libro quem de medicaminibus & venenis con-
 didit, de vocato basilisco scite ita refert. Cum basiliscus mor-
 morderit vulnus ad auri colorem exflauescit. Itaq; in pluri-
 mis quæ virus ei aculantur comites notæ ita se habent. Transcentes
 vtiq; ad medendi rationē primū, vt fieri poterit, de communibus dis-
 feremus.

Cōmunis curatio in oēs idus virulētos. CAP. XVI.
 Duerfus quidē omnē animalis idū, quod venenū vibrat, oris
 a studio conuenit. Sugentē vero oportet ieiunū nō esse, sed et
 cibū sumphisse, et vino os abluisse. Postea exigū olei in ore
 continēs idū exugat. Locus ipse spōgia fouendus. Deinde scarifican-
 dus. Sed vlcuscula altius imprimere expedit, quo virosa materies profun-
 do euocetur. Circinatio autē carnis, & sectio, scarificatione longe potē-
 tius opitulātur. Nāq; ab ijs duo peculiaria præsidia fiunt. Vnū quod
 virus e loco tollitur. Alterum q; ante occurrens q; interna subeat, cum
 sanguine copioso excernitur. Q; si locus carnis circūscriptionem nō
 admittat, cucurbitulæ cū largiori flāma adfigēdæ sūt. Sed iā de vstio-
 ne supra in rabiosorū morfu, disseruimus. Si vero idta pars vtpote ex-
 trema, sectionē cōmode nō respuat, præsertim in omnibus serpentibus
 vt aspidē, cerastē & similibus, proculdubio amputanda est. Conueniē-
 tiora supradictis auxilia sūt quæ epithemata vocāt. Imponat sermētū
 cinis, aut ficulus, cū lixiuio, subacta stacte, garo, & acrisalsamē-
 to. Porri capæ & allia modo minutissime cōtrita illinūt, modo crema-
 ta vulneribus iniiciūtur. Quinetiā dissecti gallinarū pulli cū maxime
 tepent, percusso loco cōuoluuntur. Nec desunt qui hisce tanq; discor-
 dia quadā naturali pugnātibus vtantur, verū huius rationē inire facil-
 limum fuerit. Gallinæ enim calida natura præditæ sunt, argumento. q;
 deuoratū insigne virus eliquēt, & aridissima quæq; semina cōsumant.
 Item nōnunq; harenas lapillosq; quos faucibus insinuarint, dissoluūt.
 Itaq; animantis calore, spiritus idæ partis impetū capescens, venenū
 exigit. Nec me fugit, quid i ægypto fieri soleat. Cū spicas ægyptij me-
 tūt, ollā picis paratā habēt, & appēsā fasciā. Tūc enī maxime serpētū
 iniurias expauescūt, tū propter spicilegij tēpus, tū q; opacis simul ab-
 ditæ spelūcis, & cauernis, densoq; aruorū celsitate delitescūt. Molestio-
 ra enim animalia & virus eructantia, ægyptus in cāpis ferre cōsuevit.
 Vbi ergo aut in pedē aut partē aliā morsum intulerunt, assidentes, fa-
 sciam in ollā picis conijciunt, & semel aut iterū brachiū aut crus pau-
 lum supra vulnus obligant, et arctissime duo e præsentibus dstringūt.
 locūq; secātes qua circūactus est laqueus, picē instillāt. Cūq; satis vul-
 nus excepisse videtur, laqueū resoluūt, & capīs alijsq; supra memora-
 tis illiniunt. Præterea pix liquida cum sale trito et feruente illita, præ-
 sentaneo est auxilio, si iugiter innouetur. Conuenit et cedrus, & simū
 caprarum ex vino decoctum. Locū aceto calido, calamintha in lotio,
 maris aqua, aut acida muria decocta, foueri salutare est. Quinetiam nō
 desunt emplastra vehemētissima, et calidissima, quæ venenū ellicere,
 expugnare & discutere possunt. Cuiusmodi sunt quæ ex sale aut ni-

PEDACII DIOSCORIDIS

tro sinapi et semine roris marini componuntur. De quibus consequenter erit tractandum. Erasistratus autem non iniusta reprehensione eos incescit, qui incognitas ad hunc usum facultates conscripserunt, ut elephantifel, testudinis sanguinem, aut crocodili oua, et consimilia. Nam cum iuuantia quædam literis tradidisse videtur, plane in hæc sola incidentibus imposuerunt. Quare talia deuitanda sunt, cum difficile nisi regia facultate, peruestigari possint, neque quo nostra fides ijs obstringatur frequenti obseruatione, sufficiens experimentum præstiterint. Quæ autem ad communem omnium usum pertinent, quæque facile suppeditari, & omnibus a serpente percussis auxiliū ferre queunt, subiungenda videntur. Intubus itaque & erica & astragalus cum aceto potus, contra omnes serpentium morsus auxiliantur. Item bitumen & virentes platani pillulæ in vino diluto coctæ, & paliuri decoctum, radix aristolochiæ et eringij. Decoctæ etiam lauri bacce & deuoratæ piperque largius esitatum, ruta anetum, & cyclaminus. Coma porrorum priuatim ex pane, aut allium aut capre, salsamentaque acerrima, origani decoctum cum vino potum, sceniculi, pulegij, calamithæ porrorumque succus cum melle desorbis. Hæc quidem a plantis conquiruntur. Ab animantibus vero quædam commode peti solent, gallinaceorum cerebella in cibo, leporinum coagulū cum vino. Itidem castorij sextas. Testes marinæ testudinis sumpti multum prodesse traduntur. Mustella sale inueterata inter auxiliaria medicamentata est. Inuenitur etiam prius exenterata, saleque siccescens inueteratur, ex aqua binas drachmas cum vino bibisse satis est. Sed de simplicibus quæ dari solent hæcenus. Percussis a serpente prodest alui deiectionio, diffusus sudor, vrina copiose reddita. Composita etiam quædam receter remedia polliceri traduntur, ut & opij & myrrhæ singuli oboli, piperis quicumque. Ea melle excipiuntur & istar ægyptiæ fabæ dantur. Itidem syluestris rutæ seminis, gith, cumini æthiopici, aristolochiæ, galbani, singulorum pares portiones tritæ & cum erucæ succo subactæ, digeruntur in pastillos, qui drachmæ pondus æquēt. Dantur ex ijs terni cyathi cum vino. Hæc habui de communibus auxilijs quæ dicere. De peculiaribus remedijs contra bestias quæ venena vibrant, consequenter est dicendum.

Pedacij Dioscoridis Anazarbei de venenatis animalibus & rabioso cane Octau

Libri

F I N I S

LIBER NONVS

155

PEDACII DIOSCORIDIS ANA-

ZARBEI DE REMEDIIS CON-

TRA VENENATOS

MORSVS LI-

BERNO

NVS.

I Nter ferentiū venenatorū notas nihil de vespis et apibus articulatim digessimus, q̄ conspicuæ omnibus forent, et nihil excellens aut notatu dignum in his obseruaretur, inter remedia tamē, earum meminisse non fuit alienum.

De Remedijs cōtra vesparū apūq̄ ictus. CAP. I.

a Duerfus apū vesparūq̄ ictus, prodest illita malua & hordeacea farina cū aceto, ficulneū lac in vulnus instillatū, a muria aut maris aqua fots.

De ictis a Phalangio. CAP. II.

p Halangiorū ictibus ficulneū cinerē adiecto sale trito & vino imponere oportet, aut radicē sylvestris punici q̄tenuissime tritam, aut aristolochiam hordei farina & aceto subactam.

Vlcera aqua maris proluenda, aut apia stri decocto. Folia eiusdem illinenda. Lauacris perpetim vtendum, & potionibus quæ hæc medicamenta recipiant, abrotoni semen, anisum, aristolochiā, cicer sylvestre, cuminū æthiopicū, cedrides tritas, platani corticē, & trifoliæ hærbæ semē. Priuatim autē singulorū ex ijs binas drachmas dare cū vini hemina cōuenit. Itē myricæ fructus & chamæpityos, & viridiū cupressi pillularū decoctū, ammisso vino. Sunt qui fluuiatilē cancrū in succū redactum, cum aqua aut lacte, assumpto apij semine cōfestim molestijs liberare prodant.

De morfu Scolopendræ. CAP. III.

f I scolopendra morsum infixit, sal q̄leuissime tritus ex aceto vulneri ispargēdus, aut ruta sylvestris superponēda. Locus acida muria perluendus. Dāda in potu aristolochia cum vino, aut serpillum aut calamintha, aut ruta sylvestris.

Remedia ad scorpionis ictum. CAP. IIII.

p Ercussis a scorpione, præsentī est auxilio ficulnū lac in vulnus instillatum. Scorpūs ipse qui ictū vibrauit, tritus et percusso loco impositus, suæ plagæ remedium est, ob quamdā vt cōstat discordiā. Præterea tritus et impositus cū sale, lini semine, & althæa conuenit. Sulphur ignē non expertum refina terebinthina exceptum, et emplastri modo adiectū auxiliatur. Itidē galbanū ad sple-

v.iii.

IPEDADCIOSCORIDIS

nij formā ductum & calamintha quæ trita illinatur. Et farinā hordei in vino parata, in decocto rutæ. Semen trifoliæ herbæ tritū & vulnere iniectū opitulatur. Hæc ad affectum locū pertinent. Posthæc q̄ efficacissimis potionibus vtēdū, cuiusmodi sunt aristolochiæ præsertim corticis binæ drachmæ cū vino. Tusa gentiana & pulegium decoctū & baccæ lauri pauco numero tritæ, & calamintha cū posca, i qua magno pere discoqui debet. Cupressus cum vino & ruta. Nec secus ficulneum lac, laserpitiū si adsit, sin desyderetur, peucedani succo vtendū. Efficax est potus trifolij fucus, & ocimi semen. Omnibus autē ijs perpetuus lauacri vsus, euocatus sudor, & dilutæ vini potiones registram.

Aduersus marinæ pastinacæ, Scorpij marini et draconis ictus. CAP. V.

I qui marina pastinaca igitur, omnia quæ de viperarum morfu paulo post referemus, simili modo cōueniunt. Peculiariter autē ictus a marino scorpione et dracone inferuntur, qui molestos cruciatus cient. Interdū autē sed raro nomas excitāt. Quibus absinthij saluiæ aut sulfuris ex aceto triti potio subuenit. Pastinaca diuulsa et vulnere imposita, sui ictus medela est.

De morfu muris aranei. CAP. VI.

I mus araneus in morderit, auxiliatur ex galbano splenium per se vulnere exterius impositum, aut medicamenti modo aceto tritū, & hordeacea farina cum aceto mulso illita. Quin etiam mus ipse qui morsum intulit si dissectus apponatur, ictus sui veneficia luit. Resistunt quoq̄ acini dulcis punici decocti & illiti. Item porri & allia cōtrita, necnon aquæ calidæ fots. Sed hæc ad locū pertinent. Prodest potum abrotoni decoctum, maxime si in vino detur. Præterea serpyllū & galbanū & eruca vino madefacta, recentes cupressi pillulæ cū aceto, et cyclaminus ex aceto mulso, & pyrethrū cū vino & chamæloxonis herbæ radix. Nec desunt qui litterarū monumētis tradiderūt, tritū murē araneū cōtra suos ictus cōmode bibi. Quā historiā apud alios inuentam, dignam duntaxat censuimus, quæ annotaretur. Alij asseuerant demorsum non alias exulcerari, nisi extrinsecus mus araneus asliterit, tum quoq̄ auxiliari referunt.

Ad morsum viperæ remedia. CAP. VII.

I vipera morsum impressit, simū caprinū cū vino impositum opitulatur. Item laurus & abrotonū & galbanū splenij loco superiectū. Origanū viride inditū. Pulli gallinarū discepti et cōfesti admoti. Herui farina aceto mulso subacta. Radicis cortex vsq̄ eo tusus, vt in puluerem solutus abeat, & scylla tosta detritum chamæmelum, hordeaceū cataplasma in aceto mulso præparatū, sed locus ante

calida foueatur. Hæc loco imponuntur. Contra viperinos ictus rubus cū vino prodest. Aliqui anchusā tenui folio cōstātē auxiliari produnt. Leporini coaguli in vino terni oboli bibūtur, & porracei succi hēmina in mero, & foliorum apiaſtri succus, & sylueſtris ruta. Hæc in vino potari debent, merū continuo bibendū, allia mandēda & cæpe & porri recētes, ſaſamēta acerrima et opipara. Simplicia hæc ſūt, Percuſſis a serpente præclare auxiliatur medicamentū, quod myrrhæ, piperis, caſtorij, floris portulacæ ſeminisq; dimidio acetabulo conſtat. Hæc omnia in cretico paſſo teruntur aut in alio probato vino. Eraſi ſtratus in eo libro qui περὶ ἀνὰ μέρους id eſt de viribus inſcribitur pleraq; alia tradidit, quæ ictis ab vipera auxiliū ferre poſſūt. Inter quæ talia maxime laudantur, gallinacea cerebella cū vino pota, ſemen ſatiuæ braſſicæ tritū & acetabuli mēſura cū vino potū. Quinetiā bonum eſt digitū in liquidā picē intingere, deinde vinū quo digitus fuerit elutus bibere. Hæc ſunt quæ contra ſerpentium ictus auxiliantur.

De Amphibænæ morſu. CAP. VIII.

d Eamphibæna mētionē hoc loco fecimus, quoniā fere remedijs ad viperas ſcriptis, percuſſi ab ea adiuuari ſoleant.

Contra druini ictus remedia. CAP. IX.

a Druino ictis cōuenit ariſtolochia cū vino pota, trifoliū hærba, radix haſtulæ regiæ ſimiliter aſſūpta, & fructus ex oī quæcus genere. Tuſæ illicis radices & illitæ parti ictæ auxiliatur.

De Hæmorrhoi & diſpadis ictu. CAP. X.

h Aemorrhoi diſpadiſq; morſus velut immedicabiles a plerisq; maiorum deplorati relinquebantur. Quare ſi peculiaribus contra diſpadem remedijs egeamus, communia experiri operæ precium erit. Protinus autem ſcarificatione vti, vſtionem facere, etſi locus patiatur aputatione opus erit. Conſequēter q̄ acerrima cataplaſmata admouere, de quibus ſepenumero diximus. Nec me fugit acres cibos maxime a ſaſamentis vtilis eſſe. Meracæ potiones & lauacra proſunt, quæ ſubinde interiecto breui ſpacio aſſumenda ſunt priuſq; morbi genus emerſerit, quo ſemel erumpente opem ferre non poteſt vlla medici opera. In ictu hæmorrhoi eadem proſunt. Inſuper quæ in commune opitulantur vt ſcarificationes, vſtiones, acres cibi, meraci potus, & quæ nunc in diſpade definiuimus. Quinetiam decocta vitis ſolia & cum melle trita.

De morſu Hydri. CAP. XI.

f I morſum hydrus adigit, prodeſt organū tritū, et aqua ſubactū, lixiuia cū oleo indita, aut ariſtolochiæ cortex, aut quærna radix minutim contrita, & hordei farina cum aqua & melle

PEDACIO DIOSCORIDI

le colliquato. Bibuntur etiam binæ aristolochiæ drachmæ in diluto vino, aut poscæ cyathis duobus, deinceps marrubij succus, vel deco- & vtriusq; cum vino. Fauus recens datur in aceto.

De morfu Cenchridij. CAP. XII.

Oris a cenchridio auxiliatur lactucæ fructus cum lini semi-
m ne illitus, et satureia trita & sylvestris ruta & serpyllum cū
xij. hastulæ regiæ drachmis et tribus vini cyathis, aut aristolochiæ radix. Item cardamomū, & gentiana.

De percussis a Cerasse. CAP. XIII.

I cerastes aut aspis percusserit, cita partis amputatio suffra-
gatur. Quare sine mora istam partē amputare, aut scalpro cō-
festim circūcidere, & ijs similia prosequi oportet. Vrentia
insuper admouenda. Siquidem virus hoc veneno basilici simile est.

De morfu Aspidis CAP. XIII.

Is qui ab aspidē feriuntur, quæ de cerasse scripta sunt auxilia
dari debēt. Nam venenum hoc quemadmodum basilisci, aut
sanguis bubulus, celerrime in arterijs sanguinem cogit.

De Basilisci morfu. CAP. XV.

D basilisci morsum, vt Erasistratus author est, auxiliatur ca-
storij drachma in vino pota. Item papaueris succus. Istuum
remedia ita se habent.

QVAE SEQVVTVR NON VIDENTVR ESSE DIOSCORIDIS.

De Rhamno.

Rhamnum si quis eruat silente luna, & secum ferat, contra venena
& improbos homines proderit. Pecoribus iuuādis appenditur. Na-
uigijs circumponi solet. Valet contra capitis dolores & laruas.

De Artemisia.

Artemisiam hærbam si quis teneat, dum iter facit, lassitudinē disci-
riet, & si in pedibus ferat, bestias & lemures abiget. Si sanguis circa
artus coaluerit, ramulos ex rosaceo in olla feruefacito, & locum totum
oblinito, cū somno indulgendum est. Strangulatui vuluæ mirū in mo-
dum auxiliatur. Vrinæ stillicidia & opisthothonū leuat.

De Pentadactylo.

Pentadactylū si quis circum corpus portet, nullo dolore afficietur.
Oculos, strumas, callosos tonsillarum tumores, vuam, articulos sub
lingua, neruorum dolores & dentes, pforā perniciali fame contra&ā.

ADSCRIPTA

157

iuuat. Remoratos a partu mēses eiicit. Infusa manibus ex aqua tepida contra terrores fascinum & laruas, mirum in modum commendatur. Vellito hārbam cum luna crescit oriente sole.

De Verbenaca

¶ Verbenaca recta genitale intendit, sed supina exiccat. Recta appēsa, doloribus oculorum auxiliatur. Contra hebetudines eorumdem et capitis dolorem efficax est. Trita ex aceto lassitudinē reficit. Strumas, callosos faucium tumores statim discutit. Febrium horrores sanat, si quis solum ex aduerso stans ramulos tenuerit.

De Dictamno

¶ Dictamnium siccatum manibus terito, & redigens in farinam adiecta vini stilla corpus tangito. Siquidem contra omnes serpentium iniurias auxiliatur. Vlcerā & putrescentes nomas præpurgans explet. Ad aëris corpori aculeis oblinitur, vt præsentī sit auxilio. Ad lienē & in abditis locis vitia inflammatione turgentia, redactum in farinā illinito. Hārbam vere, magnis æstibus, autūnoq; eruito.

De Saluia.

¶ Saluia singultū ruffinūq; discutit. Oibus malis vlceribus cū cæra & rosaceo sūpta auxiliatur. Lienis dolorē dysēteriāq; pota cū vino albo pari modo sanat. Sanguinē excreantibus, potu medetur. Ad extrahenda vuluæ onera efficax est. Pessimæ mulieres pessum ex ea subiiciunt, vt partus excutiant.

De Cupresso.

¶ Cupressus hārbā contra raucedines auriculāq; prodest. Induratos tonsillarum tumores, aquam intercutem, & coxendicum cruciatus persanat.

De Centaurio

¶ Centaurium contra inflammata vitia & pulsantes ictus valet. Fœminis vuluæ malo lobarantibus auxiliatur. Stillicidij vrinæ calculorūq; tormenta leuat. Hārbam vere oriente sole legito.

De Buphthalmo

¶ Buphthalmū crescente Luna legere oportet. Facit autē cōtra paures, laruas et mala medicamēta, fascinationes, vt pote cum eas auertat. Radicē si quis mandat, dentē expuet, fluctionemq; confestim sistens auxiliatur. Quin & ventrem resoluit.

De Pæonia.

¶ Pæonia hārbā per æstus caniculæ aëte solis ortū vellitur, appēsaq; co travenena, fascinū, paures & laruas prodest. Itē cōtra febrē cum horrore venientē, diurnam nocturnamve, & aduersus tertianam. Proditur lemures a monte in quo nascebatur fugasse.

De Moly hærba.

¶ Moly hærba si secta radice feratur, veneficiorū & fascinationis amuletū est.

De Marina quærcu.

¶ Marinā quærcū cū rosaceo et oleo misceto, et faciē illinito cū ad ne gociā te conferes. Vegetiores reddit pueros imo vētri appēsa, & ad ar cēdos pauores nocturnos manu teneto. Contra fascinū & omnia ma leficia prodest. Corpus tuetur. Cum enim fascinantes recedunt, are scentem ramulum occludit, & cū propius accedunt aperit.

De Chrysanthemo.

¶ Chrysanthemon si terra ante solis ortū eruatur, et collo appēdatur veneficas mulieres omneisq; fascinantes amolitur.

De Eryfimo

¶ Eryfimon cū vino tritum, aduersus ventris dolorē bibitur. Si quis grana septem domum ingesserit, rixæ & iurgia cōcitabuntur.

De Helleborine

¶ Helleborine aliquibus Epipactis alijs Borion diciť. Frutex est exi guus, minimis folijs constans. Bibitur contra omne venenum et ioci neris vitia.

Impressum est in præclarissimo Parrhisorum Gymnasio hoc celeberrimum Dioscoridis opus in officina Henrici Stephani erea gione scholæ decretorum. Absolutumq; octauo Calendas Maias. An no domini M.D.XVI.

¶ ERRATA EX OFFICINA RECOGNITA

Euphorbium legendum fol. j. superficiei prima. versu Siquidem.

Iuuenta legendum fol. j. superfi. ij. versu. sua cognitione.

Accēpimus legen. fol. j. super. ij. versu. los vernacularum.

Celerius leg. serius fol. j. super. ij. versu. mentia maturus

Adstiterit et non astiterit legen. fol. j. super. ij. versu bæ dumtaxat,

ERRATA.

FO.	CAP.	VERSV
ii	i	ne nomen
ii	ii	obliquum tendentes
iii	iii	culorum doloribus
iii	iii	autem illitæ
iii	iiii	gie, quod
iiii	viii	rem profert
iiii	x	reis
iiii	xi	Stomacho
v	xv	validi odoris
vi	xix	Calamus
vii	xxviii	est Sumitur
ix	xl	de melano
xii	lxiii	contra vuluæ
xii	lxiii	emollit humect,
xv	lxxxiii	videaris
xvi	xc	let atq; olim
xviii	xcix	Impositu,
xix	cix	ares
xx	cxviii	stri cætera
xxiii	cxxxvii	lofa pelle
xxiii	cxxxviii	phrenitide
xxiii	clx	Sanguinis
xxv	cl	lore viridi,
xxvii	clxxviii	auxilantur Et
xxviii	clxxxiii	coctæ illitæq;
xxxii	xxvi	ex aqua vi&um
xxxii	xxxi	abolet. Eius
xxxii	xxxiii	exulcerat
xxxiii	lv	reiectionibus
xxxiii	lxiii	tufum, crudo
xxxiii	lxv	rimi halitum,
xxxiii	lxv	tentissime
xxxv	lxxv	sum turbant
xxxv	lxxv	tibus calculis
xxxvii	lxxxiii	tuli, verucula
xxxviii	lxxxv	i exemptis mēbris
xxxviii	lxxxvi	gue & excolatum
xlvi	cx	atq; obsonijs
xlvi	cxvii	malis cotoneis

LEGENDVM.

accepit
 interceptas
 eclegmate
 imo
 vim
 eadem ad quæ
 Radice superius ad digit
 prodest malabathri vis
 zingiber
 Melior
 fumito
 de melanthino
 cacoethe
 glaucedines
 acervasse
 Colophoniar
 gagatæ
 offendit
 inequaliter aspersum
 molem
 substratu
 eruptiones
 q; si
 delin&u
 Parotidas et fur&culos mol
 capeffit (liunt. Panos ad
 garum
 laceffenda
 rheumatismis
 fidili
 exanimentur
 luteis
 clematidem
 in summa
 concerptas
 aqua marina
 Imbuitur
 ammiscetur
 integris

FO. CAP. VERSV

xlv cxxi quescat
 xlv cxxiii tice. Ea
 li clxv aphaca in
 lii clxxi Siquidem
 lii lxxi andum
 lii lxxvi lius. Sed
 liii clxxvi
 liii clxxvii leniter emollit
 lvi cxvi tit. Cribrata
 lvi cxcvii quæ
 lvi cxcviii no
 lix i brarunt.
 lxxv xxx passo. si
 lxxvi xli losos.
 lxxi lxxi Romani
 lxxv xcv & acre
 lxxx ixvvi ductus.
 lxxxij cxliii let
 lxxxii cxliiii cumbendi
 lxxxiii clii uiduntur
 lxxxiii cliiii tera est folijs
 lxxxiii cliiii tæ. vulneribus.
 lxxxiii clviii roet nigro.
 lxxxiii clix semen
 lxxxiii clx men
 lxxxv clxx sa.
 lxxxviii ix crion. Romani
 lxxxix xv ginis
 xciii li de cocco
 xciii li
 xciii lvi Asperginosis
 xcv lxv tes. Nascitur
 xcv lxvi bulbaceam
 xcv lxvii bis. qualis
 xcvi lxii terrarumq;
 xcix lxxix phure ignem
 c lxxxv contra serpē.
 c xc viperalem
 ciii cviii purulenta
 cxiii clxxxiii re candido.

LEGENDVM.

exulceratis pernionibus
 vomitione bilem
 lente
 calfaciendum
 pituitam
 antedidit
 acoitu
 vtilis
 experto.
 phœniceo
 si bibatur
 subfixerunt
 gypsum
 pulegio
 sylvestrem
 missione
 contrita.
 fistulas
 proniores
 flavescentia
 aiugæ similis
 autem aiugæ
 stomachicis & erosionib⁹ ea
 duritia
 cochlearis
 conuexaq;
 viticulosū emittit ramulum
 folliculis (rubescētē. lentū
 seu vacat
 Vltimū ex oībus hispanicū
 Is illitus
 nivalibus
 pubertatem
 accersēdus est
 partium. inflammationes
 experto rubra
 addita. Imbecillæ
 vocant
 in artubus astricti⁹ vindis
 rotundo

Fo.	CAP.	VERSV.	LEGENDVM.
cxv	cxiii	prodest	attonitis
cxv	cc	da, alioqui	anguloso
cxvii	i	folia vitium	illitu
cxvii	v	carbonibus	Reduias
cxviii	vii	vino vetere	quod gustu
cxviii	vii	male habent	obtinet
cxviii	vii	leuius & aluo	Ephygela
cxix	vii	timemus	sæpe
cxx	xvi	nomas	instillare. Hirudines
cxxii	xxxii	palmulas	pertusum
cxxii	xxxiii	rat, qm	non ita
cxxiii	li	dysenteriam,	hybernos
cxxiii	lvi	riaci drachmæ	casia
cxxvi	lxxvi	spodios	spodos
cxxvii	lxxvi	A lij paulatim	harenas
cxxxiii	cx	mant	in caminis
cxxxiii	cxiii	nihil	palloris
cxxxiii	cxv	fistulam hausto	Erumpentem
cxxxv	cxvii	natura	natura in commune
cxxxvi	cxxiii	recenti vtendum	examinatur
cxxxviii	cxxxv	tq; cinnabarin	atq; cinnabarin
cxxxviii	cxxxvi	scistos lapis	gignitur
cxli	lxxiii	lo ante	gonus lege gomis
cxli		improbi	beneficia. le. veneficia
cxlii		modo vitia	admittunt legendum
cxliii		papauer,	lege phtharicum
cxliiii	iiii	et trifaginis	lege & aiugæ decoctum
cxlv	ix	densam vocem	a temulētis
cxlvi	xxi	itidem chamelææ	scilicet legendum
cxlvi	xxii	gua, & commissuræ	dentiū, cādore quodam
cxlvii	xxvii	nem, potum	hormini
cxlvii	xxix	ctus Tragi	vel Orizæ,
cxlvii	xxx	bibuntq; eos	adiutiq; percoquunt
cxlviii	xxxiii	ne & scinco	scincho
cxlviii		minus	medicinæ
cxlix		Et hanc in eo	apertissime
cl		neq; continens	le. neq; ad finem neq; ad
cl		cisci conditionem	Namq; lege Neq;
clii	iiii	aromatum partem	et substantijs
clii	iii	quidem exaestuatur,	fatigat aliquando

REGISTRVM

a	j	Pedacij	l	i	tūculum
	ij	um pceritates		ii	mile,
	iiij	Ad muliebres		iii	De altera
	iiij	odoris radice		iiii	nues emitit
b	j	hit, sextario	m	i	adrupta
	ij	De lentiscino		ii	farinam
	iiij	nionibus		iii	De Echio
	iiij	assumuntur		iiii	Aphri
c	j	fo manarunt	n	i	cato humore
	ij	De bitumine		ii	tex, in vino
	iiij	sa mortuorū		iii	Item
	iiij	lintheisq		iiii	grau
d	j	Candida	o	i	quoq
	iiij	quoq in		ii	renitent
	iiij	De pyraestro		iii	los, alijs
	iiij	abscessibus		iiii	matin
e	j	De iure pisciū	p	i	nigri, et
	ii	Subdita		ii	De Apio
	iii	ac imbecille		iii	lita ex
	iiii	ri, vt		iiii	tur.
f	j	cum melle	q	i	ligenter
	ii	teretes		ii	nes internas,
	iii	coctā		iii	maioris
	iiii	um, verrucas.		iiii	dis.
g	j	strior magis	r	i	gia ex
	ii	Gontra adu.		ii	carbonibus
	iii	De Aphaca.		iii	exposita
	iiii	Siquidem		iiii	incolæ
h	j	spectatur, et	f	i	ret,
	iii	thoth, Daci		ii	reddat
	iii	De Teliphio		iii	ignes
	iiii	nunc ex aqua		iiii	De Terra
i	j	nutim incis	t	i	hinnuli
	ii	De Pulegio		ii	acetum,
	iii	oblōgioribus		iii	thymum
	iiii	De Maro		iiii	Quibus
K	i	radix	v	i	sudor
	ii	De ros-marino		ii	Communis
	iii	Et lac		iii	Origanum
	iiii	niæ ratione		iiii	Pedacij,

